

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ по применению лекарственного средства АЗИТРОМИЦИН ФАРМЛЭНД, таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг и 500 мг (информация для пациентов)

Регистрационное удостоверение:

Торговое название: Азитромицин Фармлэнд.

Международное непатентованное название: Azithromycin. РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой.

СОГЛАСОВАНО	
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
Приказ Министерства здравоохранения	
Республики Беларусь	
от « <u>20</u> » <u>02</u> <u>20<u>20</u></u> г. № <u>183</u>	
КЛС № <u>1</u>	от « <u>29</u> » <u>01</u> <u>20<u>20</u></u>

Описание

Таблетки 250 мг: розового цвета, круглые, двояковыпуклые, покрытые оболочкой.

Таблетки 500 мг: розового цвета, продолговатой формы, двояковыпуклые, покрытые оболочкой, с риской на обеих сторонах. Риска предназначена лишь для разламывания с целью облегчения проглатывания, а не для разделения на равные дозы.

Прежде, чем Вы начнете принимать это лекарство, прочитайте тщательно весь листок – вкладыш:

- Не выбрасывайте этот листок. Возможно, вам придется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
- Это лекарство должно быть вам выписано врачом. Не передавайте его другим. Это может нанести им вред, даже если их симптомы такие же, как Ваши.
- Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или, если Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не перечисленные в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Что такое Азитромицин Фармлэнд и для чего он используется

Каждая таблетка Азитромицина Фармлэнд содержит 250 мг или 500 мг действующего вещества азитромицина (в виде азитромицина дигидрата) и вспомогательные вещества: натрия крахмалгликолят (тип А), целлюлоза микрокристаллическая, тальк, натрия лаурилсульфат, магния стеарат, кукурузный крахмал; оболочка – Опадрай II розовый 85F540115 (поливиниловый спирт, макрогол (тип 3350), титана диоксид (Е 171), тальк, красный очаровательный (Е 129), тартразин (Е 102)).

Это лекарственное средство относится к группе антибиотиков макролидов. Антибиотики подавляют рост микроорганизмов, которые вызывают инфекции.

Азитромицин Фармлэнд применяется в следующих случаях:

Лечение инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к азитромицину микроорганизмами:

- Инфекции верхних дыхательных путей (фарингиты/тонзиллиты, синуситы, острый отит среднего уха);
- Инфекции нижних дыхательных путей (обострение хронического бронхита, внебольничная бактериальная пневмония, в том числе вызванная атипичными возбудителями);
- Инфекции кожи и мягких тканей (неосложненные формы *acne vulgaris*, хроническая мигрирующая эритема (начальная стадия болезни Лайма), рожа, импетиго, вторичные пиодермии);
- Неосложненные инфекции, передающиеся половым путем, вызванные *Chlamydia trachomatis* (уретрит, цервицит);

- Заболевания желудка и 12-перстной кишки, ассоциированные с *Helicobacter pylori*.

Не принимайте Азитромицин Фармлэнд в следующих случаях:

- У Вас есть аллергия на азитромицин, другие антибиотики-макролиды (эритромицин, кларитромицин) или к любому другому компоненту лекарственного средства;
- Если Вы принимаете производные алкалоидов спорыньи: эрготамин, дигидроэрготамин (возможно развитие эрготоксичности).

В обязательном порядке проконсультируйтесь с врачом в следующих случаях, прежде чем принимать Азитромицин Фармлэнд:

- Если у Вас есть или когда-либо были проблемы с сердцем, печенью или почками;
- Если Вы принимаете производные алкалоидов спорыньи: эрготамин, дигидроэрготамин;
- Если Вы беременны или кормите грудью.

Обязательно проинформируйте врача, если при приеме Азитромицина Фармлэнд появились следующие симптомы:

- Сердцебиение в груди или нарушение ритма сердца;
- Головокружение;
- Утомляемость;
- Мышечная слабость.

Немедленно проинформируйте врача если на фоне приема Азитромицина Фармлэнд или по истечении времени после его приема появился жидкий стул! Не принимайте никаких лекарств для лечения расстройства стула до консультации с врачом!

Обязательно скажите врачу, если Вы принимаете любое из перечисленных ниже лекарственных средств. Возможно, будет необходима корректировка дозы или дополнительные обследования:

- Производные алкалоидов спорыньи: эрготамин, дигидроэрготамин;
- Варфарин или другие лекарственные средства для уменьшения свертывания крови;
- Циклоспорин (для угнетения иммунитета);
- Антациды (для снижения кислотности желудка);
- Диоксин (для лечения сердечной недостаточности);
- Аторвастатин (или другие статины);
- Терфенадин (для лечения аллергических реакций).

Проинформируйте врача, если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, не указанные в этом списке.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны или кормите грудью ребенка, подозреваете, что Вы беременны или планируете завести ребенка, обратитесь к врачу за советом, прежде чем принимать этот лекарственный препарат.


Азитромицин можно применять во время беременности и кормления грудью, только когда это крайне необходимо.

Влияние на способность управлять автомобилем и работу с механизмами

Возможно развитие таких побочных эффектов, как галлюцинации, рвота, сонливость, обмороки, судороги, которые могут повлиять на способность управлять автомобилем и механизмами.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Лекарственное средство содержит красители Е102, Е129, которые могут вызывать аллергические реакции.



Этот препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 500 мг, то есть, по сути, не содержит натрия.

Как принимать Азитромицин Фармлэнд

Принимайте Азитромицин Фармлэнд строго по назначению врача. Если Вы в чем-то не уверены, спросите еще раз.

Азитромицин Фармлэнд принимают внутрь, не разжевывая, 1 раз в день, за час до еды или через два часа после еды, так как пища влияет на всасывание азитромицина.

Обычная доза для взрослых, включая пациентов пожилого возраста, и детей с массой тела > 45 кг:

500 мг 1 раз в день в течение 3-х дней.

При различных заболеваниях врач может назначить дозы и режим лечения, отличающийся от вышеуказанного. Если Вы в чем-то не уверены, спросите еще раз. Внимательно читайте указание о дозировке на упаковке, это поможет принять необходимое количество таблеток.

Продолжайте лечение в соответствии с назначением врача, даже если почувствовали себя лучше. Если улучшение по завершению назначенного курса лечения не наступило – обратитесь к врачу.

Применение у пациентов с заболеваниями печени или почек. Вы должны сообщить своему врачу, если у Вас есть проблемы с печенью или почками, так как Ваш врач может изменить дозу.

Если Вы приняли дозу Азитромицина Фармлэнд большую, чем рекомендовал врач:

Если количество таблеток в день, которое Вы приняли, превышает то количество, которое рекомендовал Ваш врач, или Ваш ребенок проглотил таблетки, обратитесь к врачу или вызовите Скорую помощь. Передозировка макролидными антибиотиками проявляется потерей слуха, сильной тошнотой, рвотой и поносом. Важно вызвать рвоту и обратиться за медицинской помощью как можно скорее.

Если Вы забыли вовремя принять очередную дозу Азитромицина Фармлэнд:


Примите таблетку, как только вспомнили об этом. Следующую дозу примите в соответствии с назначением врача. Общее количество таблеток Азитромицина Фармлэнд, принятое в течение дня, не должно превышать назначенное врачом. Не принимайте двойную дозу в случае пропуска очередного приема.

Возможные побочные эффекты

Подобно всем лекарственным препаратам Азитромицин Фармлэнд может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если возникают любые описанные ниже симптомы во время лечения Азитромицином Фармлэнд, немедленно прекратите прием лекарства и обратитесь к врачу:

- Жидкий стул в течение длительного времени, возможно, с примесью крови или слизи в нем. Жидкий стул может появиться даже спустя два месяца после приема азитромицина;
- Внезапные хрипы, затрудненное дыхание, отек лица или нарушение глотания, сыпь, зуд, особенно по всему телу. Эти симптомы могут свидетельствовать о проявлении аллергической реакции;
- Тяжелые нарушения со стороны кожи и слизистых: распространенная сыпь на коже, сопровождающаяся покраснением и шелушением, с бугорками под кожей и волдырями, так как это может быть признаком редкой тяжелой реакции, называющейся синдром Стивенса-Джонсона (характеризуется лихорадкой, эрозиями в ротовой полости, сильным воспалением глаз и изменениями кожи по всему телу), признаком токсического эпидермального некролиза (повреждение кожи и слизистых оболочек полости рта, глаз и половых органов, слизистых оболочек кишечника и дыхательных путей) или симптомом острого генерализованного экзантематозного пустулеза;
- Учащенный или нерегулярный сердечный ритм;
- Низкое артериальное давление.



Другие возможные нежелательные реакции, зарегистрированные при применении азитромицина

Очень часто встречающиеся побочные эффекты при приеме азитромицина (могут возникать не менее чем у 1 человека из 10):

- Боли в животе, тошнота, метеоризм;
- Расстройство стула.

Часто встречающиеся побочные эффекты при приеме азитромицина (могут возникать менее чем у 1 человека из 10):


- Головокружение, головная боль;
- Онемение, покалывание;
- Слабость, нарушение пищеварения;
- Рвота, потеря аппетита, нарушения вкуса;
- Нарушение зрения и слуха;
- Боли в суставах;
- Низкое число лимфоцитов, большое количество эозинофилов в крови;

Нечасто встречающиеся побочные эффекты при приеме азитромицина (могут возникать менее чем у 1 человека из 100):

- Грибковые заболевания ротовой полости или половых органов;
- Пневмония, фарингит, другие бактериальные инфекции;
- Гипертермия (лихорадка);
- Гастроэнтерит, ринит;
- Бессонница;
- Низкое число лейкоцитов, нейтрофилов в крови;
- Волдыри на коже, во рту, на губах, глазах или половых органах;
- Чувствительность кожи к солнечному свету;
- Нервозность;
- Звон в ушах;
- Снижение чувствительности;
- Ухудшение слуха, приливы;
- Сильное сердцебиение, боли в груди;
- Запор или боли в желудке, сопровождающиеся жидким стулом и повышенной температурой;
- Гастрит, дисфагия (нарушения глотания), сухость во рту, стоматит, отрыжка, гиперсаливация (усиленное слюноотделение);
- Гепатит (воспаление печени) и изменение печеночных тестов;
- Носовое кровотечение;
- Общая слабость;
- Одышка;
- Отечность;
- Общий дискомфорт;
- Миалгии (боли в мышцах), боли в спине, шее, остеоартрит;
- Дизурия (нарушения мочеиспусканий), боли в области почек
- Нарушение функции яичек;
- Метроррагия (маточное кровотечение);
- Изменения в анализах крови: лейкопения (низкое количество лейкоцитов), нейтропения (низкое количество нейтрофилов).

Редко встречающиеся побочные эффекты при приеме азитромицина (могут возникать менее чем у 1 человека из 1000):

- Низкое число тромбоцитов, эритроцитов в крови;
- Возбуждение, тревожность, агрессивность;
- Судороги, нарушение обоняния, потеря вкуса, мышечная слабость;



- Сонливость, нарушения сна;
- Воспаление поджелудочной железы, изменение цвета языка;
- Печеночная недостаточность, желтуха;
- Почечная недостаточность, воспаление почек;

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- Галлюцинации; психические расстройства с помрачением сознания (делирий);
- Обморок.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Условия хранения

Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять лекарственное средство по истечении срока годности.

Условия отпуска

По рецепту врача.

Упаковка

6 таблеток (для дозировки 250 мг) и 2, 3 или 6 таблеток (для дозировки 500 мг) в банки полимерные с крышкой, натягиваемой с контролем первого вскрытия. Уплотнительное средство – вата медицинская.

По 3 таблетки (для дозировки 500 мг) в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной.

Одна банка (для обеих дозировок), 1 или 2 контурные ячейковые упаковки (для дозировки 500 мг) вместе с листком-вкладышем помещаются во вторичную упаковку.

Информация о производителе

Произведено: «Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Фармлэнд» (СП ООО «Фармлэнд»), Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124 - 3, тел/факс +37517 293-31-90.

