

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)



Земляники лесной листья, измельченное сырье 50 г в пачке
Fragariae vescae folia

Общая характеристика:

кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет кусочков листьев сверху зеленый или темно-зеленый, снизу – сероватый или серовато-зеленый.

Земляники лесной листья содержат: флавоноиды (в основном рутин), витамин С, каротиноиды, витамины группы В, органические кислоты (лимонная, хинная, яблочная), следы эфирного масла, дубильные вещества, соли железа, марганца, кобальта и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие диуретические средства.

Фармакологические свойства. Земляники лесной листья обладают мочегонными и вяжущими свойствами.

Показания к применению.

Внутрь:

-в качестве диуретического средства в комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей легкой степени тяжести;

-для симптоматического лечения нетяжелой диареи.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы.

Применение в качестве диуретического средства в виде отвара:

4-8 г (2-3 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Приготовленный отвар принимать внутрь, разделив суточную дозу (1 стакан (200 мл отвара)) на 2-4 приема.

Применение для симптоматического лечения нетяжелой диареи в виде настоя:

1 г (0,5 столовой ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной

температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимать внутрь по 1 стакану (200 мл) настоя 2-3 раза в день.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Перед употреблением отвар/настоя рекомендуется взбалтывать.

Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца и/или почек).

Применение во время беременности и кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Применение у детей. В связи с отсутствием достаточных данных не рекомендуется детям до 12 лет.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует.


Меры предосторожности.

Применение в качестве диуретического средства в виде отвара: во время приема лекарственного средства необходимо обеспечить адекватный прием жидкости. Если во время приема отвара симптомы сохраняются более 2 недель или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются расстройства мочеиспускания, боли спастического характера, кровь в моче), необходимо прекратить прием отвара и обратиться к врачу.

Применение для симптоматического лечения нетяжелой диареи в виде настоя:

если во время приема настоя симптомы сохраняются более 3 дней или происходит ухудшение состояния, а также в случае появления крови в кале или рецидива диареи, необходимо прекратить прием настоя и обратиться к врачу.

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.



Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Информация отсутствует. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте, при температуре 15°C–25°C. Приготовленный отвар/настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

Срок годности. 3 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

Упаковка. По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biotest.by

