

**Инструкция
по медицинскому применению лекарственного средства**

СОРБЕНТОГЕЛЬ

Торговое название
СОРБЕНТОГЕЛЬ

Международное непатентованное название
Polymethylsiloxane polyhydrate

Форма выпуска

Гель для приема внутрь 0,7 г/г.

Состав

1 г геля содержит:

активное вещество: полиметилсилоксана полигидрат 0,7 г;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Описание

Однородная гелеподобная масса от белого до почти белого цвета без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Противодиарейные средства, кишечные противовоспалительные/противоинфекционные средства. Кишечные адсорбенты.

Код АТС: А07В

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Полиметилсилоксана полигидрат (гидрогель метилкремниевой кислоты) - инертное кремнийорганическое соединение. При приеме внутрь оказывает сорбционное действие. Лекарственное средство эффективно адсорбирует среднемолекулярные токсические вещества экзо- и эндогенного происхождения, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированные радионуклиды и естественным путем выводит их из организма. Сорбентогель не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов из кишечника и не влияет на его моторику

Сорбентогель устраняет проявления токсикоза, улучшает детоксикационную функцию кишечника, печени, почек, нормализует показатели крови и мочи.


Покрывая слизистую оболочку желудка и кишечника, гель защищает ее от эрозивных процессов, способствует повышению локального иммунитета.


Фармакокинетика. Сорбентогель не всасывается из кишечника и не подвергается метаболическим или химическим превращениям. Выводится из организма в неизменном виде в течение 12 часов.

Показания к применению

Сорбентогель применяют у детей и взрослых в составе комплексной дезинтоксикационной терапии при:

- хронической почечной недостаточности;
- токсическом гепатите, вирусных гепатитах А, В, циррозе печени и холестазах различной этиологии;
- энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью;
- отравлении алкоголем и наркотическими средствами;
- аллергических и кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты);





- ожоговой интоксикации;
- гнойно-септических и воспалительных процессах, сопровождающихся интоксикацией;
- токсикозах беременных первой половины беременности;
- в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

Способ применения и дозы

Сорбентогель применяют внутрь 3 раза в сутки за 1,5-2 часа до или через 2 часа после еды или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.

Взрослые и подростки старше 14 лет: разовая доза составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза - 45 г.

Детям в возрасте от 5 до 14 лет: разовая доза - 10 г (десертная ложка), суточная доза - 30 г.

Дети от рождения до 5 лет: разовая - 5 г (чайная ложка), суточная доза - 15 г.

Курс лечения - от 7 до 14 суток.

При тяжелых формах заболеваний в течение первых трех суток можно применять двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более длительное (до 1 месяца) применение препарата.

Применение у детей

Сорбентогель можно применять детям от рождения. Детям в возрасте до 2 лет перед применением разовую дозу геля можно смешивать с небольшим количеством воды.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны. При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

При приеме Сорбентогеля возможны диспепсические явления. В первые дни приема возможно развитие запора. Для его предотвращения пациентам, склонным к запору, в первые два дня приема рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактолоза, пикосульфат натрия).

Противопоказания

- Острая кишечная непроходимость.
- Индивидуальная непереносимость препарата.
- Атония кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий


Сорбентогель может снижать действие других лекарственных средств, которые применяются вместе с ним.

Не рекомендуется одновременный прием с лекарственными средствами, которые принадлежат к классу секвестрантов желчных кислот, например, с холестирамином, в связи с усилением вероятности развития запоров.

Сорбентогель не следует применять вместе с препаратами серебра.

Меры предосторожности

При условии соблюдения способа применения (другие лекарственные средства принимают с интервалом 1,5-2 часа), Сорбентогель можно назначать в комплексной терапии с другими лекарственными и профилактическими средствами, в том числе с пребиотиками и пробиотиками (бифидум-, лактобактерии), фитопрепаратами, адаптогенами, иммуномо-



дуляторами.

В случае появления лихорадки, крови в стуле, признаков обезвоживания, диареи и рвоты одновременно или сильной и постоянной боли в животе, необходимо обратиться к врачу. Рекомендуется употреблять воду или раствор для пероральной регидратации во время лечения Сорбентогелем, чтобы обеспечить правильный жидкостной баланс в организме. Не рекомендуется использовать Сорбентогель при остром химическом отравлении или при передозировке другими лекарственными средствами.

Применение в период беременности и лактации

Сорбентогель не противопоказан в период беременности и лактации. Необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать Сорбентогель.

Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами

Не влияет.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 135 г или 270 г геля в контейнере из полимерного материала, запаянном крышкой из фольги алюминиевой и укупоренном навинчивающейся крышкой из полимерного материала. Один контейнер вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C.

Не замораживать.

После первого вскрытия контейнера хранить при температуре не выше 25°C, плотно закрыв крышку контейнера. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта.

Информация о производителе (заявителе)

Произведено и расфасовано

ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина
61013, Харьковская, обл., г. Харьков, ул. Шевченко, д. 22.

Упаковано

ООО «Белалек», Республика Беларусь
222223, Минская область, Смолевичский район,
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»;
тел.: +37544777701
e-mail: info@belalek.by