

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



## Л И С Т О К – В К Л А Д Ы Ш по медицинскому применению лекарственного средства **Женьшения настойка** **для внутреннего применения**

**Название лекарственного средства** Женьшения настойка.

**Название лекарственной формы** Настойка для внутреннего применения.

**Общая характеристика** Прозрачная жидкость желтого цвета. В процессе хранения допускается выпадение осадка.

### **Состав лекарственного средства**

Спиртовое извлечение из корней женьшения 1:10.

Лекарственное растение женьшень принадлежит к роду Женьшень, виду Женьшень обыкновенный (*Panax ginseng* C.A.Meyer).

Содержит не менее 65 % этанола.

**Фармакотерапевтическая группа** Общетонизирующие средства.

### **Фармакологические свойства**

Фармакологическая активность обусловлена содержанием сапониновых гликозидов-гиссенозидов, эфирных и жирных масел, стеролов, пептидов, витаминов и минералов. Стимулирует центральную нервную систему, повышает артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, стимулирует аппетит, стимулирует половую функцию. Снижает содержание глюкозы в крови, активирует деятельность надпочечников.

### **Показания к применению**

В комплексной терапии астенических состояний, сниженной умственной и физической работоспособности, эректильной дисфункции неврастенического генеза.

### **Способ применения и дозировка**

Внутрь, за 30-40 минут до еды.

Применяют по 15-20 капель настойки 2-3 раза в день в течение 30-40 дней. В 1 мл содержится около 29 капель настойки.

Длительность курса лечения определяется врачом с учётом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Не рекомендуется применять настойку в течение длительного времени из-за содержания этанола. Во время лечения необходимо избегать приема других этанолсодержащих средств. Перед употреблением взбалтывать.

*Особенности применения у пожилых пациентов:* не изучены.

*Особенности применения у лиц с нарушенной функцией почек:* не изучены.

*Особенности применения у лиц с нарушенной функцией печени:* с осторожностью.

### **Побочное действие**

*Со стороны пищеварительной системы:* боли в животе, тошнота, рвота, диарея, запор.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* повышение артериального давления, тахикардия.

*Со стороны центральной нервной системы:* головная боль, нервозность, бессонница.

*Прочие:* аллергические реакции, носовое кровотечение, гипогликемия.

### *Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях*

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данной инструкции по

медицинскому применению. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности лекарственного средства.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, артериальная гипертензия, тахикардия, повышенная возбудимость, эпилепсия, судорожные состояния, алкоголизм, черепно-мозговая травма и другие заболевания головного мозга со снижением судорожного порога, бессонница, кровоточивость, острые инфекционные заболевания, хронические заболевания печени, цирроз печени, детский возраст до 18 лет, беременность, период лактации.

### **Применение при беременности и лактации**

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных и содержанием этилового спирта, применять во время беременности и лактации не рекомендуется.

### **Применение у детей**

В связи с отсутствием достаточных данных, лекарственное средство не рекомендовано для назначения детям и подросткам до 18 лет.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами**

Лекарственное средство содержит этиловый спирт! В период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Передозировка**

**Симптомы:** повышение артериального давления, бессонница.

**Лечение:** отмена препарата, симптоматическое лечение.

### **Меры предосторожности**

Не следует применять во второй половине дня во избежание нарушения сна.

Особенности применения у пожилых людей не изучены.

Если во время приема лекарственного средства в течение 2 недель симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Пациентам с сахарным диабетом перед приемом лекарственного средства следует проконсультироваться с врачом, так как прием настойки женьшеня может привести к небольшому снижению уровня глюкозы в крови.

Лекарственное средство содержит не менее 65 % этанола, то есть 265-354 мг на разовую дозу 15-20 капель, что равно 6,7 мл и 9 мл пива или 2,8 мл и 3,7 мл вина на дозу. Вредно для лиц с алкоголизмом. В связи с содержанием этилового спирта лекарственное средство не следует принимать пациентам с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, черепно-мозговой травмой и другими заболеваниями головного мозга со снижением судорожного порога, беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При одновременном применении настойка женьшеня:

- усиливает действие психостимуляторов и аналептиков;
- проявляет антагонизм с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему (противоэпилептические лекарственные средства, антипсихотические средства, анксиолитики, седативные лекарственные средства);
- усиливает эффект гипогликемических лекарственных средств;
- усиливает действие варфарина;
- повышает риск развития резистентности к петлевым диуретикам.

Следует соблюдать осторожность в случае необходимости одновременного приема с ингибиторами МАО.

Взаимодействия, связанные с наличием в составе этилового спирта:

- лекарственные средства, вызывающие дисульфирамоподобную реакцию (ощущение жара, покраснение кожных покровов, рвота, тахикардия) при совместном приеме с алкоголем:

дисульфирам, цефамандол, цефоперазон, латамоксифен, хлорамфеникол, хлорпропамид, глибенкламид, глипизид, толбутамид и другие гипогликемические препараты, гризофульвиин, метронидазол, орнидазол, тинидазол, кетоконазол, прокарбазин;

- лекарственные средства, угнетающие функции центральной нервной системы.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и срок хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускается без рецепта.

**Упаковка**

30 мл во флаконах из стекломассы оранжевого цвета укупоренные пробками капельницами ПКП 12 и крышками навинчивающимися с листком-вкладышем в упаковке № 1.

50 мл во флаконах из стекломассы оранжевого цвета укупоренные пробками капельницами ПКП 12 и крышками навинчивающимися с листком-вкладышем в упаковке № 1.

**Производитель**

СОАО «Ферайн»,

Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С. Ковалевской, 52 а,

тел./факс +375 17 222-92-18, , тел +375 17 222-97-73, +375 17 213-12-58,

e-mail:office@ferane.by