

1335 Б-2020

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**Натрия хлорид, 9 мг/мл, раствор для инъекций**


Действующее вещество: натрия хлорид

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Натрия хлорид, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Натрия хлорид.
3. Применение препарата Натрия хлорид.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Натрия хлорид.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ НАТРИЯ ХЛОРИД, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Препарат Натрия хлорид содержит действующее вещество натрия хлорид.

Ионы натрия и хлора являются важнейшими неорганическими компонентами внеклеточной жидкости, поддерживающими соответствующее осмотическое давление плазмы крови и внеклеточной жидкости. Изотоничен плазме крови.

Показания к применению

Препарат Натрия хлорид предназначен для растворения и разведения лекарственных препаратов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА НАТРИЯ ХЛОРИД**Не применяйте препарат Натрия хлорид:**

- если у Вас аллергия к действующему веществу или к любым другим компонентам препарата (перечисленным в разделе 6 листка-вкладыша);

- если препарат Натрия хлорид несовместим с растворимым лекарственным препаратом;
- если в качестве обязательного растворителя лекарственных препаратов указан другой растворитель.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Натрия хлорид проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Перед растворением/разведением лекарственного препарата в растворе натрия хлорида следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению лекарственного препарата.

Приготовленный раствор лекарственного препарата следует использовать незамедлительно, хранению не подлежит.

Другие препараты и препарат Натрия хлорид

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение в период беременности и в период грудного вскармливания определяется инструкцией того препарата, для растворения/разведения которого будет применяться препарат Натрия хлорид.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами определяется инструкцией того препарата, для растворения/разведения которого применяется препарат Натрия хлорид.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА НАТРИЯ ХЛОРИД

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Количество раствора натрия хлорида, необходимого для приготовления раствора конкретного лекарственного препарата, определяется инструкцией по применению лекарственного препарата, для растворения или разведения которого применяется натрия хлорид, или в зависимости от ситуации – врачом.

Путь и (или) способ введения

Применяют внутривенно, внутримышечно, подкожно в зависимости от способа введения основного лекарственного препарата.

Продолжительность терапии

Продолжительность терапии определяется инструкцией по применению основного лекарственного препарата.

Если Вы применили препарата Натрия хлорид больше, чем следовало

Не вводите препарата Натрия хлорид больше, чем Вам назначил лечащий врач. При применении Натрия хлорид в качестве растворителя лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией – случаи передозировки не выявлены.

При наличии вопросов по применению препарата Натрия хлорид, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Натрия хлорид может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении в рекомендуемых объемах в качестве растворителя лекарственных препаратов – нежелательные реакции не ожидаются.

Частота неизвестна (невозможно оценить на основании имеющихся данных):

– боль и реакции в месте введения.

При избытке натрия хлорида (при введении в больших количествах):

- тошнота,
- рвота,
- диарея,
- спазмы в животе,
- жажда,
- снижение слюнных и слезных выделений,
- потоотделение,
- лихорадка,
- пониженное кровяное давление,
- учащенное сердцебиение,
- почечная недостаточность,
- отеки ног и легочные отеки,
- остановка дыхания,
- головная боль,
- головокружение,
- беспокойство,
- раздражительность,
- слабость,
- мышечные подергивания и повышенный тонус мышц, затрудняющий их подвижность,
- судороги,
- кома и смерть.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, работником аптеки или медицинской сестрой. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на

1335 Б-2020

лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь


Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон/факс: +375 (17) 242-00-29;

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>



5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА НАТРИЯ ХЛОРИД

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Вскрытая ампула не подлежит хранению.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

1 мл препарата содержит действующего вещества натрия хлорид 9 мг.

Одна ампула (5 мл) препарата содержит действующего вещества натрия хлорид 45 мг.

Вспомогательное вещество: вода для инъекций – до 5 мл.

Прозрачный бесцветный раствор.

По 5 мл в ампулы из стекла.

По 5 ампул помещают во вкладыш из поливинилхлоридной пленки.

2 вкладыша из поливинилхлоридной пленки с ампулами вместе с листком-вкладышем и ножом ампульным или скарификатором помещают в пачку из картона.

При использовании ампул с насечкой, точкой, кольцом разлома нож ампульный или скарификатор не вкладывают.

Условия отпуска

По рецепту врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

СОО «Ферейн»

220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 52А

тел./факс: +375 17 394-92-18

e-mail: office@ferane.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Данный листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в ОХЛП на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by
Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by

(линия отрыва или отреза)

Следующие сведения предназначены исключительно для медицинских работников:

Особые указания и меры предосторожности при применении

Препарат использовать непосредственно после вскрытия ампулы или после приготовления готовых к применению лекарственных форм.

Ампулы только для однократового применения. Оставшиеся неиспользованные объемы препарата подлежат уничтожению. Раствор использовать только, если он прозрачен и ампула не повреждена.

С точки зрения микробиологической безопасности готовые к применению лекарственные формы, полученные при разведении/разбавлении препаратом Натрия хлорид с соблюдением правил асептики, должны быть использованы немедленно.

Препарат следует назначать с осторожностью пациентам с застойной сердечной недостаточностью, преэклампсией, нарушением функции почек или отеками с задержкой натрия. Также необходимо соблюдать осторожность при применении этого лекарственного препарата для молодых или пожилых пациентов.

Другие препараты и препарат Натрия хлорид

Препарат Натрия хлорид совместим с коллоидными гемодинамическими кровезаменителями. При смешивании с другими лекарственными препаратами или концентратами электролитов необходимо визуально контролировать совместимость. Может иметь место невидимая и терапевтическая несовместимость.