

Инструкция по медицинскому применению листок-вкладыш

ИБУФЛЕКС 200 таблетки, покрытые оболочкой 200 мг Действующее вещество: ибупрофен

- Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.
- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Ибуфлекс 200 и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Ибуфлекс 200.
3. Применение препарата Ибуфлекс 200.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ибуфлекс 200.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ИБУФЛЕКС 200 И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Ибуфлекс 200 содержит действующее вещество ибупрофен.

Ибупрофен – нестериоидный противовоспалительный лекарственный препарат (НПВП), обладает противовоспалительной, обезболивающей и жаропонижающей активностью.

Фармакотерапевтическая группа: Нестериоидные противовоспалительные и противоревматические препараты. Производные пропионовой кислоты. Ибупрофен.

Показания к применению:

Ибуфлекс 200 применяется для лечения у взрослых и детей старше 12 лет при:

- головных болях, в том числе мигрени,
- болях в спине,
- зубной боли,
- невралгии,
- болезненных менструациях,
- ревматических, мышечных болях и болях в суставах слабой и умеренной интенсивности,
- повышенной температуре тела и симптомах простуды и гриппа.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу через 3 дня для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет и через 10 дней для взрослых.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ИБУФЛЕКС 200

Не применяйте препарат Ибуфлекс 200 если у вас:

- аллергия на ибuprofen или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- была раньше аллергия (например, астма, хрипы или одышка, насморк, отек лица, зудящая сыпь) после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- в настоящее время есть или было (два или более эпизода) язвы желудка, язвы кишечника или желудочно-кишечное кровотечение;
- было в прошлом кровотечение или перфорация язвы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вызванные приемом НПВП;
- тяжелая сердечная недостаточность (IV класс по NYHA), почечная недостаточность или печеночная недостаточность;
- последние три месяца беременности.
- детский возраст до 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

С целью минимизации рисков развития нежелательных реакций, ибuprofen следует принимать в минимальной эффективной дозе и на протяжении минимально короткого периода, необходимого для достижения клинического эффекта.

Перед применением препарата Ибуфлекс 200 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работникам аптеки, если вы:

- страдаете или страдали астмой;
- у вас проблемы с почками, сердцем, печенью или кишечником;
- у вас высокий уровень холестерина или ранее был сердечный приступ или инсульт;
- имеете в анамнезе заболевания желудочно-кишечного тракта (такие как язвенный колит, болезнь Крона);
- у вас системная красная волчанка (заболевание иммунной системы, вызывающее боль в суставах, изменения кожи и других органов);
- курильщик;
- беременны;
- у вас инфекция. Этот препарат может скрывать признаки инфекции такие как лихорадка и боль. Поэтому возможно, что данный препарат может отсрочить соответствующее лечение инфекции, что может привести к повышенному риску осложнений. Это наблюдалось при пневмонии, вызванной бактериями, и бактериальных инфекциях кожи, связанных с ветряной оспой. Если вы принимаете это лекарство во время инфекция и симптомы инфекции сохраняются или ухудшаются, незамедлительно обратитесь к врачу.

Кожные реакции

Сообщалось о серьезных кожных реакциях в связи с лечением ибuprofenом. Вам следует прекратить прием таблеток Ибуфлекс 200 и немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас появилась какая-либо кожная сыпь, поражения слизистых оболочек, волдыри или другие признаки аллергии, поскольку это может быть первым признаком очень серьезной кожной реакции (см. раздел 4).

Дети и подростки

Не применяйте Ибуфлекс 200 у детей в возрасте до 12 лет, потому что безопасность и эффективность данного препарата у детей в возрасте до 12 лет не установлены.

Другие препараты и препарат Ибуфлекс 200

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или если вы планируете принимать другие лекарственные препараты, в том числе, препараты, отпускаемые без рецепта.

Чтобы снизить риск нежелательных реакций, не принимайте Ибуфлекс 200 с другими препаратами, содержащие НПВП (например, аспирин, ибuprofen...). Если вы постоянно принимаете низкие дозы ацетилсалициловой кислоты (до 75 мг в день), поговорите со своим врачом, прежде чем принимать Ибуфлекс 200.

Ибуфлекс 200 может влиять на некоторые другие лекарственные препараты.

Избегайте приема Ибуфлекс 200 с:

- кортикостероидами;
- хинолоновыми антибиотиками;
- антикоагулянтами (препараты, которые разжижают кровь/препятствуют свертыванию, например, аспирин/ацетилсалициловая кислота, варфарин, тиклопидин);
- сердечными гликозидами, такие как дигоксин, используемые для лечения заболеваний сердца;
- препаратами, снижающими высокое кровяное давление (ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (АПФ), такие как каптоприл, бета-блокаторы, такие как атенолол, антагонисты рецепторов ангиотензина-II, такие как лозартан);
- диуретиками (мочегонные препараты);
- препаратами для временного подавления иммунной системы (например, метотрексат, циклоспорин, такролимус);
- препаратами для лечения мании или депрессии (например, литий или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина);
- препаратами для прерывания беременности (например, мифепристон);
- препаратами для лечения ВИЧ (например, зидовудин).

Некоторые другие препараты также могут влиять на лечение препаратом Ибуфлекс 200. Поэтому вы всегда должны обратиться к врачу или работнику аптеки перед использованием этого препарата с другими лекарствами.

Другие предупреждения

- Данный лекарственный препарат относится к группе лекарств, которые могут ухудшить fertильность у женщин. Это обратимо после прекращения приема препарата. Маловероятно, что это лекарство, применяемое время от времени, повлияет на ваши шансы забеременеть. Тем не менее, сообщите своему врачу, если у вас есть проблемы с наступлением беременности.
- Противовоспалительные/болеутоляющие препараты, такие как ибuproфен, могут быть связаны с небольшим повышенным риском сердечного приступа или инсульта, особенно при использовании высоких доз. Не превышайте рекомендованную дозу или продолжительность лечения.
- Вы должны обсудить свое лечение с врачом или работником аптеки перед приемом этого препарата, если у вас:
 - есть проблемы с сердцем, включая сердечную недостаточность, стенокардию (боль в груди или если у вас был сердечный приступ, операция шунтирования, заболевание периферических артерий (нарушение кровообращения в ногах или ступнях из-за сужения или закупорки артерий), или любой вид инсульта (включая «мини-инсульт» или транзиторную ишемическую атаку).
 - высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина, есть семейная история сердечных заболеваний или инсульта, или если вы курите.
 - существует риск развития почечной недостаточности у обезвоженных детей и подростков.

Ибуфлекс 200 с пищей, напитками и алкоголем

В период лечения препаратом Ибуфлекс 200 не рекомендуется прием алкоголя, так как это может усилить нежелательные реакции препарата, особенно влияние на желудочно-кишечный тракт или центральную нервную систему.

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата Ибуфлекс 200 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В течение первых шести месяцев беременности применение лекарственного препарата не рекомендуется. Он может применяться только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Рекомендуется избегать применения НПВП с 20 недели беременности в связи с возможным развитием нарушений функции почек у плода, что может привести к развитию маловодия, а в некоторых случаях, к почечной недостаточности у новорожденного. Если лечащий врач считает, что применение НПВП необходимо между 20 и 30 неделями беременности, прием необходимо ограничить минимальной эффективной дозой в течение кратчайшего периода времени. А также

следует рассмотреть возможность проведения ультразвукового исследования околоплодных вод при применении НПВП более 48 часов.

В течение трех последних месяцев беременности прием лекарственного препарата противопоказан, так как это может повышать риск наступления осложнений у матери и у новорожденного ребенка.

Лекарственный препарат в небольших количествах может выделяться с грудным молоком. По возможности следует избегать приема препарата при грудном вскармливании.

Существует небольшая вероятность того, что применение ибупрофена, как и любого НПВП, может повлиять на fertильность. Препарат не следует применять при наличии трудностей с наступлением беременности или при прохождении обследования по поводу бесплодия.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При условии применения согласно рекомендованным дозам и продолжительности лечения лекарственный препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ИБУФЛЕКС 200

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

С целью уменьшения рисков развития нежелательных реакций, ибупрофен следует принимать в минимальной эффективной дозе и на протяжении минимально короткого периода, необходимого для достижения клинического эффекта. Если при применении лекарственного препарата симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу.

Рекомендуемая доза

Взрослые, дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет: по 1 или 2 таблетки, при необходимости, до 3 раз в день.

Интервал между приемом таблеток должен составлять не менее 6 ч.

Не принимать более 6 таблеток за 24 часа.

При необходимости приема лекарственного препарата у детей и подростков в течение более 3 дней и у взрослых в течение более 10 дней или при ухудшении наблюдающихся симптомов следует обратиться к врачу для уточнения диагноза.

Не использовать у детей до 12 лет.

Пациенты пожилого возраста:

Пожилые люди подвергаются повышенному риску серьезных нежелательных реакций. При необходимости применения нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) нужно использовать самую низкую эффективную дозу в течение минимального срока. Во время терапии НПВП пациент должен регулярно проверяться на желудочно-кишечные кровотечения.

Пациенты с почечной недостаточностью:

У пациентов с нарушением функции почек легкой и средней степени тяжести (клиренс креатинина 30-80 мл/мин) снижения дозы не требуется. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина меньше 30 мл/мин) назначение ибупрофена противопоказано.

Пациенты с печеночной недостаточностью:

У пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести снижение дозы не требуется. При тяжелой печеночной недостаточности назначение ибупрофена противопоказано.

Путь и способ введения

Таблетки для приема во внутрь. Ибуфлекс 200 следует принимать во время или после еды, не разжевывая, запивая стаканом воды.

Продолжительность терапии

Лекарственный препарат нельзя применять более 10 дней (для взрослых) или более 3 дней (для детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет) без консультации с врачом.

Если вы приняли препарата Ибуфлекс 200 больше, чем следовало

Применяйте Ибуфлекс 200 в соответствии с рекомендациями врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату. Если вы не ощущаете соответствующего ослабления боли после применения препарата, не увеличивайте его дозу самостоятельно, обратитесь к лечащему врачу. *Возможные симптомы передозировки:* тошнота, рвота, боли в верхней части живота, понос, желудочно-кишечное кровотечение, шум в ушах, головные боли, сонливость или возбужденное состояние, судороги, кома. При тяжелом отравлении может развиться острая почечная недостаточность и нарушение функции печени.

При подозрении на передозировку препаратом Ибуфлекс 200 немедленно обратитесь к врачу. В зависимости от степени отравления, врач сможет принять решение о принятии необходимых мер. В течение 1 часа после приема потенциально токсической дозы ибупрофена рекомендуется принять внутрь активированный уголь.

Если вы забыли принять Ибуфлекс 200

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам Ибуфлекс 200 может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Вы можете свести к минимуму риск нежелательных реакций, принимая наименьшее количество таблеток в течение короткого периода времени, необходимого для контроля симптомов.

Прекратите прием таблеток Ибуфлекс 200 и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас возникнут:

- признаки кишечного кровотечения, такие как появление крови в кале, появление черного дегтеобразного кала, рвота кровью или темными частицами, похожими на кофейную гущу.
- признаки серьезной аллергической реакции, такие как затрудненное дыхание или необъяснимые хрипы, головокружение или учащенное сердцебиение; тяжелые формы кожных реакций, такие как зуд, кожная сыпь с покраснением, шелушением или волдырями (синдром Стивена-Джонсона); отек лица, языка или горла;
- признаки проблем с почками, такие как меньшее или большее количество мочи; мутная моча или кровь в моче; боль в спине и/или отеки;
- признаки асептического менингита: ригидность шеи, головная боль, чувство недомогания, плохое самочувствие, лихорадка или потеря сознания. Пациенты с аутоиммунными заболеваниями (например, системная красная волчанка (СКВ)) могут быть более подвержены этому заболеванию.
- тяжелая кожная реакция, известная как DRESS-синдром (синдром лекарственной гиперчувствительности), включающий кожную сыпь, лихорадку, опухание лимфатических узлов и увеличение количества эозинофилов (тип белых кровяных телец).
- красная, чешуйчатая распространенная сыпь с бугорками под кожей и волдырями, локализованными в основном на складках кожи, туловище и верхней части тела (острый генерализованный экзантематозный пустулез).

При приеме препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):


- Аллергические реакции: крапивница (волдыри на коже) и зуд;
- Головная боль;
- Ощущение дискомфорта и боли в животе, тошнота;
- Различные кожные высыпания.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- Понос, вздутие живота, запор, рвота.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- Нарушения кроветворения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз). Первыми симптомами таких нарушений являются лихорадка, боль в горле,



поверхностные язвы, гриппоподобные симптомы, выраженная слабость, кровотечения из носа и подкожные кровоизлияния;

- Тяжелые аллергические реакции. Симптомами могут быть отек лица, языка и горлани, одышка, учащенное сердцебиение, снижение артериального давления;

- Асептический менингит (воспаление оболочек головного мозга);

- Язвенная болезнь, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение, дегтеобразный стул, рвота кровью, иногда с летальным исходом, особенно у пожилых людей, воспаление слизистой полости рта с изъязвлением, гастрит;

- Нарушения функции печени;

- Острое нарушение функции почек, особенно при продолжительном применении, протекающее с повышением уровня мочевины в сыворотке крови и отеками;

- Тяжелые формы кожных реакций (например, мультиформная эритема, буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз).

- Снижение уровня гемоглобина.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- Реакция дыхательных путей: астма, спазм бронхов или удушье;

- Сердечная недостаточность и отеки;

- Повышение артериального давления;

- Обострение колита и болезни Крона;

- Почечная недостаточность;

- Реакция на лекарственный препарат с эозинофилией и системными симптомами (синдром DRESS). Красная чешуйчатая распространенная сыпь, выступающая над поверхностью кожи, волдыри, расположенные в основном на кожных складках, туловище и верхних конечностях, сопровождаемая лихорадкой в начале лечения (острый генерализованный экзантематозный пустулез).

Необходимо прекратить прием Ибуфлекс 200 и немедленно обратиться к врачу, если появились описанные симптомы.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», www.rceth.by.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ИБУФЛЕКС 200

Срок годности 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света месте.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовым мусором. Проконсультируйтесь с работником аптеки о том, как утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Ибуфлекс 200 содержит

Действующим веществом препарата является ибuprofen.

1 таблетка содержит 200 мг ибuprofена.

Вспомогательные вещества: целлULOЗА микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, кукурузный крахмал, оболочка (поливиниловый спирт, макрогол,

тальк, титана диоксид).

Внешний вид препарата Ибуфлекс 200 и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые оболочкой, белого или белого с сероватым оттенком цвета, цилиндрические, двояковыпуклые.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из полимерной пленки ПВХ и фольги алюминиевой. Одну, две, три или пять контурных ячейковых упаковок в картонной пачке с инструкцией по применению.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,

210002, г. Витебск, ул. М.Горького, 62Б,

тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77, e-mail: secretar@rubikon.by

Данный листок-вкладыш пересмотрен

ММ/ГГГГ*.

* – Указывается дата одобрения последнего изменения. Поле заполняется держателем регистрационного удостоверения перед печатью.

