



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
Фитолэнд сироп алтея

Прочтите внимательно этот Листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Перед приёмом лекарственного средства полностью прочтайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержится важные для Вас сведения.

Всегда принимайте лекарственное средство в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача.

Сохраните листок-вкладыш. Возможна, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Если у Вас возникли какие-либо неожиданные реакции, обратитесь к врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные неожиданные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Если Ваше состояние не улучшается или ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Международное непатентованное название: Althaea radix.

Форма выпуска: сироп.

Описание: вязкая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом алтея. Допускается образование осадка и/или помутнение.

Состав на 100 мл сиропа:

Действующие вещества: алтея корней экстракт сухой (экстрагент – вода) (5:1) – 6,50 г;

Вспомогательные вещества: фруктоза, калия сорбат (E202), лимонная кислота моногидрат (E330), вода очищенная.

Состав на 250 мл сиропа:

Действующие вещества: алтея корней экстракт сухой (экстрагент – вода) (5:1) – 16,25 г;

Вспомогательные вещества: фруктоза, калия сорбат (E202), лимонная кислота моногидрат (E330), вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающие средства.

Код ATX: R05CA05.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Лекарственное средство обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Полисахариды, входящие в состав корня алтея, оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, способствуют уменьшению раздражения слизистой оболочки ротовой полости, глотки и связанного с ним сухого кашля.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Для дозирования сиропа следует использовать входящее в состав упаковки дозирующее устройство (мерный стаканчик).

Перед употреблением взбалтывать.

Внутрь, 3 раза в день после еды, предварительно развести в 1/4-1/2 стакана кипяченой воды:

- детям от 3 до 6 лет по 5 мл;
- детям от 6 до 18 лет по 10 мл;
- взрослым по 15 мл.

Продолжительность приёма лекарственного средства определяется врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить приём лекарственного средства и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТОМ НЕСПОСЛЕДСТВУЮЩИХ УКАЗАННЫХ В

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, детский возраст до 3-х лет.

Не следует применять при врожденной непереносимости фруктозы.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки рекомендовано обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Если во время приёма лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (появляются нарушения дыхания, поднимается температура, появляется кашель с гнойной мокротой) необходимо обратиться к врачу.

Безопасность применения у пациентов с заболеваниями почек и/или печени не установлена, данным пациентам необходимо назначать лекарственное средство с осторожностью.

В дозе сиропа объёмом 5 мл содержится 4,1 г фруктозы; в дозе объёмом 10 мл – 8,2 г фруктозы; в дозе объёмом 15 мл – 12,3 г фруктозы. Данное количество фруктозы следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать данное лекарственное средство.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ

Исследования по оценке влияния приёма лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не проводились.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Не следует принимать одновременно с лекарственными средствами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми лекарственными средствами. Может уменьшиться всасывание других лекарственных средств, принимаемых одновременно. В качестве меры предосторожности лекарственное средство «Фитолэнд сироп алтея» не следует принимать за 0,5 часа – 1 час до или после приёма других лекарственных средств.

Условия хранения: хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать в течение 20 суток после вскрытия флакона.

Срок годности: 2 года. Не применять лекарственное средство по истечении срока годности.

Условия отпуска: Без рецепта.

Упаковка: по 100 мл или 250 мл во флаконах из полиэтилентерефталата упакованных вместе с листком-вкладышем и мерным стаканчиком во вторичную упаковку из картонной хранения

Приказ Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

Информация о производителе: Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»), Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3; тел/факс (017) 373-31-90.