

НД РБ

21106-2020



**Инструкция по медицинскому применению
ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**

ПАНТЕСЕПТ,

16 мг/100 мг суппозитории вагинальные

Действующие вещества: хлоргексидин 16 мг, декспантенол 100 мг

Перед применением данного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Пантесепт и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Пантесепт.
3. Применение препарата Пантесепт.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Пантесепт.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ПАНТЕСЕПТ
И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Лекарственный препарат Пантесепт содержит хлоргексидина биглюконат и декспантенол.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии (исключая комбинации с кортикоステроидами). Прочие противомикробные и антисептические средства.

Хлоргексидин обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (не влияет на кислотоустойчивые формы последних): *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, простейших (*Trichomonas vaginalis*), микробных спор, вирусов, грибов; слабо влияет на некоторые виды протея и псевдомонад. Сохраняет активность (несколько сниженную) в присутствии крови, гноя.

Декспантенол является провитамином *B₅*. При местном применении способствует регенерации кожи и слизистых оболочек.

Показания к применению:

- Острые и хронические вагиниты.
- Бактериальный вагиноз.
- Неспецифические эндо/экзоцервициты (в том числе в сочетании с истинной эрозией шейки

21106 - 2020

матки).

– Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии: перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, родоразрешением, медицинским прерыванием беременности, внутриматочными обследованиями (в том числе гистероскопии, гистеросальпингографии), перед установкой внутриматочного контрацептива.

– Для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктивных методов лечения (диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ПАНТЕСЕПТ

Не применяйте препарат Пантесепт

– если у вас аллергия на хлоргексидин и/или декспантенол или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Пантесепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов.

До и после применения препарата следует вымыть руки.

Другие препараты и препарат Пантесепт

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-то другие препараты.

Не следует применять Пантесепт одновременно с другими антисептиками, вводимыми интравагинально.

Препарат Пантесепт не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально.

Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Пантесепт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Специальных клинических исследований по применению препарата Пантесепт у беременных женщин и в период грудного вскармливания не проводилось. Исследования на лабораторных животных не продемонстрировали вредного воздействия декспантенола и хлоргексидина на течение беременности, развитие эмбриона, роды или послеродовый период. Применение при беременности и в период лактации допустимо в случае, когда ожидаемая польза превышает возможный риск.


Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата не влияет на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНТЕСЕПТ

Лекарственный препарат Пантесепт отпускается без рецепта врача.

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.



Препарат Пантесент вводят по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.

Применение у детей и подростков

Данные о применении препарата у детей отсутствуют.

Путь и способ введения

Для интравагинального применения.

Перед применением препарата рекомендуется провести гигиенические процедуры и тщательно вымыть руки. Суппозиторий следует извлечь из контурной упаковки и ввести глубоко во влагалище.

Продолжительность терапии

Курс лечения 7-10 дней.

При необходимости курс лечения можно продлить до 20 дней.

Если Вы применили препарата Пантесент больше, чем следовало

Применяйте Пантесент в соответствии с рекомендациями лечащего врача или в дозах, указанных в листке-вкладыше к препарату.

Не превышайте рекомендованные дозы. Продолжительность терапии определяется лечащим врачом.

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Если Вы забыли применить Пантесент

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Пантесент может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникать следующие нежелательные реакции:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- Раздражение слизистой оболочки влагалища (жжение, зуд),
- Сукровичные выделения из влагалища;

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- Аллергические реакции: сыпь, зуд, крапивница;

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- Тяжелые аллергические реакции и анафилаксия.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ПАНТЕСЕНТ

Храните препарат в недоступном и незаметном для детей месте.


Срок годности препарата 2 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 15 °C.

Проконсультируйтесь с работником аптеки о том, как утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.



6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Пантесепт содержит:

Действующими веществами препарата являются хлоргексидина биглюконат и декспантенол.

Каждый суппозиторий содержит:

Действующие вещества: хлоргексидина биглюконат - 16 мг, декспантенол - 100 мг в пересчете на 100 % вещества.

Вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 1500, полиэтиленгликоль 400.

Внешний вид препарата Пантесепт и содержимое упаковки:

Пантесепт представляет собой суппозитории белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается неоднородность окраски в виде мраморности и наличие воронкообразного углубления.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из полимерных материалов (ПВХ/ПЭ).

Две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,
210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,
тел/факс: +375 (212) 36-37-06, тел.: +375 (212) 36-47-77,
e-mail: secretar@rubikon.by

Данный листок-вкладыш пересмотрен:

