

Листок-вкладыш – информация для потребителя
Фриангин, 1,5 мг/мл, спрей для местного применения
(Бензидамина гидрохлорид)



Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается через 3 дня или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что собой представляет препарат Фриангин, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Фриангин.
3. Применение препарата Фриангин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Фриангин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что собой представляет препарат Фриангин, и для чего его применяют

Действующим веществом препарата Фриангин является бензидамина гидрохлорид. Фриангин относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), обладает местным противовоспалительным и противоотечным действием, а также оказывает местное обезболивающее действие на слизистую оболочку полости рта. Препарат Фриангин используется для симптоматического лечения раздражений и воспалительных состояний, включая сочетание с болевым синдромом

ротовой полости и горла (например, гингивит, стоматит, фарингит), а также после консервативного лечения или удаления зубов.

2. О чем следует знать перед применением препарата Фриангин

Не применяйте препарат Фриангин, если у вас аллергия (гиперчувствительность) на бензидамина гидрохлорид или на какое-либо из вспомогательных веществ препарата, приведенных в разделе 6.

Препарат Фриангин не применяют у детей младше 4 лет.

Если вы в чем-то не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением Фриангина.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Фриангин проконсультируйтесь с лечащим врачом, медицинской сестрой или работником аптеки:

- если у вас бронхиальная астма в анамнезе;
- если у вас аллергия на ацетилсалициловую кислоту или другие НПВП.

У ограниченного числа пациентов присутствие язв в горле и полости рта может указывать на наличие более серьезной патологии. Если симптомы сохраняются у вас свыше 3 дней, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Другие препараты и препарат Фриангин

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать любые другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта, так как лекарственные препараты могут изменять эффекты друг друга.

Взаимодействие препарата Фриангин с другими препаратами не установлено.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Беременность

В случае если вы беременны, предполагаете, что беременны, или пытаетесь забеременеть, вам следует проконсультироваться со своим лечащим врачом о возможности применения препарата. Если беременность наступила в период лечения, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с вашим лечащим врачом.


Грудное вскармливание

Не следует применять препарат в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами или работа с механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами при применении в рекомендованных дозах.

Важная информация о некоторых компонентах препарата



Препарат содержит метилпарагидроксibenзоат, способный вызвать аллергические реакции (в том числе замедленного типа).

Данный препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя) – около 14 мг на дозу (0,17 мл). В случае если вы занимаетесь спортом, вы должны помнить, что применение препаратов, содержащих этиловый спирт, может давать положительный результат теста на допинг.

3. Применение препарата Фриангин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с вашим лечащим врачом.

Способ применения

Препарат распыляют на слизистую оболочку ротовой полости или горла.

Рекомендуемая доза

Применяйте препарат 2-6 раз в день. Одно распыление соответствует одной дозе препарата (0,17 мл раствора, что эквивалентно 0,255 мг бензидамина гидрохлорида).

Взрослые и подростки старше 12 лет

4-8 распылений 2-6 раз в день.

Дети

Дети (в возрасте 4-6 лет): 1 распыление на каждые 4 кг массы тела ребенка, максимальная доза 4 распыления 2-6 раз в день.

Дети (в возрасте 6-12 лет): 4 распыления 2-6 раз в день.

Не превышайте рекомендованную дозу. Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. Если после лечения в течение 7 дней улучшение не наступает или появляются новые симптомы, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Как использовать препарат Фриангин


Препарат Фриангин распыляют на слизистую оболочку ротовой полости и горла. Сразу после применения спрея следует избегать приема пищи или жидкости.

Снимите защитный колпачок и поднимите насадку распылителя.

Введите насадку в ротовую полость и направьте ее в сторону воспаленной области. Нажмите на дозатор столько раз, сколько назначено доз. После использования опустите насадку распылителя.

Если вы превысили рекомендуемую дозу или случайно приняли препарат Фриангин внутрь, вам следует обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Если вы забыли принять препарат Фриангин



Если вы пропустили прием препарата Фриангин, вы должны принять следующую дозу в намеченное время.

Не применяйте двойную дозу препарата, чтобы восполнить пропущенную.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Фриангин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Некоторые нежелательные реакции могут быть серьезными: аллергическая реакция (анафилактический шок), признаки которой могут включать затрудненное дыхание, боль или стеснение в груди, чувство головокружения, обморок, сильный зуд или отечность кожи, отек лица, губ, языка или горла, и которые могут быть потенциально опасными для жизни.

Прекратите использование препарата Фриангин и обратитесь к лечащему врачу, если почувствуете любую из приведенных ниже нежелательных реакций:

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

– фоточувствительность.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

– аллергические реакции;

– ощущение жжения и сухость в ротовой полости.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

– ларингоспазм;

– ангионевротический отек.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

– анафилактические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Фриангин

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Срок годности 2 года. Срок хранения после вскрытия упаковки – 30 дней.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 мл препарата содержит:

Действующее вещество: бензидамина гидрохлорид – 1,5 мг.

Вспомогательные вещества: этиловый спирт 96 %, глицерин, метилпарагидроксибензоат (E218), ароматизатор ментоловый (натуральные вкусоароматические вещества, 1,2-пропиленгликоль (E1520)), сахарин натрий, натрия гидрокарбонат, полисорбат 20, вода очищенная.

Внешний вид препарата Фриангин и содержимое упаковки

Фриангин, 1,5 мг/мл, спрей для местного применения представляет собой прозрачный бесцветный раствор.

По 30 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокой плотности, укупоренные насадкой распыляющей с защитным колпачком. На каждый флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Условия отпуска: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «АмантисМед»

Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская 2и

тел/факс: (+375 1774) 25 286

e-mail: office@amantismed.by

Листок-вкладыш пересмотрен:

