


НД РБ
2824 Б-2020



**Инструкция
по медицинскому применению
(листок-вкладыш)**

СОРБЕНТОГЕЛЬ, 0,7 г/г, гель для приема внутрь
Действующее вещество: полиметилсилоксана полигидрат

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

В этом листке-вкладыше содержится следующая информация:

1. Что из себя представляет препарат Сорбентогель и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Сорбентогель.
3. Применение препарата Сорбентогель.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Сорбентогель.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Сорбентогель и для чего его применяют.

В состав лекарственного препарата входит действующее вещество полиметилсилоксана полигидрат, которое при приеме внутрь оказывает сорбционное действие.

Сорбентогель применяют у детей и взрослых в составе комплексной дезинтоксикационной терапии при:

- хронической почечной недостаточности;
- токсическом гепатите, вирусных гепатитах А, В, циррозе печени и холестазах различной этиологии;
- энтероколитах, колитах, диарее, гастритах с пониженной кислотностью;
- отравлении алкоголем и наркотическими средствами;
- аллергических и кожных заболеваниях (диатезы, нейродермиты);
- ожоговой интоксикации;
- гнойно-септических и воспалительных процессах, сопровождающихся интоксикацией;
- токсикозах беременных первой половины беременности;
- в комплексной терапии дисбактериоза кишечника.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Сорбентогель.

2.1 Противопоказания

Не принимайте Сорбентогель, если:

- у Вас имеется аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- у Вас острая кишечная непроходимость;
- у Вас нарушение опорожнения кишечника.

Если хотя бы один из перечисленных пунктов относится к Вам, не принимайте Сорбентогель.

2.2 Особые указания и меры предосторожности

Перед началом применения препарата Сорбентогель проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Принимайте другие лекарственные средства с интервалом 1,5-2 часа до или после применения Сорбентогеля.

При условии соблюдения правила отдельного приема можете принимать Сорбентогель в комплексной терапии с другими лекарственными и профилактическими средствами.

В случае появления лихорадки, крови в стуле, признаков обезвоживания, диареи и рвоты одновременно или сильной и постоянной боли в животе, обратитесь к врачу.

Рекомендуется употреблять воду или растворы для восстановления водно-солевого баланса во время лечения Сорбентогелем, чтобы обеспечить правильный жидкостной баланс в организме.

Не рекомендуется использовать Сорбентогель при остром химическом отравлении или при передозировке другими лекарственными средствами.

Если Вы склонны к запору, в первые два дня приема рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактолоза, пикосульфат натрия).

2.3 Дети

Сорбентогель можно применять детям от рождения.

2.4 Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сорбентогель может снижать действие других лекарственных средств, которые применяются вместе с ним.

Не рекомендуется одновременный прием с лекарственными средствами, которые принадлежат к классу секвестрантов желчных кислот (группа препаратов для снижения холестерина в крови), в связи с усилением вероятности развития запоров.

Не применяйте Сорбентогель вместе с препаратами серебра.

2.5 Применение беременными и кормящими грудью женщинами, сведения о фертильности

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сорбентогель не противопоказан в период беременности и лактации. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать препарат.



2.6 Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

Не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Сорбентогель.

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Дети от рождения до 5 лет: разовая доза - 5 г (чайная ложка), суточная доза - 15 г.

Детям в возрасте от 5 до 14 лет: разовая доза - 10 г (десертная ложка), суточная доза - 30 г.

Подростки от 14 лет и взрослые: разовая доза составляет 15 г (столовая ложка), суточная доза - 45 г.

Курс лечения - от 7 до 14 суток.

При тяжелых формах заболеваний в течение первых трех суток можно применять двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность) возможно более длительное (до 1 месяца) применение препарата.

Сорбентогель применяют внутрь 3 раза в сутки за 1,5-2 часа до или через 2 часа после еды или приема лекарственных средств, запивая достаточным количеством воды.

Детям в возрасте до 2 лет перед применением разовую дозу геля можете смешать с небольшим количеством воды.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции.

Подобно всем лекарственным препаратам Сорбентогель может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Желудочно-кишечные нарушения: частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно) – тошнота, запор

Если какая-либо из нежелательных реакций станет серьезной, незамедлительно сообщите об этом Вашему врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Сорбентогель.

Не применяйте препарат после истечения срока годности.

Срок годности: 2 года.

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C.

Не замораживать.

После первого вскрытия контейнера хранить при температуре не выше 25°C, плотно закрыть крышку контейнера. Хранить в недоступном для детей месте.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.**Состав**

1 г геля содержит:
полиметилсилоксана полигидрат 0,7 г;
Вода очищенная.

Описание

Однородная гелеподобная масса от белого до почти белого цвета без запаха.

Форма выпуска и упаковка

По 135 г или 270 г геля в контейнере из полимерного материала, запаянном крышкой из фольги алюминиевой и укупоренном навинчивающейся крышкой из полимерного материала. Один контейнер вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

По 5 г, 10 г или 15 г геля в саше из комбинированного материала (полиэтилентерефталат/алюминий/полиэтилен) с перфорацией. 10 или 21 саше вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

По 200 г геля в ламинатной трубе, запаянной алюминиевой фольгой, с навинчивающейся полипропиленовой крышкой. Одна труба вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Белалек», Республика Беларусь

Производитель***Произведено и расфасовано***

ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», Украина
61013, Харьковская, обл., г. Харьков, ул. Шевченко, д. 22.

Упаковано***Производитель, ответственный за выпускающий контроль качества***

ООО «Белалек», Республика Беларусь
222223, Минская область, Смолевичский район,
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»;
тел.: +375447777701
e-mail: info@belalek.by