



Листок-вкладыш: информация для потребителя
Декспантенол Е, (50 мг+5 мг)/г, крем для наружного применения
декспантенол+ альфа-токоферилацетат

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к лечащему врачу или к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Декспантенол Е, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Декспантенол Е.
3. Применение препарата Декспантенол Е.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Декспантенол Е.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Декспантенол Е, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Декспантенол Е предназначен для наружного применения. Его действующие вещества декспантенол и альфа-токоферилацетат ускоряют регенерацию кожи в процессе заживления ран.

Препарат Декспантенол Е применяется у взрослых и детей для:

- местного лечения поверхностных повреждений кожи (небольших ожогов и трещин кожи, ссадин и растрескиваний кожи);
- профилактики и лечения пеленоочного дерматита легкой степени;
- профилактики и лечения трещин сосков у кормящих матерей;
- защиты кожи от воздействия неблагоприятных климатических факторов (обветривания и обморожения)
- профилактики и лечения опрелостей легкой степени.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, через 7 дней Вам необходимо обратиться к врачу.

2. О чём следует знать перед применением препарата Декспантенол Е

Не применяйте препарат Декспантенол Е:

- если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) на декспантенол, альфа-токоферилацетат, а также на любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

0932Б-2015

Перед применением препарата Декспантенол Е проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат предназначен только для наружного применения. При попадании крема в глаза необходимо промыть их водой. Не рекомендуется наносить крем Декспантенол Е на слизистые оболочки. Не рекомендуется наносить крем Декспантенол Е на мокнущие раны. При возникновении аллергических реакций лечение следует прекратить.

Другие препараты и препарат Декспантенол Е

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Данные о взаимодействии крема Декспантенол Е с другими препаратами, применяемыми местно, отсутствуют; поэтому их одновременное применение не рекомендуется.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или работником аптеки.

Применение при беременности и в период кормления грудью допустимо, если польза от применения превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Если Вы применяете препарат для обработки трещин сосков в период лактации, то перед кормлением необходимо удалить остаток крема с помощью салфетки и обмыть соски водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

Препарат Декспантенол Е не оказывает воздействия на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

Препарат Декспантенол Е содержит цетостеариловый спирт и бензиловый спирт

Препарат Декспантенол Е содержит цетостеариловый спирт, который может вызывать местные контактные реакции (например, контактный дерматит).

1 г крема содержит 20 мг бензилового спирта. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции и раздражение кожи и слизистых оболочек.

3. Применение препарата Декспантенол Е

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемые дозы

Лекарственный препарат предназначен только для наружного применения у детей и взрослых.

Наносите крем на пораженные участки кожи однократно или несколько раз в сутки, в зависимости от необходимости.

Для профилактики и лечения трещин и воспалений сосков наносите крем после каждого кормления.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения определит Ваш лечащий врач. Длительность лечения зависит от вида и течения заболевания.

Если Вы считаете, что действие препарата слишком слабое или слишком сильное, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Декспантенол Е может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех.

Определить точную частоту встречаемости каждой из них не представляется возможным. При применении препарата возможно развитие аллергических реакций, в том числе кожных – контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема (покраснение), экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, пузырьковая сыпь.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение лекарственного препарата Декспантенол Е

Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Срок годности 3 года. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Храните препарат при температуре не выше 25°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Декспантенол Е содержит в качестве действующих веществ декспантенол и альфа-токоферилацетат.

В 1 г крема содержится 50,0 мг декспантенола и 5,0 мг альфа-токоферилацетата.

Вспомогательные вещества: парафин мягкий белый, парафин жидкий, стеариновая кислота, макроголглицерина гидрокистеарат, цетостеариловый спирт, бензиловый спирт, макрогола цетостеариловый эфир, диэтаноламин, вода очищенная.

Внешний вид препарата Декспантенол Е и содержимое упаковки

Крем белого или желтовато-белого цвета.

По 30 г или 50 г в тубе из комбинированного материала с бушонами или в тубе из полимерного материала, помещенной вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

Условия отпуска

Без рецепта

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Фармтехнология»

220024, г. Минск, ул. Корженевского, 22.

Телефон: (017) 309 44 88. E-mail: ft@ft.by.

Данный листок-вкладыш пересмотрен

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь