

**Повидон-йод, 100 мг/г, мазь для наружного применения**

Действующее вещество: повидон йодированный

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается в течение 7 дней или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Повидон-йод, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Повидон-йод.
3. Применение препарата Повидон-йод.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Повидон-йод.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Повидон-йод, и для чего его применяют

1 г мази содержит действующего вещества - повидона йодированного - 100 мг.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Фармакотерапевтическая группа: препараты применяемые в дерматологии. Антисептические и дезинфицирующие средства. Препараты йода.

Показания к применению

- Для местного лечения ран или мелких порезов и профилактики инфицирования небольших ожогов;
- в комплексной терапии грибковых или бактериальных инфекций кожи, инфицированных пролежней и трофических язв.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Повидон-йод

Не используйте препарат:

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) на повидон йодированный или какие-либо другие компоненты этого препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас заболевание щитовидной железы: узловой, коллоидный, эндемический зоб, тиреоидит Хашимото, тиреотоксикоз, аденома щитовидной железы;
- если у Вас герпетiformный дерматит Дюринга;
- до и после терапии радиоактивным йодом или сцинтиграфии;
- у новорожденных;
- у детей в возрасте до 2-х лет;
- у беременных (II-III триместр) и в период кормления грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом использования препарата Повидон-йод проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у Вас снижена функция щитовидной железы;
- если у Вас снижена функция почек;
- если у Вас снижена функция печени;
- если Вы получаете терапию препаратами лития;
- если Вы наносите крем на большую площадь поверхности.

Если Ваше состояние не улучшается, несмотря на использование препарата Повидон-йод, в течение 7 дней, Вам следует сообщить об этом лечащему врачу.

Также сообщите лечащему врачу или работнику аптеки:

- если у Вас есть другие заболевания;
- у Вас аллергия.

Мазь Повидон-йод предназначена для местного применения.

Избегать попадания в глаза.

Продолжительное применение может вызвать раздражение кожи, редко серьезные кожные реакции. При появлении локального раздражения или повышенной чувствительности лечение следует прекратить.

Не разогревать перед использованием.

Дети и подростки

Применение мази у новорожденных и детей до 2-х лет противопоказано.

Другие препараты и препарат Повидон-йод

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Повидон йодированный может приводить к уменьшению поглощения йода щитовидной железой, что может исказить результаты некоторых диагностических исследований (например, сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода, связанного с белками, и радиоактивного йода), а также

1159Б-2017

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

может взаимодействовать с препаратами йода, которые применяются для лечения заболеваний щитовидной железы, снижая их эффективность. Проведение сцинтиграфии щитовидной железы может быть рекомендовано не ранее 1-2 недель после завершения лечения лекарственными препаратами, содержащими повидон йодированный.

Лекарственные препараты, содержащие повидон йодированный, при применении одновременно или сразу после антисептиков, содержащих октенидин, могут вызвать временное потемнение кожи в месте использования.

При одновременном применении с калия йодидом и амиодароном повышает риск избыточного накопления йода в организме (развитие йодизма) и нарушений функции щитовидной железы.

В присутствии крови бактерицидное действие повидона йодированного уменьшается.

Одновременное применение повидона йодированного и препаратов для лечения ран, содержащих ферментные соединения, может снизить эффективность обоих веществ.

Не следует применять одновременно с антисептиками, содержащими ртуть, окислители, соли щелочных и кислотных веществ, соли серебра, хлоргексидин, дубильную кислоту.

Беременность и лактация

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Повидон-йод не следует использовать в период беременности (с 3-го месяца).

Атомарный йод и йодид-ион легко проникает через плацентарный барьер, выделяется в грудное молоко и может вызвать развитие зоба у ребенка.

Если же грудное вскармливание продолжается, нужно прекратить применение лекарственного препарата.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияния не оказывает.

3. Применение препарата Повидон-йод

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Мазь наносят тонким слоем, не втирая, на очаг поражения. Пораженная зона должна быть очищена и осушена заранее, перед применением мази.

Особые группы пациентов

Пациенты с печеночной или почечной недостаточностью

Требует повышенной осторожности.

Пациенты, получающие терапию препаратами лития

Мазь Повидон-йод не рекомендуется применять.

Пациенты с нарушением функции щитовидной железы

Применение мази у данной группы пациентов должно быть по возможности ограничено и проводиться только в условиях тщательного контроля функции щитовидной железы.

Применение у детей и подростков

Детям до 2-х лет и новорожденным применение мази противопоказано.

Способ применения

Продолжительность терапии

Кратность применения мази 1-2 раза в сутки. Продолжительность применения 7-14 дней.

Если Вы применили больше Повидон-йода, чем предусмотрено

Если Вы применили Повидон-йод больше, чем следовало, могут появиться следующие симптомы:

- металлический привкус во рту, слюнотечение, жжение, боль в полости рта, горла;
- раздражение и отек глаз;
- кожные заболевания;
- ощущение наполненности желудка, диарея;
- нарушение функции почек, анурия;
- сердечная недостаточность;
- отек голосовой щели, сопутствующий асфиксии, отек легких, метаболический ацидоз и гипернатриемия.

Лечение: симптоматическое.

При подозрении на передозировку, немедленно обратитесь к лечащему врачу.

Если Вы забыли применить Повидон-йод

Не наносите дополнительно Повидон-йод, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение Повидон-йод

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем прекратить лечение.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к своему лечащему врачу или работнику аптеки.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Повидон-йод может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызвать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции.

Редкие (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):

- гиперчувствительность;
- контактный дерматит (например, небольшие волдыри или зуд).

Очень редкие (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- гипертиреоз;
- анафилактические реакции;
- ангионевротический отек.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- гипотиреоз;
- поглощение электролитов, метаболический ацидоз;
- острая почечная недостаточность, нарушение осмолярности;
- химические ожоги кожи.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сооб-

щений на веб-сайте www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Повидон-йод

Храните препарат в недоступном для детей месте. Не применяйте препарат после истечения срока годности. Датой истечения срока годности является последний день месяца. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Повидон-йод содержит

Действующим веществом является: повидон йодированный – 100 мг. Прочими вспомогательными веществами являются: макрогол 4000, натрия гидроксид, вода очищенная, макрогол 400.

Внешний вид препарата Повидон-йод и содержимое упаковки

Мазь коричневого цвета со слабым запахом йода однородной консистенции.

20 г или 55 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (упаковка № 1).

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Данный листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в ОХЛП и доступны на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте www.rceth.by.