


Листок-вкладыш - информация для пациента**Циннаризин-НАН, 25 мг, таблетки**

Действующее вещество: циннаризин



Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Циннаризин-НАН и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Циннаризин-НАН.
3. Прием препарата Циннаризин-НАН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Циннаризин-НАН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЦИННАРИЗИН-НАН И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Действующим веществом препарата Циннаризин-НАН является циннаризин.

Циннаризин, блокируя кальциевые каналы, подавляет сокращение клеток гладкой мускулатуры сосудов. Он способствует улучшению микроциркуляции. Подавляет нистагм (неконтролируемые движения глаз) и другие проявления вестибулярных нарушений. Оказывает антигистаминное (антиаллергическое) действие.

Показания к применению

Препарат Циннаризин-НАН применяется:

- для симптоматического лечения нарушений равновесия (чувство вращения – вертиго, головокружение, тошнота, рвота, шум в ушах, непроизвольное движение глаз – нистагм);
- для профилактики «дорожной болезни» (морская и воздушная болезнь, укачивание при движении);
- для симптоматического лечения нарушений периферического кровообращения (синдром перемежающейся хромоты) у взрослых.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ЦИННАРИЗИН-НАН

Не принимайте и не давайте Вашему ребенку препарат Циннаризин-НАН

- если у Вас (Вашего ребенка) аллергия на циннаризин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Циннаризин-НАН проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Циннаризин (как и другие антигистаминные препараты) может вызывать дискомфорт в желудке. Прием препарата после еды позволяет уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка.

Поскольку циннаризин может вызывать сонливость, особенно в начале лечения, следует соблюдать осторожность при одновременном приеме со средствами, оказывающими угнетающее действие на центральную нервную систему.

Если у Вас болезнь Паркинсона, Вам следует посоветоваться с врачом, который примет решение о том, можно ли Вам принимать Циннаризин-НАН. У пациентов с болезнью Паркинсона симптомы основного заболевания могут усилиться, поэтому таким пациентам препарат Циннаризин-НАН можно принимать только в том случае, если польза от применения будет превышать возможный риск ухудшения состояния.

Необходимо соблюдать осторожность пациентам старше 65 лет, детям, а также пациентам при наличии в семейном анамнезе или клинической симптоматике экстрапирамидных нарушений.

Если у Вас склонность к гипотонии (низкое давление) или имеются проблемы с печенью и/или почками, сообщите лечащему врачу до начала приема препарата.

Если у Вас порфирия (наследственное заболевание крови), Вам следует посоветоваться с врачом.

В связи с наличием антигистаминного эффекта циннаризин может повлиять на результат при антидопинговом контроле спортсменов (ложноположительный результат), а также нивелировать положительные реакции при проведении кожных диагностических проб (за 4 дня до исследования лечение следует отменить).

Если во время приема лекарственного препарата симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте до 5 лет, т.к. эффективность и безопасность применения у детей этой возрастной категории не установлены.

Другие препараты и препарат Циннаризин-НАН

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы (Ваш ребёнок) принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Циннаризин-НАН может вызывать сонливость, особенно в начале лечения, поэтому следует соблюдать осторожность при совместном приеме с алкоголем, снотворными или седативными средствами и другими лекарственными препаратами, действующими на центральную нервную систему (трициклическими антидепрессантами).

Препарат Циннаризин-НАН может повлиять на результаты кожных проб для диагностики аллергии. Если Вы приняли данный препарат менее чем за 4 дня до проведения проб, следует сообщить об этом врачу.

Препарат Циннаризин-НАН с пищей, напитками и алкоголем

Препарат Циннаризин-НАН может вызывать дискомфорт/боль в области желудка; прием препарата после еды может уменьшить раздражение желудка. Предпочтительно принимать препарат Циннаризин-НАН после еды.

Алкоголь может усиливать сонливость, вызванную приемом препарата Циннаризин-НАН.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

17 26 Б - 2017



Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не принимайте препарат Циннаризин-НАН во время беременности.

Не принимайте препарат Циннаризин-НАН в период грудного вскармливания или прекратите грудное вскармливание на время лечения препаратом Циннаризин-НАН.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Циннаризин-НАН может вызывать сонливость, особенно в начале лечения, в случае развития данного эффекта пациентам не следует управлять автотранспортом и работать с движущимися механизмами.

Препарат Циннаризин-НАН содержит лактозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом препарата.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ЦИННАРИЗИН-НАН

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые

Нарушение равновесия: по 1 таблетке 3 раза в день (75 мг в сутки).

Нарушение периферического кровообращения: по 2-3 таблетки 3 раза в день (150-225 мг в сутки).

Профилактика «дорожной болезни»: 1 таблетка (25 мг) за полчаса до поездки; прием можно повторять через каждые 6 часов.

Дети и подростки

Профилактика «дорожной болезни»:

- дети в возрасте старше 12 лет - 1 таблетка (25 мг) за полчаса до поездки; прием можно повторять через каждые 6 часов.

- дети в возрасте 5-12 лет - рекомендуется половина взрослой дозы.

- дети младше 5 лет - не рекомендуется применение препарата Циннаризин-НАН у детей младше 5 лет.

Путь и способ введения

Препарат Циннаризин-НАН принимают внутрь, после еды.

Таблетку следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды.

Продолжительность лечения препаратом Циннаризин-НАН определяет Ваш лечащий врач.


Если Вы приняли препарата Циннаризин-НАН больше, чем следовало

Если Вы приняли препарата Циннаризин-НАН больше, чем следовало, немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее отделение скорой помощи. Возьмите с собой упаковку, чтобы медицинские работники могли легко понять, какое лекарство Вы приняли.

Если Вы забыли принять Циннаризин-НАН

Если Вы забыли принять дозу препарата, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.



4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Циннаризин-НАН может вызвать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Если Вы заметили следующие симптомы, прекратите прием препарата Циннаризин-НАН и немедленно обратитесь за медицинской помощью:

- Аллергические реакции. У некоторых людей может быть аллергия на этот препарат. Симптомы аллергии включают сыпь (например, крапивницу); хрипы; одышку; отеки век, лица или губ.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Циннаризин-НАН

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сонливость, тошнота, увеличение массы тела.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- повышенная сонливость (гиперсомния), летаргия, утомляемость;
- рвота, боль в животе, нарушение пищеварения (диспепсия), сухость во рту;
- повышенная потливость (гипергидроз), лихеноидный кератоз.

Частота неизвестна (не может быть оценена на основании имеющихся данных):

- головная боль, дискинезии, экстрапирамидные расстройства, паркинсонизм, тремор;
- пожелтение кожи и белков глаз (холестатическая желтуха);
- поражения кожи (красный плоский лишай, подострая кожная красная волчанка);
- ригидность мышц.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИННАРИЗИН-НАН

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в защищенном от света и влаги месте, при температуре не выше 25°C.

Не выбрасывайте препарат в канализацию ли вместе с бытовым мусором. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Циннаризин-НАН содержит:

Действующим веществом является циннаризин.

Каждая таблетка содержит 25 мг циннаризина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: лактоза моногидрат, картофельный крахмал, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат.

Внешний вид препарата Циннаризин-НАН и содержимое упаковки

17 26 Б - 20 17



Таблетки белого или почти белого цвета, двояковыпуклые.

По 25 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и гибкой упаковки на основе алюминиевой фольги. 2 контурные ячейковые упаковки с листком-вкладышем в пачке из картона.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Государственное предприятие «АКАДЕМФАРМ»

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. академика В.Ф. Купревича, д. 5, корп. 3,

тел./факс 8(017) 268-63-64

Электронная почта: info@academpharm.by

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь: www.rceth.by.