



Листок-вкладыш – информация для потребителя
СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО,
жидкость для инъекций
(стекловидное тело)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с вашими.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО, и для чего его применяют
2. О чём следует знать перед применением препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
3. Применение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО,
и для чего его применяют**

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО представляет собой препарат животного происхождения, получаемый из стекловидного тела глаз крупного рогатого скота и свиней. Препарат корректирует метаболизм костной и соединительной ткани.


СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО применяется для размягчения и рассасывания рубцовой ткани, для ускорения образования костной мозоли при переломах и уменьшения боли при повреждении периферических нервов.

**, 2. О чём следует знать перед применением
препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО**

Не применяйте данный препарат:

- если у вас аллергия на стекловидное тело;
- если у вас инфекционные заболевания;
- если у вас острые воспалительные процессы;
- если у вас кахексия (истощение организма);
- если у вас нефрит, нефросклероз (заболевания почек);
- если у вас цирроз печени;
- если у вас сердечная недостаточность II и III степени;
- если у вас онкологические заболевания;
- если вы беременны или кормите ребенка грудью;
- у детей и подростков до 18 лет.

Если вы не уверены, относится ли к вам что-либо из перечисленного выше, сообщите лечащему врачу перед применением препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО.

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Обязательно сообщите лечащему врачу, если у вас имеется склонность к аллергическим реакциям.

Дети и подростки

У детей и подростков в возрасте до 18 лет применение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО противопоказано.

Другие препараты и препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Несмотря на то, что при применении данного препарата одновременно с другими лекарственными препаратами нежелательных реакций не отмечено, сообщите лечащему врачу о том, что вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты. Это относится также к любым растительным препаратам или препаратам, которые вы купили без назначения врача.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Опыт применения лекарственного средства у беременных женщин и женщин в период кормления грудью отсутствует, не применяйте данный препарат в эти периоды.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Влияние препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не установлено.

3. Применение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

Препарат вводят под кожу по 2 мл ежедневно.

Продолжительность лечения

Курс лечения:

- при невралгиях – 8-10 дней;
- при рубцах, контрактурах и переломах – до 25 дней.

Повторение курса лечения рекомендуется через один месяц или позднее.

Длительность лечения определяется врачом индивидуально.

Способ применения ,

Подкожно.

Применение у пациентов с нарушением функции почек, печени, пациентов пожилого возраста

Данные об особенностях дозирования у пациентов с нарушением функции почек, печени, пациентов пожилого возраста отсутствуют.

Применение у детей

Информация об эффективности и безопасности применения лекарственного препарата у детей отсутствует.

Если вы применили препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО больше, чем следовало

Явлений передозировки при применении лекарственного препарата не описано.

Не превышайте рекомендуемую длительность применения препарата.

Если вы забыли применить препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Если вы забыли выполнить инъекцию, препарат следует ввести при первой возможности.

Не следует вводить двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если вы пропустили несколько инъекций, сообщите об этом врачу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО могут наблюдаться следующие нежелательные реакции:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- анафилактические реакции;
- крапивница, зуд, сыпь, гиперемия кожи (переполнение кровью сосудов кровеносной системы), эритема (интенсивное покраснение кожи);
- аллергические реакции в виде усиления боли и воспаления в области введения.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО

Храните при температуре не выше 25 °C. Не замораживать.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Действующим веществом препарата является стекловидное тело.

Препарат содержит 2 мл стекловидного тела в одной ампуле.

Вспомогательные вещества отсутствуют.

Внешний вид препарата СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО и содержимое упаковки

СТЕКЛОВИДНОЕ ТЕЛО, жидкость для инъекций, – прозрачная слегка желтоватая жидкость. Допускается легкая опалесценция, наличие мелкой кристаллической и тканевой взвеси.

НД РБ

0136Б-2020

По 2 мл в ампулах из стекла с кольцом или точкой излома. На ампулу наклеивают этикетку самоклеящуюся.

По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и гибкой упаковки в рулонах на основе алюминиевой фольги. По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка ампул со скарификатором ампульным.

Условия отпуска: по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

РУП «Белмедпрепараты»,
Республика Беларусь, 220007, г. Минск,
ул. Фабрициуса, 30,
тел./факс:(+375 17) 220 37 16,
e-mail: medic@belmedpreparaty.com



За любой информацией о препарате следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»: www.rceth.by.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.