

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**Бисакодил, 5 мг, таблетки кишечнорастворимые,  
покрытые пленочной оболочкой**

Действующее вещество: бисакодил

- Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.
- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША**

1. Что из себя представляет препарат **Бисакодил**, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед приемом препарата **Бисакодил**.
3. Прием препарата **Бисакодил**.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата **Бисакодил**.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ БИСАКОДИЛ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Препарат **Бисакодил** содержит действующее вещество бисакодил, относится к группе слабительных средств контактного действия. Бисакодил увеличивает секрецию воды и электролитов в толстом кишечнике, ускоряет и увеличивает его перистальтику, размягчает стул и облегчает его эвакуацию. Бисакодил не абсорбируется в организме, не оказывает влияния на пищеварение в тонком кишечнике.

Препарат Бисакодил применяется для кратковременного симптоматического лечения случайных запоров.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

**2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА БИСАКОДИЛ  
Противопоказания.**

Не применяйте препарат если у Вас:

- аллергия на бисакодил или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- тяжелое обезвоживание с электролитными нарушениями;
- воспалительные заболевания толстой кишки, язвенный колит, болезнь Крона;
- синдром острого живота, сильные боли в животе, сопровождающиеся тошнотой и рвотой;
- непроходимость кишечника различного генеза;
- детский возраст до 6 лет.

**Особые указания и меры предосторожности.**

Перед приемом препарата **Бисакодил** проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Медикаментозному лечению запоров должны предшествовать следующие

мероприятия: адекватная физическая активность и питьевой режим, употребление достаточного количества пищевых волокон.

Применение слабительных препаратов более 10 дней не рекомендуется. Если Вам каждый день нужны слабительные, следует обратиться к врачу, чтобы выяснить причину Вашего запора. Чрезмерное употребление слабительных может быть вредным.

С осторожностью следует применять **Бисакодил** пациентам с сахарным диабетом.

#### *Пациенты с нарушением функции почек и пациенты пожилого возраста*

Пациентам с повышенным риском обезвоживания (дегидратации), симптомами которой являются уменьшение выделения мочи (олигурия) и жажда, перед назначением слабительных средств необходимо восстановить водный баланс и обеспечить прием достаточного количества жидкости.

В случае кровотечения из прямой кишки или отсутствия дефекации после приема слабительного препарата необходимо обратиться к врачу.

#### **Дети.**

Детям назначать слабительные препараты следует с особой осторожностью в связи с риском нарушения рефлекса освобождения кишечника. Дети от 6 до 12 лет с хроническими запорами должны принимать лекарственный препарат только под наблюдением врача.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты.

Не рекомендуется одновременное применение **Бисакодила** с лекарственными средствами, которые могут вызвать развитие нарушения сердечного ритма (аритмии) типа *torsades de pointes*:

- антиаритмические препараты (амиодарон, бретилиум, дизопирамид, хинидин, сotalол);
- другие лекарственные препараты, такие как: астемизол, бепридил, эритромицин для внутривенного введения, галофантрин, пентамидин, сультоприд, терфенадин, винкамин.

Факторами риска развития нарушения сердечного ритма типа *torsades de pointes* являются гипокалиемия, брадикардия и удлинение интервала QT.

Лекарственные комбинации, которые требуют осторожности:

1. Сердечные гликозиды. Гипокалиемия увеличивает токсические эффекты препаратов наперстянки. Необходим мониторинг уровня калия в сыворотке крови и, в случае необходимости, ЭКГ-контроль.

2. Другие лекарственные препараты, приводящие к выведению калия: калийуретические мочегонные препараты (отдельно или в комбинации), амфотерицин В для внутривенного введения, кортикостероиды, тетракозактид. Требуется контроль уровня калия в сыворотке крови и при необходимости – коррекция.

Бисакодил не следует принимать с лекарственными препаратами понижающими кислотность в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, такими как антациды (маалокс, фосфалюгель, алмагель, гастал, ренни, рутацид и др.) или ингибиторы протонной помпы (омепразол, эзомепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол, декслансопразол, тенатопразол и др.), чтобы избежать преждевременного растворения кишечнорастворимой оболочки.

#### **Применение беременными и кормящими грудью женщинами, сведения о фертильности.**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение **Бисакодила** не рекомендуется во время беременности, поскольку данных клинических и доклинических исследований недостаточно.

Клинические данные показывают, что бисакодил не проникает в грудное молоко, препарат может быть применен только после консультации с врачом.

#### **Взаимодействие с пищей и напитками.**

Лекарственный препарат не следует принимать с продуктами понижающими кислотность в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта, такими как молоко, чтобы избежать преждевременного растворения кишечнорастворимой оболочки.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.**

Некоторые люди могут чувствовать головокружение или слабость при приеме этого лекарственного препарата. Если это произойдет с Вами, подождите, пока эти чувства не исчезнут, прежде чем садиться за руль или пользоваться механизмами.

#### **Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ.**

Данный лекарственный препарат в одной таблетке (5 мг) содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку, т.е. практически не содержат натрия. Если Вы находитесь на диете с низким содержанием соли, Вы должны принять это во внимание.

Лекарственный препарат Бисакодил содержит лактозу и сахарозу. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

### **3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА БИСАКОДИЛ**

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Перед назначением слабительных препаратов необходимо восстановить водный баланс, обеспечить прием достаточного количества жидкости.

Медикаментозному лечению запоров должны предшествовать следующие мероприятия: адекватная физическая активность и питьевой режим, употребление достаточного количества пищевых волокон.

#### **Доза.**

Рекомендуемая доза:

Взрослые: 1 или 2 таблетки в день (5-10 мг).

#### **Применение у детей.**

Не применяют у детей до 6 лет.

Дети от 6 до 12 лет: 1 таблетка (5 мг) в день.

#### **Способ применения.**

Лекарственный препарат **Бисакодил** предназначен для приема внутрь.

Таблетки следует проглатывать, не разжевывая.

Для получения слабительного эффекта в утренние часы рекомендуется принимать лекарственный препарат накануне на ночь. Таблетки проглатывают, запивая достаточным количеством жидкости.

#### **Продолжительность терапии.**

Длительность приема лекарственного препарата определяется врачом.

Применение слабительных препаратов более 10 дней не рекомендуется. При длительном применении возможно развитие зависимости (необходимость в увеличении дозировки и развитие тяжелого запора после отмены препарата).

Если Вы приняли препарата **Бисакодил** больше, чем следовало

При острой передозировке возможно развитие диареи, спазмов в животе, потери жидкости, калия и других электролитов.

Хроническая передозировка может привести к развитию диареи, болей в животе, гипокалиемии, мышечной слабости.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу. Необходима коррекция электролитных нарушений и восполнение потери жидкости. Данные мероприятия особенно важны у пациентов пожилого возраста и детей. Проводится также симптоматическое лечение.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

##### **Описание нежелательных реакций.**

Подобно всем лекарственным препаратам препарат **Бисакодил** может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Ниже перечислены возможные нежелательные реакции по частоте встречаемости:

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10)

- боли в животе и диарея;

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100)

- кровотечение из прямой кишки, аноректальной дискомфорта, жжение и боли в аноректальной области;

- головокружение;

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000)

- генерализованный судороги;

- дегидратация;

- анафилактические реакции, отек Квинке;

- обморок (головокружение и обмороки, возникающие после приема препарата **Бисакодил**, появляются совместно с парасимпатической сосудистой реакцией (например, спазм в животе, дефекация));

- колит.

Частота неизвестна (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных):

- головокружения и обмороки во время дефекации;

- гипокалиемия.

##### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

220037, г. Минск. Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон отдела фармаконадзора: +375 (17) 242-00-29;

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by), [rceth@rceth.by](mailto:rceth@rceth.by)

<https://www.rceth.by>

#### **5. КАК ХРАНИТЬ БИСАКОДИЛ**

Храните препарат **Бисакодил** в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

**Дата истечения срока годности (срока хранения).**

Срок годности - 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

**Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25 °C.

**Предупреждения о признаках непригодности препарата к применению.**

Не выбрасывайте препарат в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

**6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ****Препарат Бисакодил содержит:**

Действующее вещество: бисакодил

Одна таблетка содержит: бисакодила – 5 мг.

Вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, сахароза, картофельный крахмал, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, кальция стеарат, пленкообразователь: метакриловая кислота и этилакрилат сополимер (1:1), тальк, триэтилцитрат, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия карбонат, натрия лаурилсульфат, окрашивающий пигмент (содержит титана диоксид Е171, железа оксид желтый Е172, железа оксид красный Е172).

**Внешний вид препарата Бисакодил и содержимое его упаковки.**

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, круглые, светло-коричневого цвета с розовым оттенком, с двояковыпуклой поверхностью. На поперечном разрезе видны два слоя.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона (№10x3).

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель.**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел.+375(177)735612, 744280, e-mail: market@borimed.com

**Перечень представителей держателя регистрационного удостоверения на территории Союза, если применимо:**

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

**Данный листок-вкладыш пересмотрен**