



Инструкция по медицинскому применению листок-вкладыш

Гепсил-Рн®, 35 мг, таблетки, покрытые оболочкой

Действующее вещество: сухой экстракт из плодов расторопши пятнистой

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Гепсил-Рн®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Гепсил-Рн®.
3. Прием препарата Гепсил-Рн®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Гепсил-Рн®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ГЕПСИЛ-РН®, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Гепсил-Рн® – лекарственный препарат, который содержит активное вещество силимарин, выделенное из плодов растения расторопши пятнистой. Силимарин активирует синтез белков и фосфолипидов в поврежденных клетках печени, стабилизирует их клеточные мембранны, связывает свободные радикалы (антиоксидантное действие). Его основное действие заключается в защите клеток печени от вредных воздействий различных факторов, таких как алкоголь, лекарства, вирусные инфекции, промышленные загрязнители. При поражении клеток печени он способствует их более быстрому восстановлению.

Используется для симптоматического лечения хронических токсических поражений печени, для поддерживающего лечения пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями печени или циррозом печени.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ГЕПСИЛ-РН®

Не принимайте препарат Гепсил-Рн®:

- если у вас аллергия на силимарин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- у детей младше 12 лет из-за отсутствия достаточного клинического опыта.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Гепсил-Рн® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

1535Б-2016

- Обратитесь к лечащему врачу, если у вас есть гормонозависимые заболевания (эндометриоз, миома матки, рак молочной железы, яичников и матки, рак простаты), из-за возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина.
- Прием лекарственного препарата не может заменить соблюдение диеты или отказ от приема гепатотоксических веществ при поражениях печени (например, от алкоголя).

Дети

Нет достаточных данных об эффективности и безопасности силимарина у детей, поэтому препарат Гепсил-Рн® не рекомендуется принимать детям младше 12 лет.

Другие препараты и препарат Гепсил-Рн®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Гепсил-Рн® может уменьшить эффективность пероральных противозачаточных средств и лекарственных препаратов для заместительной гормональной терапии.

Препарат Гепсил-Рн® может усилить действие таких лекарственных препаратов, как diazepam, алпразолам (анксиолитические средства (транквилизаторы)), кетоконазол (противогрибковое средство), ловастатин (средства, снижающие уровень холестерина), винбластин (противоопухолевое средство).

Беременность, грудное вскармливание и fertильность

Не рекомендуется принимать препарат при беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Гепсил-Рн® не оказывает неблагоприятного влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Гепсил-Рн® содержит лактозу моногидрат

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ГЕПСИЛ-РН®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Если другого не предусмотрено, взрослым и детям старше 12 лет рекомендуется принимать по 4 таблетки 3 раза в день.

Путь и способ введения

Таблетки Гепсил-Рн® принимают внутрь целиком, запивая достаточным количеством жидкости.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения определяется вашим врачом.

Продолжительность применения лекарственного препарата не менее 3 месяцев.

Если вы приняли препарата Гепсил-Рн® больше, чем следовало

Нет сообщений о случаях передозировки препаратом. Если вы приняли дозу, превышающую



1535 Б-2016

назначенную, обратитесь за советом к своему лечащему врачу. Лечение при случайном приеме высокой дозы: вызвать рвоту, промыть желудок, принять активированный уголь, провести при необходимости симптоматическую терапию.

Если вы забыли применить препарат Гепсил-Рн®

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Гепсил-Рн® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат Гепсил-Рн® обладает хорошей переносимостью. Нежелательные реакции носят временный характер и исчезают после прекращения приема лекарственного препарата.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- усиление существующих вестибулярных нарушений;
- диарея.

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- кожные аллергические реакции – зуд, сыпь, крапивница.

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- анафилактический шок;
- тошнота, рвота, диспепсия (боль, жжение или дискомфорт в подложечной области, тяжесть и чувство переполнения в эпигастрии, возникающие после еды, раннее насыщение, вздутие живота), снижение аппетита, метеоризм (избыточное скопление газов в кишечнике).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств-членов Евразийского экономического союза.

Контактные данные для сообщений о нежелательных реакциях:

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а


УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Тел.: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>



Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГЕПСИЛ-РН®

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре ниже 25 °С.

Не выбрасывайте (не выливайте) препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препарата, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Гепсил-Рн® содержит

Действующим веществом является сухой экстракт из плодов расторопши пятнистой.

Каждая таблетка содержит 50 мг сухого экстракта из плодов расторопши пятнистой эквивалентно 35 мг силимарина.

Вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, повидон, лактоза моногидрат; оболочка (состав оболочки: поливиниловый спирт, макрогол, тальк, железа оксид черный, железа оксид красный, железа оксид желтый, титана диоксид).

Внешний вид препарата Гепсил-Рн® и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые оболочкой коричневого цвета, цилиндрические, двояковыпуклые.

10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

15 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 6 или 8 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

ООО «Рубикон», Республика Беларусь,

210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел.: +375 (212) 36-47-77,

тел/факс: +375 (212) 36-37-06,

e-mail: secretar@rubikon.by

Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения по адресу

Республика Беларусь

ООО «Рубикон», 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, 62Б,

тел.: +375 (212) 36-47-77,

факс: +375 (212) 36-37-06,

e-mail: secretar@rubikon.by

Данный листок-вкладыш пересмотрен

12/2024

