

Листок-вкладыш – информация для пациента**Дибазол, 5 мг/мл, раствор для внутривенного и внутримышечного введения**

Действующее вещество: бендазол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Дибазол, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Дибазол.
3. Применение препарата Дибазол.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Дибазол.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Дибазол, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Дибазол содержит действующее вещество бендазол.

Спазмолитический, сосудорасширяющий, гипотензивный препарат. Является миотропным спазмолитиком, который оказывает расслабляющее действие непосредственно на гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних органов.

Лекарственный препарат Дибазол показан:

– в качестве дополнительной терапии при спазмах кровеносных сосудов (гипертонические кризы, прогрессирование артериальной гипертензии) и гладких мышц внутренних органов (спазмы привратника желудка, кишечника);

– при заболеваниях нервной системы (остаточные явления полиомиелита, периферический паралич лицевого нерва, полиневрит).

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Дибазол**Не применяйте препарат Дибазол, если у Вас:**

– аллергия на бендазол или любой из компонентов, входящих в состав данного препарата (см. раздел б);

– заболевания, протекающие со снижением мышечного тонуса, судорожным синдромом;

– тяжелая сердечная недостаточность;

– артериальная гипотензия;

– хронический нефрит с отеками и нарушением азотовыделительной функции почек;

– язва желудка и двенадцатиперстной кишки, которая сопровождается кровотечением;

– сахарный диабет;

– детский возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом применения препарата Дибазол проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При лечении артериальной гипертензии рекомендуется сочетать с другими гипотензивными препаратами.

Не рекомендуется применять для длительного лечения артериальной гипертензии, особенно у пациентов пожилого возраста.

Дети и подростки

Эффективность и безопасность у детей до 18 лет не установлена. Не применять у детей до 18 лет.

Другие препараты и препарат Дибазол

Сообщите лечащему врачу, если Вы применяете или недавно применяли любые другие лекарственные препараты. Это относится и к лекарственным препаратам, которые отпускаются без рецепта.

Обязательно предупредите Вашего лечащего врача до начала лечения, если Вы применяете перечисленные ниже препараты. Одновременное применение препарата Дибазол с ними повышает риск возникновения нежелательных реакций:

- папаверин – спазмолитический препарат;
- клонидин, фентоламин, резерпин – антигипертензивные препараты;
- диуретические лекарственные препараты (например, торасемид, фуросемид).

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Из-за недостаточности данных по безопасности препарат не следует применять в период беременности и грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с механизмами, а в случае возникновения головокружения воздержаться от потенциально опасных видов деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.

3. Применение препарата Дибазол

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

При гипертоническом кризе препарат вводят внутривенно или внутримышечно 30–40 мг (6–8 мл раствора 5 мг/мл).

При прогрессировании артериальной гипертензии препарат вводят внутримышечно в дозе 20–30 мг (4–6 мл раствора 5 мг/мл) 2–3 раза в сутки. Курс лечения 8–14 дней. При спазмах гладкой мускулатуры препарат вводят внутримышечно в дозе 10–20 мг (2–4 мл раствора 5 мг/мл).

При лечении заболеваний нервной системы применяют по 5 мг 1 раз в сутки или через день внутримышечно в течение 5–10 дней. Курс повторяют через 3–4 недели. В дальнейшем курсы проводят каждые 1–2 месяца.

Особые группы пациентов

Пациенты с нарушением функции почек и/или печени

Коррекция дозы не требуется.

Пожилые пациенты

Следует соблюдать осторожность при применении у пожилых пациентов.

Способ применения

Препарат Дибазол предназначен для внутривенного и внутримышечного введения.

Если Вы применили препарата Дибазол больше, чем следовало

При применении доз, превышающих рекомендованные, необходимо обратиться к врачу. Возможно снижение артериального давления, появление потливости, чувство жара, головокружения, тошноты, легкой головной боли.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Дибазол может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При появлении следующих нежелательных реакций следует прекратить применение препарата Дибазол и как можно скорее обратиться за медицинской помощью:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

- аллергические реакции, иногда тяжелые, с появлением на коже красных или припухших высыпаний, отеком век, лица, губ, рта или языка, зудом, затруднением дыхания (одышка) или затруднением глотания, ощущения слабости или головокружения, приводящие к обмороку или потере сознания;
- крапивница с сильно зудящими волдырями, схожими по виду с волдырями от ожога крапивой.

Другие нежелательные реакции, возникающие при применении препарата Дибазол:

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):


- зуд, покраснение кожи;
- сыпь;
- головокружение;
- головная боль;
- сердцебиение;
- боль в области сердца;
- ухудшение показателей ЭКГ при длительном применении;
- снижение артериального давления;
- сухой кашель;
- насморк;
- затрудненное дыхание;
- тошнота;
- жжение в горле;
- ощущение жара;
- повышенное потоотделение;
- покраснение лица;
- локальная болезненность.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через национальные системы сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
Телефон: +375 (17) 242-00-29
Факс: +375 (17) 242-00-29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
Сайт: <http://www.rceth.by>



5. Хранение препарата Дибазол

Хранить в оригинальной упаковке (пачка) для защиты от света при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте лекарственный препарат в канализацию или как бытовые отходы. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Дибазол содержит:

Действующее вещество: бендазол.

Одна ампула (2 мл) содержит 10 мг бендазола.

Вспомогательные вещества: раствор хлористоводородной кислоты (для коррекции pH), вода для инъекций.

Внешний вид препарата Дибазол и содержимое упаковки

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения.

Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.

По 2 мл в ампулах из стекла.

10 ампул вместе с ножом или скарификатором и листком-вкладышем помещают в коробку из картона (№10).

10 ампул вместе с ножом или скарификатором для вскрытия ампул и листком-вкладышем помещают в пачку из картона (№10).

В случае использования ампул с кольцом излома или с насечкой и точкой излома вложение ножа или скарификатора для вскрытия ампул не предусматривается.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»

Республика Беларусь

Минская область, г. Борисов, 222518 ул. Чапаева, 64.

Тел/факс: +375 (177) 735612, 744280

E-mail: market@borimed.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by.