


1104 Б-2017

**Листок-вкладыш – информация для пациента****АнГриМакс, 180 мг / 25 мг / 150 мг / 1,5 мг / 10 мг, капсулы**

Действующие вещества: парацетамол, римантадина гидрохлорид, кислота аскорбиновая, лоратадин, рутин

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат АнГриМакс и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата АнГриМакс.
3. Прием препарата АнГриМакс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата АнГриМакс.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ АНГРИМАКС И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат АнГриМакс содержит действующие вещества парацетамол, римантадина гидрохлорид, кислота аскорбиновая (в виде кислоты аскорбиновой с покрытием типа ЕС), лоратадин, рутин. Активность препарата обусловлена комплексным действием его компонентов.

Парацетамол обладает жаропонижающим, обезболивающим и некоторым противовоспалительным действием, уменьшает болевой синдром, наблюдающийся при простудных заболеваниях, боль в горле, головную боль, мышечную и суставную боль, снижает высокую температуру.

Римантадин – противовирусное средство. Активен в отношении различных штаммов вируса гриппа А, вирусов герпеса типа I и II, вирусов клещевого энцефалита.

Аскорбиновая кислота оказывает неспецифическое общестимулирующее влияние на организм. Повышает адаптационные способности организма и его сопротивляемость к инфекциям; способствует процессам восстановления.

Лоратадин обладает противоаллергическим, противозудным, противоэкссудативным действием. Уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, снимает спазмы гладкой мускулатуры.

Рутин – ангиопротектор, предотвращает развитие повышенной проницаемости и ломкости сосудов, обуславливающих геморрагические процессы при гриппе, а также восстанавливает капиллярное кровообращение.

Показания к применению

Препарат АнГриМакс показан к применению у взрослых и детей старше 12 лет для лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (или простудных заболеваний), сопровождающихся повышенной температурой тела.

Если улучшение не наступило через 5 дней, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА АНГРИМАКС

Не принимайте препарат АнГриМакс:

- если у Вас аллергия на действующие вещества или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас период беременности и/или кормления грудью (лактации);
- если у Вас острые и хронические заболевания почек;
- если у Вас острые заболевания печени;
- если у Вас повышенный уровень гормонов щитовидной железы (тиреотоксикоз);
- если у Вас тяжелое нарушение функции почек;
- если у Вас склонность к закупорке кровеносных сосудов (тромбофлебит, тромбоз);
- если у Вас сахарный диабет.

Препарат АнГриМакс противопоказан к применению у детей младше 12 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата АнГриМакс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у Вас пожилой возраст;
- если у Вас нарушение функции почек;
- если у Вас нарушение функции печени;
- если у Вас повышенный уровень билирубина в крови (доброкачественная гипербилирубинемия);
- если у Вас вирусный гепатит;
- если у Вас алкогольное поражение печени;
- если у Вас алкогольная зависимость;
- если у Вас наследственное генетическое заболевание, связанное с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы;
- если у Вас повышенное кровяное давление (артериальная гипертензия);
- если у Вас эпилепсия (в том числе в прошлом);
- если у Вас отложение холестерина в сосудах головного мозга (атеросклероз);
- если у Вас заболевания желудочно-кишечного тракта;
- если у Вас повышенный уровень оксалатных солей в моче (гипероксалурия);
- если у Вас камни в почках и других отделах мочевыделительной системы (мочекаменная болезнь);
- если у Вас анемия или другое заболевание крови;
- если у Вас прогрессирующее злокачественное заболевание.

Во время лечения препаратом АнГриМакс немедленно сообщите врачу, если:

- у Вас серьезное заболевание, включая тяжелую почечную недостаточность или сепсис (когда бактерии и их токсины циркулируют в крови, что приводит к

повреждению органов), или Вы страдаете от длительного голодания, хронического алкоголизма или принимаете флуклоксациллин (антибиотик). Были получены сообщения о развитии серьезного состояния, с метаболическим ацидозом (изменение кислотно-щелочного баланса в крови) у пациентов, принимающих парацетамол в обычных дозах, в течение длительного периода времени или когда парацетамол принимался вместе с флуклоксациллином. Симптомы метаболического ацидоза могут включать: серьезное затруднение дыхания с глубоким учащенным дыханием, сонливость, тошноту и рвоту.

Пожалуйста, сообщите своему врачу, если Вы принимаете:

- флуклоксациллин (антибиотик), в связи с серьезным риском развития нарушения кислотно-щелочного баланса (так называемый метаболический ацидоз), который требует срочного лечения (см. раздел 2).

Препарат АнГриМакс не предназначен для профилактики!

Вспомогательные вещества

Препарат АнГриМакс содержит лактозы моногидрат, поэтому если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Дети

Препарат противопоказан детям до 12 лет (см. раздел «Не принимайте препарат АнГриМакс»).

Другие препараты и препарат АнГриМакс

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Обязательно сообщите своему врачу, если Вы принимаете какие-либо из следующих лекарственных препаратов:

- нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен, нимесулид, аспирин и др.);
- препараты, препятствующие образованию тромбов (например, варфарин);
- препараты для лечения заболеваний нервной системы и психических заболеваний (например, барбитураты, карбамазепин, рифампицин, зидовудин, дифенин, фенитоин, флумецинол, фенилбутазон и трициклические антидепрессанты);
- противорвотные препараты (например, метоклопрамид, домперидон);
- препараты, способствующие выделению мочевой кислоты (этамид, антуран);
- адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства;
- препараты для контроля кислотности мочи: окисляющие (например, аммония хлорид, кислота аскорбиновая и др.) и ощелачивающие (например, ацетазоламид, диакарб, натрия гидрокарбонат и др.);
- ингибиторы CYP3A4 (например, циметидин, флуоксетин, флуконазол, миконазол, клотримазол, кетоконазол, пароксетин, омепразол, ципрофлоксацин, метронидазол, ранитидин) или CYP2D6 (например, пароксетин, дифенгидрамин, гидроксихлорохин, сертралин);
- препараты железа;
- противозачаточные препараты (пероральные контрацептивы);
- некоторые антибиотики (фторхинолоны, бензилпенициллины, тетрациклины);
- гормональные препараты (глюкокортикостероиды);
- некоторые препараты для лечения бронхиальной астмы (например, изопреналин);

- некоторые препараты для лечения нарушений ритма сердца (например, мексилетин);
- этанол.

Препарат АнГриМакс с алкоголем

При лечении препаратом АнГриМакс недопустим одновременный прием алкогольных напитков!

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Прием препарата в период беременности и кормления грудью противопоказан.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, работе с механизмами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА АНГРИМАКС

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые, дети старше 12 лет

Лечение следует начинать не позднее 24–48 часов от появления первых симптомов заболевания.

Если врачом не предписано иначе, по 1–2 капсулы 2–3 раза в день в течение 3–5 дней при сохранении лихорадочного синдрома.

Особые группы пациентов

Применение у детей и подростков

Препарат АнГриМакс противопоказан детям до 12 лет.

Продолжительность лечения

Длительность применения – не более 5 дней. При длительном применении (свыше 7 дней) возможно обострение хронических сопутствующих заболеваний.

Способ применения

Препарат АнГриМакс принимается внутрь, после еды, запивая достаточным количеством воды.

Если Вы приняли препарата АнГриМакс больше, чем следовало

Немедленно проконсультируйтесь с врачом, если Вы приняли слишком много этого препарата, даже если Вы чувствуете себя хорошо. В случае превышения рекомендуемой дозы, существует риск отсроченного серьезного повреждения печени или развития других серьезных нежелательных реакций.

Если Вы забыли принять препарат АнГриМакс

Если Вы забыли принять дозу препарата, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную.

Если Вы прекратили прием препарата АнГриМакс

Если Вы прекратите прием препарата, то вполне возможно, что у Вас снова появятся симптомы заболевания.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат АнГриМакс может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Связанные с наличием парацетамола

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- послеоперационные кровотечения;
- бессонница, тревога;
- головная боль;
- отек век (периорбитальный отек);
- учащенное сердцебиение (тахикардия), боль в груди;
- периферические отеки, повышение артериального давления (гипертензия);
- ощущение нехватки воздуха (диспноэ), патологическое дыхание, отек легких, гипоксия, скопление жидкости в плевральной полости (плевральный выпот), хрипы, одышка, кашель;
- понос (диарея), запор, диспепсия, вздутие живота;
- мышечные спазмы, спазм жевательной мускулатуры (тризм);
- уменьшение количества мочи (олигурия);
- повышение температуры тела (пирексия), чувство усталости;
- снижение уровня калия в крови (гипокалиемия), увеличение уровня калия в крови (гиперкалиемия).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- изменения показателей крови: анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия;

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- изменение показателей крови: панцитопения, сульфогемоглобинемия, метгемоглобинемия;
- дистония, головокружение, психомоторное возбуждение, дезориентация (при приеме высоких доз);
- сухость во рту;
- печеночная недостаточность, гепатиты, некроз печени;
- экзантема (высыпания на коже в виде красных пятен, узелков, пузырьков, гнойничков);
- почечная колика, неспецифическая бактериурия, воспаление почек (интерстициальный нефрит), папиллярный некроз;
- увеличение креатинина;
- метаболический ацидоз: серьезное состояние, которое может привести к повышению кислотности крови у пациентов с тяжелыми заболеваниями, принимающих парацетамол (см. раздел 2).

Связанные с наличием римантадина

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- бессонница;
- тошнота, рвота.

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- депрессия, эйфория, галлюцинации;

- головокружение, головная боль, повышенная возбудимость, нарушение внимания, двигательные расстройства (атаксия), сонливость, непроизвольные и неконтролируемые движения мышц (гиперкинез), тремор, состояние спутанности сознания, судороги, изменение или потеря обоняния;
- шум в ушах;
- ощущение сердцебиения, сердечная недостаточность, нарушение сердечного ритма (блокада сердца), учащенное сердцебиение (тахикардия);
- повышение артериального давления (гипертензия), цереброваскулярные нарушения, обморок;
- одышка, затрудненное, свистящее дыхание (бронхоспазм), кашель;
- отсутствие аппетита (анорексия), сухость во рту, боли в животе, понос (диарея), диспепсия;
- сыпь;
- состояние, сопровождающееся психическим и физическим истощением (астения), усталость.

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- зуд, сыпь в виде гладких точек или пятен, которые возвышаются над поверхностью (папулезная сыпь), генерализованная сыпь, крапивница.

Частота нежелательных реакций, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы, увеличивается после превышения рекомендованных доз.

В отдельных случаях, после превышения рекомендованных доз наблюдается слезоточивость глаз, повышение мочеиспускания, озноб, запор, потоотделение, стоматит, снижение тактильной чувствительности определенного участка кожи (гипестезия), боль в глазах.

В большинстве случаев нежелательные реакции исчезают после окончания приема препарата.

Связанные с наличием лоратадина

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- аллергические реакции (включая внезапное опухание губ, лица, горла или языка, сыпь, затруднение глотания или дыхания (ангионевротический отек), бледность кожи, резкое снижение кровяного давления, быстрый и слабый пульс (анафилаксия);
- головокружение, судороги;
- учащенный пульс (тахикардия), ощущение сердцебиения;
- сухость во рту, тошнота, воспаление желудка (гастрит);
- нарушение функции печени;
- сыпь, патологическое выпадение волос (алопеция);
- утомляемость.

Связанные с наличием аскорбиновой кислоты и рутина

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- внезапная бледность кожи, резкое снижение кровяного давления, быстрый и слабый пульс (анафилактический шок).

Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- изменение показателей крови: повышенное количество тромбоцитов, лейкоцитов, фактора, повышающего риск образования тромбов (протромбина), снижение количества эритроцитов, калия;
- кожная сыпь;
- нарушения функции поджелудочной железы (повышение сахара в крови и моче);
- гипервитаминоз, при длительном применении больших доз – задержка натрия и жидкости, нарушение обмена цинка, меди;
- головная боль, чувство усталости, при длительном применении больших доз – повышение возбудимости центральной нервной системы, нарушение сна;
- невоспалительное поражение сердечной мышцы (миокардиодистрофия);
- образование тромбов (тромбоз), при применении в высоких дозах – повышение артериального давления, поражение мелких кровеносных сосудов (развитие микроангиопатий), ощущение жара;
- раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, понос (диарея), спазмы желудка;
- при применении в высоких дозах – повышенное выделение оксалатов кальция с мочой (гипероксалурия), образование мочевых камней из кальция оксалата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

Телефон/факс: +375 17 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: www.rceth.by

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АНГРИМАКС

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Храните в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С.


Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

НД РБ
1104 Б-2017



Препарат АнГриМакс содержит

Действующими веществами являются: парацетамол, римантадина гидрохлорид, кислота аскорбиновая, лоратадин, рутин.

Каждая капсула содержит 180 мг парацетамола, 25 мг римантадина гидрохлорида, 150 мг кислоты аскорбиновой (в виде кислоты аскорбиновой с покрытием типа ЕС), 1,5 мг лоратадина, 10 мг рутина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: кальция карбонат, кальция стеарат, крахмал картофельный, лактозы моногидрат.

Оболочка капсулы содержит: желатин, вода очищенная, титана диоксид (E171), хинолиновый желтый (E104), бриллиантовый голубой (E133).

Внешний вид препарата и содержимое упаковки

Капсулы твердые желатиновые цилиндрической формы с полусферическими концами с корпусом желтого цвета и крышечкой зеленого цвета.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

УП «Минскинтеркапс»

220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26

Телефон/факс: +375 17 276-01-59

Электронная почта: info@mic.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен

Дата последнего пересмотра:

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате АнГриМакс содержатся на официальном сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» www.rceth.by.