

eva/qui®

ADULTI (для взрослых)

for children (для детей)

Ректальные суппозитории

Суппозитории, вызывающие опорожнение кишечника для взрослых

Суппозитории, вызывающие опорожнение кишечника для детей

Изделие медицинского назначения

Суппозитории *eva/qui*® (далее – *Эвакью*®) растворяются в прямой кишке и вызывают процесс физиологического опорожнения кишечника.

Способствуют восстановлению регулярной дефекации.

Освобождают ампулу прямой кишки от фекальных масс.

Запор

Запор характеризуется плотными каловыми массами с затруднением опорожнения и редкой частотой дефекаций (реже 3 раз в неделю)

При длительном отсутствии лечения запор может вызывать психофизический дискомфорт, головную боль и боль в животе, проявляться в виде проблем с кожей, вызывать кишечную непроходимость, геморрой и анальные трещины.

Наиболее частая причина запора – это скопление каловых масс в нижнем отделе кишечника (в так называемой ректальной ампуле (прямой кишке)), особенно в случае ослабления физиологического рефлекса к дефекации.

Механизм действия

После введения суппозитории *Эвакью*® растворяются в прямой кишке в течение 5 - 7 минут, высвобождая большое количество мелких микропузырьков углекислого газа, которые стимулируют сокращение стенки ампулы прямой кишки, повторяя физиологический процесс нормального прохождения каловых масс через прямую кишку. Это вызывает дистальное расслабление кольцевой мускулатуры гладкомышечной ткани, включая сфинктер.

Растворенный полиэтиленгликоль действует как смягчающее и смазывающее средство, размягчает застойные каловые массы.

Суппозитории могут применяться в течение длительного времени для поддержания и стимулирования физиологических механизмов дефекации.

Компоненты изделия не являются фармацевтически, биологически или фармакологически активными веществами. Опорожнение кишечника происходит благодаря физиологическому механизму действия.

Область применения

Суппозитории *Эвакью*® для взрослых показаны взрослым и подросткам старше 12 лет.

Суппозитории *Эвакью*® для детей показаны детям в возрасте от 2 до 12 лет.

Суппозитории *Эвакью*® показаны при запорах любой этиологии, в том числе хронических. Могут быть использованы в качестве альтернативы клизме.



Эвакью® рекомендуется для подготовки к исследованию прямой кишки (перед хирургическим, гастроэнтерологическим, урологическим обследованием), включая проведение ректоскопии.

Изделие эффективно для активации механизмов опорожнения кишечника в поездках, когда может развиваться запор, устойчивый к действию фармацевтических препаратов, а использование клизмы невозможно, а также во всех случаях прямокишечного запора.

Эвакью® эффективен в качестве профилактики для удаления каловых остатков из кишечника, учитывая, что гигиена прямой кишки поможет предотвратить воспаление анального канала, трещины, геморрой и неопластические процессы.

Благодаря эффективности, деликатному местному физиологическому действию, отсутствию раздражающих компонентов и веществ, которые всасываются организмом при местном применении, суппозитории можно рекомендовать во время беременности и кормления грудью, для лежачих пациентов и инвалидов, для пожилых людей и для пациентов с неврологическими заболеваниями.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов. Возраст до 2 лет.

Способ применения и дозы

Один (1) суппозиторий при необходимости. **Эвакью®** для детей применяется ректально у детей с 2 до 12 лет. **Эвакью®** для взрослых применяется ректально у взрослых и детей старше 12 лет.

Извлеките один суппозиторий из запечатанной упаковки и введите суппозиторий в ампулу прямой кишки, предварительно смочив водой. При геморрое или трещинах прямой кишки предварительно смазать суппозиторий вазелином, подсолнечным или оливковым маслом. Суппозиторий ректальный активизирует процесс опорожнения кишечника в течение нескольких минут. Рекомендуется удерживать суппозиторий как можно дольше. Важно, чтобы действие было завершено. При появлении стимулирующего воздействия следует двигаться, а не ожидать эффект сидя или лежа.

Эвакью® не вызывает привыкания.

Побочные действия

Не зафиксировано случаев негативного воздействия на организм человека при частом и продолжительном использовании изделия, в том числе при геморрое и анальной трещине. В ряде случаев пропиленгликоль может вызвать местную аллергическую реакцию. В этом случае следует прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности

Ощущение частичного опорожнения или легкого жжения в прямой кишке не должно беспокоить, потому что быстро исчезает.

Продукт показан при ректальном запоре, поэтому отсутствие эффекта (дефекации) может указывать на другую проблему (например, острая кишечная непроходимость), в этом случае, пожалуйста, свяжитесь с лечащим врачом.

Используйте продукт только по назначению.



Применение при беременности и лактации

Возможно применение в период беременности и лактации. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Информация относительно любого риска для плода и ребенка во время беременности и кормления грудью до настоящего времени не зарегистрирована.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Не используйте после окончания срока годности. Срок годности обозначен на картонной упаковке (36 месяцев).

Форма выпуска:

Изделие медицинское ректальное для стимуляции опорожнения кишечника в суппозиториях.

Эвакью® для взрослых: упаковка по 6 или 12 суппозиториев, 4,8 г каждый.

Эвакью® для детей: упаковка по 6 или 12 суппозиториев, 1,9 г каждый.

Эвакью® хорошо переносится и эффективно устраняет запоры, восстанавливает нормальное функционирование кишечника, благодаря естественному и физиологическому действию.

Препарат прошел клинические испытания

Производитель:

So. Se. PHARM S. r. l.

Виа дей Кастелли Романи, 22

00071 Помеция (Рим), Италия

www.sosepharm.com

Производственная площадка:

Special Product's Line S.p.A.

Виа Фратта Ротонда Вадо Ларго 1,

03012 Ананьи (Фрозиноне), Италия

Организация, уполномоченная производителем на

принятие претензий: Представительство ЗАО „Miečys“

(Литовская Республика) в Республике Беларусь

220035, г. Минск, ул. Тимирязева д.67 пом. 1626

Тел.: +375 17 235 03 11

info@miecys.by, www.miecys.by

