

16-11-2021

Текст инструкции по применению медицинского изделия Liugosept®/ Люгосепт® спрей для полости рта и горла со вкусом вишни

Liugosept®/ Люгосепт®

Спрей для полости рта и горла со вкусом вишни

Изделие медицинского назначения (класс 1)

Состав. Глицерин, натуральный краситель сахарный колер простой, поливинилпирролидон К90, повидон-йод, полисорбат 80, гиалуроновая кислота (гиалуронат натрия), аллантоин, сорбат калия, ароматизатор вишнёвый, очищенная вода.

Содержащиеся в составе спрея для полости рта и горла Liugosept®/ Люгосепт® глицерин, гиалуроновая кислота и аллантоин образуют защитный слой, сохраняющий целостность слизистой и защищающий ее от вредных факторов внешней среды и патогенных микробов, а также благодаря увлажняющему и смягчающему действию успокаивают раздраженную слизистую и помогает уменьшить ее сухость, першение, боль при глотании, ощущение инородного тела в горле и т. п.

Liugosept®/Люгосепт® спрей для полости рта и горла используется:

- для защиты слизистой оболочки полости рта или горла от вредных факторов внешней среды и патогенных микробов;
- для поддержания влажности и улучшения естественной функции слизистой оболочки горла и глотки;
- как средство, помогающее избавиться от неприятных ощущений в горле (когда чувствуется дискомфорт и першение, боль при глотании);
- как вспомогательное средство для раздраженного горла или полости рта (при простуде, тонзиллите, фарингите, ларингите, стоматите, гингивите).

Применение. Применять для ротовой полости и глотки. Взрослым и детям старше 6 лет впрыскивать 2 – 3 раза в день. Головку распылителя с наконечником направьте на область горла и сделайте необходимое количество распылений (1-2 нажатия). При впрыскивании держите бутылочку вертикально. Во время впрыскивания рекомендуется задержать дыхание. **[картинки]**

После использования изделия, достаточно орошать наконечник горячей водой снаружи или протереть влажной салфеткой.

Противопоказания. Не применять при повышенной чувствительности к любому входящему компоненту. Не рекомендуется для детей младше 6 лет.

Предупреждения. Дети должны применять средство только под наблюдением взрослых. Не предназначен для приема внутрь (нельзя вдыхать или проглатывать). Остерегайтесь попадания в глаза. При появлении нежелательного эффекта прекратите применение и обратитесь к врачу. После применения средства рекомендуется в течение 30 минут воздержаться от приема пищи или питья. Если симптомы долго не проходят, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом. При поврежденной упаковке не применять. В целях гигиены после применения головку распылителя и наконечник

рекомендуется протереть влажной салфеткой. Перед применением данного изделия прочитайте инструкцию.

Хранение. Как указано на упаковке. Хранить в недоступном и незаметном для детей месте. Указанный на упаковке срок годности действителен только при условии правильного хранения продукта.

Упаковка. Флакон темного стекла объемом 50 мл, закручиваемый крышкой с дозировочным насосом и распылителем с насадкой.

Срок годности. См. этикетку и упаковку продукта. По истечении срока годности, указанного на этикете флакона и коробке, Liugosept®/ Люгосепт® использовать нельзя.










ЗАО «Валентис», Молету пл. 11, LT-08409, Вильнюс, Литва.

Логотип Valentis

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:
ООО "Акком-М", 220104, г. Минск, пер. Корженевского 28, п. 115, Республика Беларусь.

Символы на упаковке:

	Производитель		Использовать до
	Смотреть инструкцию по применению		Температурное ограничение
	Код партии		Дата изготовления
	Продукт обозначен знаком CE по MDD 93/42/ЕЕС.		

PAP 22

Дата последнего просмотра: 16/11/2021

Директор
ЗАО «Валентис»



Андрюс Каминкас