



раствор офтальмологический стерильный на основе кислоты гиалуроновой, цитиколина, витамина В12

Флакон 10 мл

Состав:

мононатриевая соль цитиколина, цианокобаламин (витамин В12), гиалуроновая кислота, одноосновный моногидрат фосфата натрия, двухосновный додекагидрат фосфата натрия, хлорид натрия, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Что такое ОМК2®

ОМК2® — стерильный офтальмологический раствор во флаконе по 10 мл.

Что это

ОМК2® — глазной раствор, содержащий 2% цитиколина, 0,05%, Витамин В12 и 0,2% высокомолекулярной гиалуроновой кислоты.

Благодаря наличию цитиколина ОМК2® оказывает благоприятное действие при восстановлении целостности клеточной мембраны, поврежденной при дегенеративных патологиях глаз, например, при глаукоме или диабетической ретинопатии.

Кроме того, цианокобаламин (витамин В12) защищает клетки от свободных радикалов и способствует росту эпителиальных клеток роговицы.

Благодаря гиалуроновой кислоте, ее мукоадгезивным и вязкоэластичным свойствам. ОМК2® способен создать благоприятную среду для процессов восстановления поверхности глаза при поражениях роговицы и повреждениях конъюнктивального эпителия, улучшая стабильность слезной пленки и, таким образом, поддерживая поверхность глаза смазанной, увлажненной и защищенной.

Когда использовать ОМК2®

ОМК2®, благодаря наличию цитиколина и его структурному действию на ганглиозные клетки сетчатки, показан при дегенеративных патологиях глаз, например, при глаукоме у пациентов в качестве дополнительного средства к антигипертензивной терапии или при диабетической ретинопатии.

Более того, благодаря наличию витамина В12 ОМК2® косвенно способствует физиологическим процессам реэпителизации роговицы после операций на глазах, лазера или небольших ссадин поверхности роговицы.

Наконец, смачивающие и защитные свойства ОМК2® обеспечивают положительный эффект при раздражении, жжении и ощущении инородного тела глаза, вызванными факторами окружающей среды или длительным использованием электронных устройств.

Сколько и как использовать

По 1 капле 3 раза в день.

Меры предосторожности и предупреждения

- Не используйте, если флакон поврежден.
- Не использовать в случае несовместимости с каким-либо компонентом препарата.
- Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Избегайте контакта кончика тюбика с глазами.
- После приема может возникнуть временное помутнение зрения. Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкости зрения.
- Подождите 10–15 минут после применения, прежде чем закапывать офтальмологические лекарственные средства для местного применения.
- Продукт необходимо использовать в течение 30 дней после первого открытия.
- Храните продукт в недоступном для детей месте.
- Продукт предназначен только для наружного офтальмологического применения.
- Не хранить при температуре выше 25°C.
- Не выбрасывайте бутылку в окружающую среду после использования.
- - Продукт содержит бензалкония хлорид (0,01%). Возможно окрашивание контактных линз. Рекомендуется снять контактные линзы перед использованием продукта и надеть их обратно через 15 минут после использования.
- Если вы испытываете необычные ощущения, жжение или боль после применения глазных капель, обратитесь к врачу.

Производитель:

Омикрон Италия С.р.л. - Виале Б. Буоцци, 5 - 00197 Рим - Италия

Производственная площадка:

FARMIGEA S.p.A56121, Pisa (PI), Via G.B. Oliva, 6/8, Италия

