



ИНСТРУКЦИЯ

(листок-вкладыш)

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ТЕТРАЦИКЛИН

- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

Торговое название препарата: Тетрациклин

Международное непатентованное название: тетрациклин

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав

1 г мази содержит:

действующее вещество: тетрациклина гидрохлорид – 30 мг;

вспомогательные вещества: ланолин – 30 мг, парафин твердый – 10 мг, церезин – 45 мг, натрия дисульфит – 0,5 мг, вазелин – до 1 г.

Описание:

Мазь желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Антибиотики для наружного применения. Тетрациклин и его производные.

Код АТХ: D06AA04

Фармакологические свойства

Бактериостатический антибиотик из группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка. Активен в отношении *Propionibacterium acnes* (*Corynebacterium acnes*), грамположительных (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Haemophilus influenzae*, *Listeria* spp., *Bacillus anthracis*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.) а также *Rickettsia*

КОПИЯ ВЕРНА
Корчевая
Корчевая Е.В.



Верно: 14.08.14

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

spp., Chlamidia spp., Mycoplasma spp., Трепонема spp.. Устойчивы: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp., большинство штаммов Bacteroides spp. и грибов, мелкие вирусы.

Фармакокинетика

При нанесении на неповрежденную кожу практически не всасывается.

Показания к применению

Гнойные инфекции мягких тканей, фурункулез, экземы инфицированные, угревая сыпь, фолликулит.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на поражённые участки кожи 1-2 раза в сутки или применяют в виде марлевой повязки, сменяемой через 12-24 ч. Продолжительность лечения – от нескольких дней до 2-3 недель.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (зуд, лёгкое жжение, покраснение кожи), фотосенсибилизация.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, грибковые заболевания кожи, детский возраст до 11 лет.

Передозировка

Случаи передозировки препарата Тетрациклин, мазь для наружного применения, не описаны.

Меры предосторожности

Применение в период беременности и лактации

Применение у беременных и кормящих матерей возможно в случае, когда ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода и новорожденного. При необходимости длительной терапии и/или нанесении препарата на большую площадь поверхности тела следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания, поскольку существует теоретическая

КОПИЯ ВЕРНА
Корчевая
Корчевая Е.В.



Handwritten signature

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОм ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

вероятность проникновения тетрациклина в грудное молоко.

Применение у детей

Применение препарата противопоказано у детей до 11 лет.

Влияние на способность управлять автотранспортом или другими механизмами

Не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не описано.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 30 мг/г по 15 г в тубах алюминиевых. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре от 5 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, д.7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>

КОПИЯ ВЕРНА
Коричная
Корчевая Е.В.



Handwritten signature