


7246 - 2020

СЕПТЕФРИЛ  
(SEPTEFRIL)

Таблетки для рассасывания

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА**

*Прочитайте внимательно этот Листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!*

*Храните этот Листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.*

*Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.*

*Этот препарат предназначен лично Вам, и не следует передавать его другим лицам. Это может нанести вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания подобны тем, которые наблюдаются у Вас.*

**Общая характеристика:**

*международное непатентованное название:* отсутствует

*основные физико-химические свойства:* таблетки круглой формы с плоской поверхностью, со скошенными краями и риской, белого или почти белого цвета.

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* декаметоксин;

1 таблетка содержит декаметоксина – 0,2 мг;

*вспомогательные вещества:* сахароза, повидон (Plasdone K-25), крахмал картофельный, кальция стеарат.

**Форма выпуска.** Таблетки для рассасывания.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства для лечения заболеваний глотки. Антисептические средства.  
Код АТС R02A A20.

**Показания к применению.**

Местное лечение в составе комплексной терапии заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, фарингит, тонзиллит).

**Противопоказания.**

- Повышенная чувствительность к декаметоксину или другим компонентам препарата;
- период беременности и кормления грудью;
- детский возраст до 18 лет.

**Меры предосторожности.**

*Перед началом лечения Септефрилом следует посоветоваться с врачом!*

Для повышения концентрации препарата в слюне во время рассасывания препарата следует воздерживаться от частого глотания слюны.

Препарат нежелательно одновременно применять с разными видами полоскания ротовой полости и зева.

При применении более 7 дней могут возникать нарушения баланса микрофлоры глотки.

В состав препарата входит сахароза. Каждая таблетка содержит 786,0 мг сахарозы, что соответствует 0,0655 хлебных единиц (ХЕ). Это следует учесть больным сахарным диабетом.

Пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, нарушение метаболизма глюкозы-галактозы или недостаточность сахаразы-изомальтазы, не должны принимать данное лекарственное средство.

В связи с содержанием сахарозы может вызывать повреждение зубов при длительном

7246 - 2020

применении.

Если при применении лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развиваются нарушения дыхания, повышается температура, появляется гнойная мокрота), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Клинические данные о применении Септефрила в период беременности или кормления грудью отсутствуют. Препарат не следует применять беременным. В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Не влияет.

**Дети.**

Клинический опыт по безопасности и эффективности применения лекарственного средства Септефрил у детей до 18 лет отсутствует.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

*Если Вы принимаете какие-нибудь другие лекарственные препараты, обязательно сообщите об этом врачу!*

При одновременном применении препарата с антибиотиками и противомикробными средствами системного действия усиливается антибактериальный эффект препарата.

**Способ применения и дозировка.**

После предварительного полоскания рта таблетки держать в полости рта до полного рассасывания. Взрослым Септефрил назначать по 1 таблетке 4-6 раз в сутки. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта. Применять препарат необходимо после еды, затем в течение 1 часа следует воздерживаться от приема пищи и питья.

**Применение в педиатрии**

Клинический опыт по безопасности и эффективности применения лекарственного средства у детей до 18 лет отсутствует.

**Передозировка.**

Данных о случаях передозировки препаратом Септефрил не поступало.

*При передозировке препаратом следует немедленно обратиться за медицинской помощью!*

**Побочное действие.**

Аллергические реакции, в т.ч. кожные высыпания, кожный зуд.

Возможна гиперсаливация, исчезающая после рассасывания таблеток.

*В случаях проявления описанных неблагоприятных эффектов или появлении других необычных реакций, не упомянутых в листке-вкладыше, необходимо прекратить прием препарата и посоветоваться с врачом по поводу дальнейшего его применения.*


**Срок годности. 3 года.**

*Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.*

**Условия хранения.**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.



**Упаковка.**

По 10 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной или поливинилиденхлоридной и фольги алюминиевой с односторонним покрытием термолаком и печатью с другой стороны.  
По 3 или 5 блистеров вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата или листком-вкладышем в пачке из картона.

**Условия отпуска.**

Без рецепта.

**Информация о производителе (заявителе).**

Заявитель: Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод».

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Агрофарм»

Украина, 08200, Киевская обл., г. Ирпень, ул. Центральная, 113-А

