


Проктоседил®
Мазь для местного применения



ИНСТРУКЦИЯ
(для пациентов)
по медицинскому применению препарата
Проктоседил (Proctosedyl)

Торговое название: Проктоседил® (Proctosedyl®).

Международное непатентованное название (INN): комплексный препарат.

Химическое рациональное название: комплексное соединение.

Лекарственная форма: мазь для местного применения.

Состав

В 1 грамме мази содержится:

активные вещества:

гидрокортизона ацетат	-5,58 мг;
фрамицетина сульфат	-10,00 мг;
гепарин натрия	-100 МЕ;
эскулозид	-10,00 мг;
бензокаин (этиламинобензоат)	-10,00 мг;
бутамбен (бутиламинобензоат)	-10,00 мг;

Вспомогательные вещества: холестерин, парафин жидкий (Е905с), парафин мягкий белый (Е905с), полисорбат 80 (Е433), пропиленгликоль (Е1520), макрогол (полиэтиленгликоль) 400 (Е1521), макрогол (полиэтиленгликоль) 4000 (Е1521), макрогол (полиэтиленгликоль) 1500 (Е1521).

Описание: Почти белая (с зеленовато-желтоватым оттенком) однородная гомогенная нежирная масса.

Фармакотерапевтическая группа

Противогеморроидальное средство.

Код по классификации АТХ - С05АХ03.

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для лечения геморроя и других заболеваний аноректальной зоны.

Гидрокортизон — глюкокортикостероид, является противовоспалительным средством. Устраняет различные признаки и симптомы воспаления, такие как: краснота, отечность, боль и др.

Натриевая соль гепарина является антикоагулянтом. Предотвращает тромботические осложнения геморроя.

Фрамицетина сульфат — антибиотик широкого спектра действия для местного применения. Обладает бактерицидной активностью в отношении ряда грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Эскулозид родственен витамину Р, уменьшает повышенную ломкость капилляров.

Этиламинобензоат и бутиламинобензоат обладают местным обезболивающим и противосудным действием, уменьшают спазм анального сфинктера.

Эффект препарата проявляется через несколько минут после применения.

Показания

Внутренний и наружный геморрой; профилактика рецидивов; перианальная экзема, проктит, трещины заднего прохода; предоперационное и послеоперационное лечение больных с геморроем, послеродовой геморрой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат нельзя применять при туберкулезном, вирусном, грибковом поражении аноректальной зоны.

Нельзя применять препарат во время беременности и в период кормления грудью. Препарат противопоказан в грудном возрасте.

С осторожностью следует применять препарат у больных с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью.

Способ применения и дозы

Небольшое количество мази наносится пальцем на участки локализации зуда или боли утром и вечером, а также после каждой дефекации.

Для более глубокого введения в прямую кишку надеть аппликатор на тюбик с мазью, убедиться в том, что он введен достаточно глубоко в прямую кишку, и затем, осторожно нажимая на тюбик с нижнего конца, постепенно вынуть аппликатор.

Мазь можно применять отдельно или в сочетании с ректальными капсулами.

Проктоседил применяется в течение короткого времени (не более 7 дней).

Побочные эффекты

Возможно появление чувства дискомфорта в области прямой кишки, других реакций повышенной чувствительности к компонентам препарата.

Возможно появление жжения, сухости слизистой оболочки, присоединение вторичной инфекции.

При применении Проктоседила в высоких дозах и/или в течение длительного времени повышается риск возникновения системных побочных эффектов, связанных с гидрокортизоном.

Форма выпуска

10 г мази для местного применения в алюминиевой тубе. По 1 тубе вместе с инструкцией по применению и пластиковой насадкой в картонной пачке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель:

Авентис Фарма Лтд., Индия