

НД РБ

934 - 2016



**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**ПОЛИЖИНАКС**

**Торговое название:** ПОЛИЖИНАКС

**Группировочное название:** Неомидин + Нистатин + Полимиксин В

**Лекарственная форма:** капсулы вагинальные

**Состав на 1 капсулу**

*Действующие вещества:*

Неомицина сульфат.....35 000 МЕ

Полимиксина В сульфат..... 35 000 МЕ

Нистатин .....100 000 МЕ

*Вспомогательные вещества:*

Тефоз 63®.....125,0 мг

Соевое масло гидрогенизированное.....30,0 мг

Диметикон 1000.....до 2500,0 мг

*Состав оболочки капсулы:*

желатин.....381,2 мг

глицерол.....191,5 мг

диметикон 1000.....86,9 мг

**Описание**

Мягкие капсулы от светло-желтого до бежевого цвета, овальной формы, содержащие полужидкую однородную массу. Содержимое капсул может иметь цвет от желтого до коричневого.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антибиотик комбинированный.

(антибиотики: аминогликозид+полиен+циклический полипептид)

**Код АТХ: G01AA51**

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Оказывает антибактериальное, бактерицидное и противогрибковое действие. Неомидин и полимиксин В активны в отношении многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов; Streptococcus spp. и анаэробные бактерии нечувствительны к этим антибиотикам. Нистатин оказывает фунгицидное действие в отношении грибов рода Candida.

Улучшает трофические процессы в слизистой влагалища.

*Фармакокинетика.* Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища.

### **Показания для применения**

#### *Лечение.*

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами: неспецифические, грибковые, смешанные вагиниты, вульвовагиниты и цервиковагиниты.

#### *Профилактика.*

- Предоперационная профилактика инфекционных осложнений при гинекологических вмешательствах;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед внутриматочными диагностическими процедурами;
- перед родами.

### **Противопоказания для применения**


Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

I триместр беременности.

### **Беременность и грудное вскармливание**

Применение в период беременности во II и III триместрах возможно только по назначению врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Период лактации является противопоказанием; при необходимости использования препарата в данный период, кормление грудью прекращают.



### **Способ применения и дозы**

Для вагинального применения.

Лежа на спине, капсулу вводят глубоко во влагалище вечером перед сном.

Курс лечения 12 дней. Профилактический курс 6 дней.

В случае пропуска в приеме одной или нескольких капсул возобновите прием препарата в обычной дозе.

### **Побочные действия**

Аллергические реакции, жжение, зуд, раздражение во влагалище. Аллергическая контактная экзема. При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

### **Особые указания**

Перед применением препарата необходимо предварительное взятие мазка и проведение бактериологического анализа.

Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.

Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.

Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

### **Передозировка**

Нет данных.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами**

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.

НД РБ

934 - 2016



### **Форма выпуска**

Капсулы вагинальные.

По 6 капсул в ПВХ/ПВДХ алюминиевые блистеры.

По 1 или 2 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

### **Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:**

Лаборатория Иннотек Интернациональ

22, авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция

### **Места производства готовой лекарственной формы:**

1. Каталент Франс Бейнхейм СА, 74 рю Принсипаль 67930 Бейнхейм, Франция
2. Свисс Капс АГ, Хузенштрассе 35, 9533 Кирхберг, Швейцария
3. Иннотера Шузи, Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франция

### **Производитель (первичная и вторичная упаковка, выпускающий контроль качества):**

Иннотера Шузи

Рю Рене Шантеро, Шузи-сюр-Сис, Валуар-сюр-Сис, 41150, Франция

### **Претензии потребителей направлять по адресу:**

Представительство АОУТ «Laboratoire Innotech International» (Французская Республика) в Республике Беларусь

ул. Левкова, д. 43, офис 313

220007, г. Минск,

Тел./факс: +375 17 336 05 99