

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
лекарственного средства
ЭМОКСИ-ОПТИК

Торговое название препарата: ЭМОКСИ-ОПТИК капли глазные 10 мг/мл.

Группировочное название: метилэтилпиридинол&.

Химическое название: 3-окси-6-метил-2-этилпиридина гидрохлорид.


Описание: Бесцветная или слабоокрашенная слегка опалесцирующая жидкость.

Состав на 1 мл:

Действующее вещество: метилэтилпиридинола гидрохлорид - 10 мг.

Вспомогательные вещества: натрия сульфит безводный, натрия бензоат, калия дигидрофосфат, динатрия гидрофосфата додекагидрат, метилцеллюлоза, вода для инъекций.

Форма выпуска: капли глазные.



Фармакотерапевтическая группа: средства, применяемые в офтальмологии.
Прочие офтальмологические средства.

Код ATX: [S01XA].

Показания к применению

Применяется у взрослых при следующих заболеваниях и состояниях:

- кровоизлияния в переднюю камеру глаза (лечение);
- кровоизлияния в склеру у лиц пожилого возраста (лечение и профилактика);
- воспаления и ожоги роговицы (лечение и профилактика);
- осложнения при близорукости (лечение);
- защита роговицы (при ношении контактных линз).

Противопоказания

Гиперчувствительность к метилэтилпиридинолу и вспомогательным компонентам лекарственного средства. Беременность. Период лактации (грудного вскармливания), детский возраст до 18 лет.

Меры предосторожности

Особые указания

При необходимости одновременного применения других глазных капель препарат закапывают последним, после полного всасывания предшествующих капель (не ранее чем через 10-15 мин).

Применение ЭМОКСИ-ОПТИК возможно только в перерывах между ношением контактных линз. Перед инстилляцией мягкие контактные линзы следует удалить, вновь надеть линзы можно не ранее чем через 20 минут.

Не рекомендуется в острой фазе химического ожога роговицы и конъюнктивы до полного удаления токсических веществ.

7382 - 2020

Натрия бензоат, входящий в состав капель, может вызвать раздражение конъюнктивы.

Для предотвращения инфицирования глазных капель необходимо избегать прикосновения крышки-капельницы флакона к ресницам, векам, конъюнктиве и роговице.

Во избежание передачи возможной инфекции нельзя передавать лекарственное средство другому пациенту, оно предназначено только для индивидуального применения.

Применение у детей

Применение лекарственного средства не рекомендовано у детей и подростков до 18 лет в связи с отсутствием достаточных данных.

СОГЛАСОВАНО
 министерством здравоохранения
 Республики Беларусь
 Приказ Министерства здравоохранения
 Республики Беларусь

Применение во время беременности и в период лактации

Противопоказано применение во время беременности. Возможно применение лекарственного средства в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не следует смешивать с другими лекарственными средствами.

Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-3 раза в день. Курс лечения 3-30 дней. При необходимости и хорошей переносимости курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев и может повторяться 2-3 раза в год.

Передозировка

Не установлена.

Побочное действие

Ощущение жжения, зуд, кратковременная гиперемия конъюнктивы, редко - местные аллергические реакции. Входящий в состав препарата натрия сульфит способен в редких случаях вызывать тяжелые реакции гиперчувствительности и бронхоспазм.

При появлении указанных или иных побочных реакций необходимо обратиться к врачу.

Условия и срок хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

2 года. После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Условия отпуска из аптек

Отпускают по рецепту.

7382 - 2020

Упаковка

По 5 мл во флаконы бесцветного стекла, герметично укупоренные пробками резиновыми, обжатыми колпачками алюминиевыми.
1 флакон с крышкой-капельницей или без крышки-капельницы и листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Информация о производителе:

Открытое акционерное общество «Акционерное общество «Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «СИНТЕЗ») Российской Федерации, 640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7.

Тел./факс (3522) 48-16-89

e-mail: real@kurgansintez.ru

Интернет-сайт предприятия-производителя: www.kurgansintez.ru

