



НД РБ 6478 - 2012

ПЕРТУССИН

сироп от кашля

10.09.2012 № 57

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его снова.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Состав лекарственного средства:

основные физико-химические свойства: жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с ароматным запахом;

международное непатентованное название: отсутствует;

действующие вещества: 1 г сиропа содержит чабреца ползучего экстракта жидкого (1:1) – 0,12 г, калия бромида – 0,01 г;

вспомогательные вещества: сироп сахарный, спирт этиловый 80%.

Лекарственная форма. Сироп.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A10.

Фармакологические свойства. Пертуссин относится к группе секретомоторных средств. Препарат смягчает кашель и оказывает успокаивающее действие. Пертуссин стимулирует физиологическую активность мерцательного эпителия и перистальтические движения бронхоиол, способствуя продвижению мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее выведению.

Показания к применению. Симптоматическое лечение воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с затрудненным отхождением мокроты: бронхиты, трахеиты, пневмонии.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в частности – бромидов), декомпенсация сердечно-сосудистой системы, артериальная гипотензия, выраженный атеросклероз, анемия, заболевания почек, сахарный диабет, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия. I триместр беременности и период кормления грудью. Детский возраст до 18 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Взаимодействие Пертуссина с другими лекарственными средствами пока не известно.

Меры предосторожности. Препарат предназначен только для внутреннего применения. Больным сахарным диабетом перед применением препарата необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. 1 мл сиропа содержит от 8,5 % до 11 % спирта этилового.

Применение в период беременности или кормления грудью. В I триместре беременности препарат противопоказан. Во II и III триместрах применяют с учетом соотношения польза/риск, которое определяет врач. Во время лечения необходимо прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Вследствие того, что препарат содержит спирт

этиловый, пациентам следует проявлять осторожность при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Дети. Применяют для лечения детей старше 3 лет по назначению врача.

Способ применения и дозировка. Пертуссин назначают внутрь. Взрослым назначают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания, характера комплексной терапии и переносимости препарата.

Передозировка. Возможны явления бромизма: аллергические реакции, кожная сыпь, ринит, конъюнктивит, гастроэнтероколит, общая слабость, атаксия, брадикардия.

Лечение. Отмена применения препарата и проведение симптоматического лечения.

Побочные эффекты. При длительном применении могут возникнуть явления бромизма: аллергические реакции, кожная сыпь, ринит, конъюнктивит, гастроэнтероколит, общая слабость, атаксия, брадикардия.

При появлении вышеприведенных состояний следует немедленно обратиться к врачу.

В случае возникновения любых необычных реакций обязательно посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата!

Срок годности препарата. Срок годности - 4 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 25⁰С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 50 г, 100 г во флаконе стеклянном, помещенном в пачку из картона.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя.

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;

тел./факс (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>