

8890 - 2019

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ)

**Наименование лекарственного препарата**

Отривин, капли назальные 0,05%.

**Международное непатентованное наименование (МНН)**

Ксилометазолин.



Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш), поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните инструкцию по медицинскому применению (листок-вкладыш). Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша).
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней Вам следует обратиться к врачу.

**СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ (ЛИСТКА-ВКЛАДЫША):**

- Что из себя представляет препарат Отривин, капли назальные 0,05%, и для чего его применяют.
- О чём следует знать перед применением препарата Отривин, капли назальные 0,05%.
- Применение препарата Отривин, капли назальные 0,05%.
- Возможные нежелательные реакции.
- Хранение препарата Отривин, капли назальные 0,05%.
- Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ОТРИВИН, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ 0,05%, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

**Фармакотерапевтическая группа**

Деконгестанты и другие препараты для местного применения. Симпатомиметики.

**Код ATX: R01AA07**

Ксилометазолин оказывает действие на рецепторы слизистой оболочки носа. При применении в нос вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устранивая, таким образом, отек слизистой оболочки носа и носоглотки. Облегчает носовое дыхание.

Отривин капли содержит вспомогательные вещества (сорбитол и метилгидроксипропилцеллюлозу), которые препятствуют пересыханию слизистой оболочки носа.

Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 12 часов.

## Показания к применению

Отривин капли применяется для лечения любого вида насморка.

Препарат Отривин капли предназначен для применения в области носа, где сужает кровеносные сосуды и тем самым уменьшает отек слизистой оболочки носа и прилегающих участков полости глотки. В результате восстанавливается дыхание через нос.

Отривин капли не следует применять более 7 дней, поскольку длительное применение препарата может привести к хроническому повреждению слизистой оболочки носа (медикаментозному риниту).

## 2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ОТРИВИН, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ 0,05%

### Не применяйте препарат Отривин, капли назальные 0,05%:

- После проведения трансназальной операции (хирургического вмешательства в области носа, при котором обнажается мозговая оболочка).
- При чрезмерной сухости или хроническом воспалении слизистой оболочки носа (сухой или атрофический ринит).
- При закрытоугольной глаукоме (повышенном внутриглазном давлении).
- При установленной гиперчувствительности к ксилометазолину или любому другому компоненту препарата.

Не используйте препарат, если что-либо из вышеперечисленного к Вам применимо.

### Особые указания и меры предосторожности

При применении лекарственного препарата Отривин капли могут возникнуть нарушения сна и зрения или головокружение, которые являются признаками гиперчувствительности. Необходимо обратиться к врачу, если:

- такие симптомы доставляют Вам значительный дискомфорт,
- насморк сохраняется или усиливается, или
- возникают дополнительные жалобы.

В следующих случаях Отривин капли следует применять с осторожностью и только после консультации с врачом или работником аптеки:

• при артериальной гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (например, синдроме удлиненного интервала QT). У пациентов с синдромом удлиненного интервала QT применение лекарственного препарата Отривин капли может привести к развитию тяжелых нарушений сердечного ритма;

- при гипертиреозе;
- при сахарном диабете;
- при увеличении предстательной железы;
- при феохромоцитома (опухоль надпочечников).

В случае, если Вы принимаете ингибиторыmonoаминоксидазы (препараты для лечения депрессии) или принимали их в течение последних 14 дней, применять лекарственный препарат Отривин капли не рекомендуется.

В случае, если Вы принимаете определенные лекарственные препараты для повышения настроения (три- или тетрациклические антидепрессанты) или средства для лечения болезни Паркинсона, применять Отривин капли также не следует.

Лекарственный препарат Отривин капли не рекомендуется применять более 7 дней, поскольку длительное применение препарата может привести к медикаментозному

отеку слизистой оболочки носа (медикаментозный или атрофический ринит), который по симптомам очень похож на насморк.

Необходимо следить за тем, чтобы лекарственный препарат не попал в полость рта или глаза.

Не рекомендуется превышать рекомендуемую дозу, особенно у детей и пациентов пожилого возраста.

#### *Вспомогательные вещества*

Бензалкония хлорид, входящий в состав препарата, может вызвать раздражение и отек слизистой оболочки полости носа, особенно при длительном применении.

#### *Дети*

Отривин капли не следует применять у детей в возрасте до 1 года. У детей в возрасте от 1 до 2 лет лекарственный препарат следует применять только по назначению врача. У детей в возрасте от 2 до 11 лет лекарственный препарат следует применять под наблюдением взрослых.

#### **Другие препараты и препарат Отривин, капли назальные 0,05%:**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, включая лекарственные препараты, приобретенные без рецепта.

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Лекарственный препарат Отривин капли не следует применять во время беременности. В период грудного вскармливания применение лекарственного препарата допускается только по назначению врача.

Перед применением лекарственных препаратов проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

При длительном применении и высоких дозировках ксилометазолина нельзя исключить возможные системные действия с кардиоваскулярными эффектами.

### **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОТРИВИН, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ 0,05%**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза**

Следует использовать самые низкие дозы и минимальную продолжительность приема, необходимую для достижения эффекта.


#### *Дети*

*Дети от 2 до 11 лет:* применять лекарственный препарат следует только под наблюдением взрослых.

Обычно применяют по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-2 раза в день. Не следует применять препарат более 3 раз в день.

*Дети от 1 до 2 лет:* применять лекарственный препарат следует согласно с назначением врача.

8890 - 2019

*Дети младше 1 года: применять лекарственный препарат противопоказано.***Способ применения**

Перед применением необходимо тщательно очистить носовые ходы (например, высморкаться).

Слегка наклоните голову назад. Закапайте капли в каждую ноздрю и сохраните прежнее положение головы еще некоторое время, чтобы капли распространились по всему носу.

Очистите и высушите пипетку после использования, прежде чем закрыть флакон.

**Продолжительность применения**

Не применяйте более 7 дней подряд. При отсутствии улучшения состояния или ухудшении симптомов в течение 7 дней необходимо обратиться к врачу.

Придерживайтесь дозы, указанной в листке-вкладыше или предписанной врачом. Если считаете, что препарат слишком слабый или слишком сильный, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

**Если Вы применили препарат Отривин, капли назальные 0,05%, больше, чем следовало**

- необходимо немедленно обратиться к врачу. Значительная передозировка лекарственного препарата или его непреднамеренное попадание внутрь может привести к отравлению.

**4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите применение лекарственного препарата Отривин капли и немедленно обратитесь к врачу, если у Вас или у Вашего ребенка наблюдается один из следующих симптомов, поскольку это может указывать на развитие аллергической реакции:

- затрудненное дыхание или глотание;
- отек лица, губ, языка и/или горла;
- сильный зуд с красной сыпью и/или бугорками на коже;
- нерегулярный сердечный ритм.

При приеме Отривина капель могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

*Часто (у 1–10 пациентов из 100):* сухость и раздражение слизистой оболочки носа, тошнота, головная боль и жжение в месте применения.

*Очень редко (менее чем у 1 пациента из 10 000):* аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), временное ухудшение зрения, нерегулярное или учащенное сердцебиение, медикаментозный отек слизистой оболочки носа (медикаментозный ринит).

Если Вы заметили у себя нежелательные реакции, обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это также касается, в частности, нежелательных реакций, не указанных в данном листке-вкладыше.

**Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в инструкции по

медицинскому применению (листке-вкладыше). Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## 5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ОТРИВИН, КАПЛИ НАЗАЛЬНЫЕ 0,05%

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе или картонной пачке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 30 °C.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

### Препарат Отривин, капли назальные 0,05%, содержит:

Действующим веществом является ксилометазолина гидрохлорид.

Вспомогательными веществами являются: натрия фосфат одноосновный двухводный, натрия фосфат двухосновный двенадцативодный, натрия хлорид, динатрия эдетат, бензалкония хлорид, метилгидроксипропилцеллюлоза 4000 mPa.S, сорбитол 70 %, вода очищенная.

### Внешний вид препарата Отривин, капли назальные 0,05%

Прозрачный раствор от бесцветного до бледно-желтого цвета практически без запаха.

По 10 мл в пластиковых флаконах с крышкой капельницей. Флакон вместе с инструкцией по применению помещен в пачку из картона.

### Срок годности

3 года.

### Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

### Держатель регистрационного удостоверения/ производитель

Хелеон КХ САРЛ, Рю де Летраз, 1260 Нyon, Швейцария/

Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

ТОО «ГСК КХ КАЗАХСТАН». г. Алматы, ул. Манаса, 32А

Тел.: 8 (727) 244-69-99

Электронная почта:

НД РБ

Отривин, капли назальные 0,05% – текст листка-вкладыша

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

BY

8890 - 2019

SafetyReportingEMEA@haleon.com (для сообщений о нежелательных явлениях)

CIS.LOC-PQC@haleon.com (для сообщений о претензиях к качеству препарата)

*Торговые марки принадлежат или используются по лицензии группой компаний Haleon.  
©2023 группа компаний Haleon или их лицензиар.*