

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**

ШАЛФЕЙ
(SALVIA)

Киле n 15 - 23.12.14

Торговое название: ШАЛФЕЙ

Международное непатентованное название (МНН): -

Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку:

Активные вещества:

Шалфея экстракт сухой ¹	12,50 мг
Шалфея масло эссенциальное	2,40 мг

Вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота, яблочная кислота, сорбит, аспартам, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, ароматизатор медовый², хинолиновый жёлтый Е-104, индигокармин Е-132.

Примечание:

¹ соотношение сырья к конечному продукту – 5,0-6,0 : 1, экстракт содержит 10 % (м/м) мальтодекстрина

² состав: идентичные натуральным ароматизаторы, натуральные ароматизаторы, растворитель монопропиленгликоль

Описание:

Таблетки плоские круглые со скошенным краем, голубовато-зелёного цвета с более светлыми и более тёмными вкраплениями, со специфическим запахом. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева.

Фармакотерапевтическая группа:

Прочие средства для местного лечения заболеваний полости рта.

Код АТХ: [A01AD11]

Фармакологические свойства:

Комбинированный препарат, содержащий комплекс биологически активных веществ. Оказывает противовоспалительное, противомикробное, муколитическое действие. Обладает вяжущими свойствами.

Фармакокинетика:

Лекарственное средство содержит различные биологически активные вещества, исследование фармакокинетики не проводилось.

Показания к применению:

В комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит).

Противопоказания:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью:

В связи с содержанием аскорбиновой кислоты назначать с осторожностью при следующих состояниях: гипероксалурия, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность, гемохроматоз, талассемия, полицитемия, лейкопения, сидеробластная анемия, дефицит

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, серповидноклеточная анемия, прогрессирующие злокачественные заболевания, повышенная свертываемость крови, тромбоз, склонность к тромбозам, тромбофлебит, сахарный диабет и состояния, сопровождающиеся повышенным содержанием сахара в крови.

Способ применения и дозы:

Местно. Держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослые: 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа.

Обычный курс лечения – 5-7 дней. Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. В связи с содержанием аскорбиновой кислоты возможно развитие желудочно-кишечных нарушений (изжога, диарея, тошнота, рвота), учащенного мочеиспускания (поллакиурия), повреждения гломерулярного аппарата почек, кристаллурии, образования уратных и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях, аллергических реакций (кожная сыпь, гиперемия кожи), тромбоцитоза, гиперпротромбинемии, гипергликемии, глюкозурии. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка:

Передозировка при приеме внутрь более 15 г листьев шалфея может проявляться ощущением жара, развитием тахикардии, головокружения и эпилептических судорог. В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Прием препаратов шалфея может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через ГАМК-рецепторы (например, барбитураты, бензодиазепины). Одновременное применение с данными лекарственными средствами не рекомендовано. Препараты шалфея могут взаимодействовать с гипогликемическими и противосудорожными средствами, усиливать седативное действие других лекарственных средств и алкоголя. Лекарственное средство может влиять на всасывание железа и других минералов. Лекарственное средство не рекомендовано применять одновременно с другими лекарственными средствами, содержащими аскорбиновую кислоту.

Меры предосторожности:

Не рекомендуется применять лекарственное средство более 1 недели.

В связи с содержанием сорбита лекарственное средство не следует принимать пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы. В связи с содержанием сорбита при приеме более 9 таблеток в сутки может оказывать легкое слабительное действие.

В связи с содержанием аспартама лекарственное средство не следует принимать пациентам с фенилкетонурией.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение при беременности и в период кормления грудью:

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации

противопоказано. Туйон, входящий в состав листьев шалфея, может оказывать неблагоприятное влияние на течение беременности.

Применение у детей:

Безопасность применения у детей до 18 лет не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных применять у детей до 18 лет не рекомендуется.

Влияние на способность вождения автомобиля и работу с техникой:

Применение лекарственного средства может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. Во время лечения пациентам не рекомендовано управлять автомобилем или работать с техникой.

Форма выпуска:

По 10 таблеток в блистере из ПВХ/Al. По 2 блистера в картонной пачке с инструкцией по применению.

Условия хранения:

При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.

Производитель:

Херкель Б.В.,
Нобельвег 6, 3899 ВN Зеевольде, Нидерланды
По заказу и под контролем:
Натур Продукт Европа Б.В., Нидерланды

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь