


Инструкция по медицинскому применению  
СЕПТИЛИН (SEPTILIN) таблетки

НД РБ

7500 - 2020

Регистрационный номер

Торговое название препарата  
Септилин



Лекарственная форма  
Таблетки

Состав

<b>Порошки:</b>	Balsamodendron mukul	Коммифора мукул (смесь масла, камеди и смолы)	: 324 мг
	Shankh bhasma	Шанкх басма (зола)	: 64 мг
<b>Экстракты:</b>	Maharasnadi quath	Махараснади кват* (многокомпонентная растительная смесь)	: 130 мг
	Tinospora cordifolia	Тиноспоры сердцелистной стебли	: 98 мг
	Rubia cordifolia	Марены сердцелистной корни	: 64 мг
	Emblica officinalis	Эмблики лекарственной плоды	: 32 мг
	Moringa pterygosperma	Моринги крылатосеменной листья	: 32 мг
	Glycyrrhiza glabra	Солодки голой корни	: 12 мг

- \* В состав 130 мг многокомпонентной растительной смеси «Махараснади кват» входят:
- терминалии чебули плоды - Terminalia chebula (Combretaceae) 30,654 мг;
  - терминалии беллерики плоды - Terminalia bellerica (Combretaceae) 30,654 мг;
  - эмблики лекарственной плоды - Emblica officinalis (Euphorbiaceae) 30,654 мг;
  - фагонии критской целое растение - Fagonia cretica (Zygophyllaceae) 1,729 мг;
  - сиды сердцелистной корень - Sida cordifolia (Malvaceae) 1,729 мг;
  - клещевины обыкновенной корень - Ricinus communis (Euphorbiaceae) 1,729 мг;
  - кедра гималайского древесина - Cedrus deodara (Roxb.ex Lamb.)G.Don (Pinaceae) 1,729 мг;
  - гедихия колоскового корневища - Hedychium spicatum (Zingiberaceae) 1,729 мг;
  - адатоды настоящей корни - Adhatoda vasica (Acanthaceae) 1,729 мг;
  - имбиря лекарственного корневища - Zingiber officinale (Zingiberaceae) 1,729 мг;
  - перца явского длинного стебли - Piper chaba (Piperaceae) 1,729 мг ;
  - сыти круглой клубень - Cyperus rotundus (Cyperaceae) 1,729 мг;
  - берхавии раскидистой корни - Boerhaavia diffusa (Nyctaginaceae) 1,729 мг;
  - тиноспоры сердцелистной стебли - Tinospora cordifolia (Menispermaceae) 1,729 мг;
  - аргирея красивая стебель - Argyreia speciosa (Convolvulaceae) 1,729 мг;
  - укропа индийского семена - Anethum sowa Roxb. ex Flem. (Apiaceae) 1,729 мг;
  - якорцев стелющихся плоды - Tribulus terrestris (Zygophyllaceae) 1,729 мг;
  - витании снотворной корни - Withania somnifera (Solanaceae) 1,729 мг;
  - кассии дудчатой плод - Cassia fistula (Fabaceae) 1,729 мг;
  - спаржи кистевидной корни - Asparagus racemosus Willd. (Liliaceae) 1,729 мг;
  - перца длинного плоды - Piper longum (Piperaceae) 1,729 мг;
  - барлерии пильчатой целое растение - Barleria prionitis (Acanthaceae) 1,729 мг;

- кориандра посевного семена - *Coriandrum sativum* (Apiaceae) 1,729 мг;
- паслена желтоплодного целое растение - *Solanum xanthocarpum* (Solanaceae) 1,729 мг;
- паслена индийского целое растение - *Solanum indicum* (Solanaceae) 1,729 мг.

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза, кросповидон, натрия кармеллоза, кремния диоксид коллоидный.

### **Описание**

Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки зеленовато-коричневого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие лекарственные средства.

Аюрведическое лекарственное средство.

**Код АТХ:** V03A.

### **Фармакологические свойства**

Многокомпонентное аюрведическое средство. Оказывает противовоспалительное действие. В экспериментальных исследованиях получены данные о возможном влиянии препарата на клеточные и гуморальные механизмы неспецифической резистентности. Механизм действия не установлен. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических или фармакокинетических параметров аюрведических средств невозможно.

### **Показания к применению**

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей (острый риносинусит, обострение хронического риносинусита, обострение хронического тонзиллофарингита).

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата.  
Детский возраст до 18 лет, беременность, период лактации.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь. По 2 таблетки 2 раза в день в течение 10-14 дней. В случае неполного купирования симптомов заболевания, лечение может быть продолжено до 4 недель в дозе по 1 таблетке 2 раза в день или по усмотрению врача.

В случае появления нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта доза препарата может быть снижена до 1 таблетки 2 раза в день. В случае, если снижение дозы не приводит к купированию симптомов, рекомендуется отмена препарата.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, ощущение сухости во рту, диспепсические явления (тошнота, диарея, метеоризм), абдоминальные боли, транзиторное повышение активности «печеночных» трансаминаз.

При возникновении побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Взаимодействие с другими препаратами**

Возможно применение в составе комплексной терапии с антибактериальными препаратами. Корень солодки, входящий в состав препарата, может препятствовать действию антигипертензивных средств. При одновременном применении с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, кортикостероидами и слабительными средствами возможно усиление гипокалиемии, совместный прием с данными средствами не рекомендован.

**Особые указания**

Препарат с осторожностью назначают пациентам с заболеваниями печени и/или почек, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипокалиемией, декомпенсацией сердечной деятельности.

Если во время приема препарата симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развивается нарушение дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

**Применение в педиатрии**

Препарат противопоказан детям и подросткам до 18 лет.

**Применение препарата во время беременности и лактации**

Применение препарата противопоказано во время беременности и лактации.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта, управлению механизмами**

О влиянии препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и прочими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера/оператора и другое) не сообщалось.

**Передозировка**

Сообщения о случаях передозировки отсутствуют.

Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Форма выпуска**

Таблетки по 60 расфасованы в пластиковый флакон с навинчиваемой крышкой. Горлышко флакона дополнительно затянато алюминиевой фольгой. Каждый флакон с Листком-вкладышем помещен в картонную пачку.

**Условия хранения**

В сухом, недоступном для детей месте, при температуре от + 10 до + 30 °С.

**Срок годности**

3 года. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта врача.

**Производитель**

Хималайя Веллнесс Компани, Макали, Бенгалуру 562 162, Индия.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь