

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
от «23» 04. 2021 № 441

НД РБ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного средства
ЛИНКАС пастилки

Торговое название: ЛИНКАС

Лекарственная форма: пастилки (с мятным, медово-лимонным, апельсиновым вкусами)

Описание:

Пастилки с мятным вкусом: пастилки коричневого цвета, круглые с мятным вкусом;

Пастилки с медово-лимонным вкусом: пастилки коричневого цвета, круглые с медово-лимонным вкусом;

Пастилки с апельсиновым вкусом: пастилки коричневого цвета, круглые с апельсиновым вкусом.

Состав:

Каждая пастилка содержит:

Активные компоненты: густые водные экстракты

Адхатоды сосудистой листвьев (5:1) – 30,0 мг,

Солодки голой корневищ с корнями (4:1) – 7,0 мг,

Перца длинного плодов (4:1) – 6,0 мг,

Калгана большого корневищ (4:1) – 3,0 мг,

Иссопа лекарственного листьев (4:1) – 3,0 мг,

Фиалки душистой листьев (4:1) – 2,0 мг

Вспомогательные компоненты:

для пастилок с медово-лимонным вкусом: ментол, эвкалиптовое масло, сахар, жидккая глюкоза, лимонная кислота безводная, тальк, парафин твердый, воск пчелиный желтый, ланолин, мягкий белый парафин, парафин жидкий, медово-лимонная эссенция;

для пастилок с апельсиновым вкусом: ментол, эвкалиптовое масло, сахар, жидкная глюкоза, лимонная кислота безводная, тальк, парафин твердый, воск пчелиный желтый, ланолин, мягкий белый парафин, парафин жидкий, апельсиновая эссенция;

для пастилок с мятным вкусом: ментол, эвкалиптовое масло, сахар, жидкная глюкоза, лимонная кислота безводная, тальк, парафин твердый, воск пчелиный желтый, ланолин, мягкий белый парафин, парафин жидкий, масло мяты перечной.

Фармакотерапевтическая группа:

Прочие средства, применяемые при простудных заболеваниях

Код ATX: R05X

Фармакологические свойства:

Комбинированный препарат растительного происхождения. Входящие в его состав компоненты оказывают противовоспалительное, отхаркивающее и муколитическое действие.

Фармакокинетика:

Поскольку Линкас пастилки является многокомпонентным растительным препаратом, изучение его фармакокинетики не представляется возможным.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (фарингит, трахеит, бронхит)

Способ применения и дозировка:

Взрослым следует медленно рассасывать в полости рта по 1 пастилке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза - 8 пастилок. Средний курс лечения 3 – 7 дней. Применение

лекарственного средства у детей до 18 лет противопоказано в связи с наличием в составе корня солодки.

НД РБ

Побочное действие:

5080 - 2021

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата. В связи с наличием в составе ментола возможно появление следующих побочных эффектов: кожная сыпь, головная боль, изжога, жжение в анальной области, брадикардия, дрожание мышц и атаксия, особенно при применении высоких доз. Возможно появление рецидивирующей мышечной боли. При появлении побочных эффектов необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Заболевания печени и/или почек, артериальная гипертензия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипокалиемия, сахарный диабет, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозна ямальабсорбция, недостаточность сахаразы-изомальтазы, детский возраст (до 18 лет), беременность и период лактации, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта или желчного пузыря, нарушения функции печени.

Передозировка:

Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности:

Пастилки содержат сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете. В одной пастилке содержится количество углеводов, соответствующее 0,18 ХЕ.

При появлении или нарастании одышки, лихорадки или гнойной мокроты необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и лактации:

Применение лекарственного средства у беременных и в период грудного вскармливания противопоказано в связи с отсутствием данных о безопасности.

Применение при управлении автомобилем и работе с механизмами:

Исследований по оценке влияния применения лекарственного средства на способность к вождению автотранспорта и работу с движущимися механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и пищевыми продуктами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Экстракт корней солодки может вызывать снижение эффективности антигипертензивных лекарственных средств. Не рекомендуется одновременное применение с диуретиками, сердечными гликозидами, кортикоステроидами, стимулирующими слабительными или другими лекарственными средствами, влияющими на электролитный баланс.

Форма выпуска:

8 пастилок в блистере из алюминиевой фольги. Два блистера с инструкцией по применению в коробке из картона

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Удостоверено
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25°C.
Беречь от детей.

НД РБ

Срок годности:


3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

5080 - 2021

Условия отпуска из аптек:

Отпускается без рецепта.

Производитель:



Herbion Pakistan Private Limited / Хербион Пакистан Прайвейт Лимитед
Карачи, Пакистан.

Представительство компании «Herbion Pakistan Private Limited» в Республике Беларусь:
220030, г. Минск, пр. Независимости, д.25, к.131, т./ф.: 200-84-01
Website: www.herbion.com