


**ИНСТРУКЦИЯ****(листок-вкладыш)**

по медицинскому применению лекарственного средства

**ТЕТРАЦИКЛИН-АКОС****Торговое название препарата:** Тетрациклин-АКОС.**Международное непатентованное название:** тетрациклин.**Описание:** Мазь желтого цвета.**Состав:**

Активное вещество: тетрациклина гидрохлорид (в пересчете на тетрациклин) – 0,450 г;

Вспомогательные вещества: ланолин безводный; парафины нефтяные твердые; церезин; натрия дисульфит; вазелин – до 15 г.

**Форма выпуска:** мазь для наружного применения 3 %.**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробные средства для лечения заболеваний кожи. Антибиотики для наружного применения.**Код АТС:** [D06AA04]**Фармакологические свойства***Фармакодинамика*

Бактериостатический антибиотик широкого спектра из группы тетрациклинов. Нарушает образование комплекса между транспортной РНК и рибосомой, что приводит к нарушению синтеза белка. Тетрациклин активен в отношении *Propionibacterium acnes* (*Corynebacterium acnes*), грамположительных (*Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Haemophilus influenzae*, *Listeria* spp., *Bacillus anthracis*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Neisseria gonorrhoeae*, *Bordetella pertussis*, *Escherichia coli*, *Enterobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Salmonella* spp., *Shigella* spp.), а также *Rickettsia* spp., *Chlamidia* spp., *Mycoplasma* spp., *Treponema* spp.

Устойчивы к тетрациклину: *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp., *Serratia* spp., большинство штаммов *Bacteroides* spp. и грибов, мелкие вирусы.

*Фармакокинетика*

При нанесении на неповрежденную кожу практически не всасывается.

**Показания к применению**

Угри обыкновенные, особенно с признаками воспаления. Бактериальные инфекции кожи: фурункулез, экзема инфицированная, фолликулит.

**Способ применения и дозы**

Наружно, мазь наносят на пораженные участки кожи 1-2 раза в сутки (возможно наложение марлевой повязки). Продолжительность лечения от нескольких дней до 2-3 недель в зависимости от эффективности лечения и индивидуальной чувствительности пациента к компонентам препарата. Определяется врачом индивидуально.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, повышенная чувствительность к другим антибактериальным средствам тетрациклинового ряда; грибковые заболевания кожи, детский возраст (до 11 лет).

**Передозировка**

Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.

### **Побочное действие**

Аллергические реакции: жжение, гиперемия кожи, зуд, изменение цвета кожи; фотосенсибилизация; реакции гиперчувствительности, включая системные; аллергические реакции (отек Квинке, кожные высыпания), отечность или др. признаки раздражения.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства или обратиться к врачу.

### **Меры предосторожности**

#### *Особые указания*

Не рекомендуется применять при глубоких или колотых ранах, тяжелых ожогах, в офтальмологии (используют 1% глазную мазь).

Следует иметь в виду, что использование антибактериальных лекарственных средств для наружного применения может привести к сенсибилизации организма, сопровождающейся развитием реакций повышенной чувствительности.

Если в течение 2 недель состояние не улучшается, следует проконсультироваться с врачом.

При применении в рекомендованных дозах системное действие отсутствует, но при применении на обширных участках кожи в течение длительного времени следует учитывать возможность системного действия препарата. В связи с возможным развитием фотосенсибилизации необходимо ограничение инсоляции на период лечения.

#### *Применение в период беременности и лактации*

Применение в период беременности противопоказано. При применении препарата в период кормления грудью на время лечения кормление грудью следует прекратить.

#### *Применение у детей*

Адекватных и строго контролируемых исследований у детей до 11 лет не проведено; дозы для данной категории пациентов не определены.

Лекарственное средство не ограничивает психическую и двигательную способность, а также способность управлять транспортными средствами и механизмами.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Тетрациклин нельзя применять одновременно со средствами для наружного применения, содержащими спирт, а также средствами личной гигиены, которые сужают поры, что ведет к снижению активности тетрациклина. Тетрациклин нельзя применять одновременно с мылом, которое имеет сильное высушивающее действие, изотретионином.

Тетрациклин несовместим со средствами, которые вызывают шелушение кожи: бензоилпероксид, резорцин, салициловая кислота или сера.

### **Беременность и лактации**

Применение в период беременности противопоказано. При применении препарата в период кормления грудью на время лечения кормление грудью следует прекратить.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами**

Лекарственное средство не ограничивает психическую и двигательную способность, а также способность управлять транспортными средствами и механизмами.

### **Условия и срок хранения**

В сухом месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

3 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.


### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Упаковка**

По 15 г в тубах алюминиевых.

Каждую тубу с листком-вкладышем помещаю в пачку из картона



**Информация о производителе**

Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез").

640008, Россия, г. Курган, пр. Конституции, 7

тел/факс: (3522) 48-16-89

E-mail: [real@kurgansintez.ru](mailto:real@kurgansintez.ru)

Интернет-сайт: [www.kurgansintez.ru](http://www.kurgansintez.ru)