

Листок-вкладыш – информация для пациента

**Аугментин 200 мг/28,5 мг/5 мл, порошок для приготовления суспензии для приема
внутри**

**Аугментин 400 мг/57 мг/5 мл, порошок для приготовления суспензии для приема
внутри**

Действующие вещества: Амоксициллин + [Клавулановая кислота]

Перед приемом данного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните данный листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.
- Этот препарат обычно назначают детям младшего или среднего возраста. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания схожи с симптомами у Вашего ребенка.
- Если у ребенка возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Аугментин, и для чего его принимают
2. О чем следует знать перед приемом препарата Аугментин
3. Прием препарата Аугментин
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Аугментин
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

1. Что из себя представляет препарат Аугментин, и для чего его принимают

Препарат Аугментин представляет собой антибиотик, а принцип его действия заключается в уничтожении бактерий, вызывающих инфекции. В его состав входят два действующих вещества под названиями «амоксициллин» и «клавулановая кислота». Амоксициллин принадлежит к группе лекарственных средств под названием «пенициллины», действие которых иногда может нарушаться (инактивироваться). Второе действующее вещество (клавулановая кислота) не дает этому произойти.

Показания к применению

Препарат Аугментин применяется у детей младшего и среднего возраста для лечения следующих инфекций:

- инфекции среднего уха и синуситы
- инфекции дыхательных путей
- инфекции мочевыводящих путей

- инфекции кожи и мягких тканей, включая стоматологические инфекции
- инфекции костей и суставов.

5323 - 2020

Если улучшение не наступило, или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Аугментин

Противопоказания

Не принимайте препарат Аугментин у своего ребенка в следующих случаях:

- при наличии аллергии на амоксициллин, клавулановую кислоту, пенициллин или любой из других компонентов данного препарата (указаны в разделе 6).
- если у ребенка когда-либо была тяжелая аллергическая реакция на прием какого-либо другого антибиотика. Сюда можно отнести кожные высыпания либо отек лица или горла.
- если у ребенка когда-либо были проблемы с печенью или желтуха (пожелтение кожи) при приеме антибиотиков.

→ Не применяйте препарат Аугментин у своего ребенка, если что-либо из вышеуказанного применимо в Вашем случае. Если Вы не уверены, обратитесь к своему лечащему врачу или работнику аптеки перед использованием лекарственного препарата Аугментин.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Аугментин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- при наличии мононуклеоза
- если ребенок получает лечение по поводу заболевания печени или почек
- при наличии у ребенка нерегулярного мочеиспускания.

Если Вы не уверены, относится ли к Вашему ребенку что-либо из перечисленного выше, то перед началом использования препарата Аугментин проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В некоторых случаях Вашему лечащему врачу может понадобиться определение типа бактерии, вызывающей инфекционное заболевание у Вашего ребенка. В зависимости от полученных результатов, Вашему ребенку может быть назначена другая доза препарата Аугментин или другой лекарственный препарат.

Состояния, на которые следует обратить внимание


Препарат Аугментин может вызывать усугубление некоторых сопутствующих заболеваний или серьезные нежелательные реакции. К ним относятся аллергические реакции, судороги (припадки), боль в грудной клетке, и воспаление толстой кишки. Вы должны обращать внимание на появление определенных симптомов, пока Ваш ребенок принимает препарат Аугментин, с целью уменьшения риска возникновения каких-либо проблем. См. «Состояния, на которые следует обратить внимание» в разделе 4.

Анализ крови и мочи

Если Вашему ребенку назначены анализы крови (исследование эритроцитарных показателей или функциональных проб печени) или мочи (наличие глюкозы), сообщите врачу или медицинской сестре, что Ваш ребенок принимает препарат Аугментин. Препарат Аугментин может влиять на результаты данных видов анализов.

Другие препараты и препарат Аугментин

5323 - 2020



Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Ваш ребенок принимает, недавно принимал или может начать принимать какие-либо другие препараты.

Если Ваш ребенок принимает аллопуринол (используется при подагре) одновременно с препаратом Аугментин, повышается вероятность развития кожной аллергической реакции.

Не рекомендуется одновременное применение с пробенецидом, так как может снижаться экскреция амоксициллина.

Если кроворазжижающие лекарственные препараты (такие как варфарин) применяются одновременно с приемом препарата Аугментин, то может понадобиться выполнение дополнительных анализов крови.

Препарат Аугментин может влиять на работу метотрексата (лекарственного препарата, применяющегося для лечения рака, тяжелого псориаза или ревматических заболеваний). Одновременное применение с пенициллинами может снижать экскрецию метотрексата, вызывая потенциальное повышение развития нежелательных реакций.

Препарат Аугментин может влиять на работу микофенолата мофетила (лекарственного препарата, применяющегося для предотвращения отторжения пересаженных органов).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Ваш ребенок, который собирается принимать данный лекарственный препарат, является беременной или кормит грудью, предполагает, что может быть беременной или планирует беременность, перед началом приема данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Аугментин может вызывать нежелательные реакции, и их симптомы могут приводить к неспособности управлять транспортными средствами.

Воздержитесь от вождения транспортного средства или управления механизмами, если плохо себя чувствуете.

Препарат Аугментин содержит аспартам, бензиловый спирт и мальтодекстрин

Препарат Аугментин, 200 мг/28,5 мг/5 мл:

- Данный лекарственный препарат содержит 2,5 мг аспартама в одном миллилитре. Аспартам является источником фенилаланина. Он может причинить вред детям с врожденной фенилкетонурией, редким генетическим заболеванием, при котором фенилаланин накапливается, так как организм не может его вывести надлежащим образом.
- Данный лекарственный препарат содержит 0,00124 мг бензинового спирта в одном миллилитре. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции.
- Бензиловый спирт связан с риском возникновения тяжелых нежелательных реакций, включая проблемы с дыханием (так называемый «синдром удушья») у маленьких детей. Не давайте препарат новорожденному (в возрасте до 4 недель), если это не рекомендовано врачом.
- Не применяйте препарат более недели для лечения детей младшего возраста (до 3 лет), если это не рекомендовано Вашим лечащим врачом или работником аптеки.
- Данный лекарственный препарат содержит мальтодекстрин (глюкозу). Если у Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров, то проконсультируйтесь с врачом перед началом использования данного лекарственного препарата.

Препарат Аугментин, 400 мг/57 мг/5 мл:

5323 - 2020

- Данный лекарственный препарат содержит 2,5 мг аспартама в одном миллилитре. Аспартам является источником фенилаланина. Он может причинить вред детям с врожденной фенилкетонурией, редким генетическим заболеванием, при котором фенилаланин накапливается, так как организм не может его вывести надлежащим образом.
- Препарат Аугментин содержит следовые количества бензилового спирта. Бензиловый спирт может вызывать аллергические реакции.
- Бензиловый спирт связан с риском возникновения тяжелых нежелательных реакций, включая проблемы с дыханием (так называемый «синдром удушья») у маленьких детей. Не давайте препарат новорожденному (в возрасте до 4 недель), если это не рекомендовано врачом.
- Препарат Аугментин содержит мальтодекстрин (глюкозу). Если у Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров, то проконсультируйтесь с врачом перед началом использования данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата Аугментин

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые или дети с массой тела 40 кг или более

- Данная суспензия обычно не рекомендуется для применения у взрослых или детей с массой тела 40 кг и более. Посоветуйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки.

Прием у детей и подростков

Дети с массой тела менее 40 кг

Все дозы рассчитываются на основании массы тела ребенка в килограммах.

- Ваш лечащий врач укажет количество препарата Аугментин, которое следует давать Вашему ребенку.
- В комплекте Вам предоставлена или пластиковая дозирующая ложка, или дозирующий колпачок, или шприц. Вам следует использовать их, чтобы дать своему ребенку правильную дозу.
- Рекомендованная доза препарата Аугментин, 200 мг/28,5 мг/5 мл — от 25 мг/3,6 мг (0,6 мл суспензии на 1 кг массы тела в сутки) до 45 мг/6,4 мг/кг/сут (1,2 мл суспензии на 1 кг массы тела в сутки), ее следует разделить на два приема.
- Более высокая доза препарата Аугментин, 200 мг/28,5 мг/5 мл — до 70 мг/10 мг/кг/сут (1,8 мл суспензии на 1 кг массы тела в сутки), ее следует разделить на два приема.
- Рекомендованная доза 400 мг/57 мг/5 мл — от 25 мг/3,6 мг (0,4 мл суспензии на 1 кг массы тела в сутки) до 45 мг/6,4 мг/кг/сут (0,6 мл суспензии на 1 кг массы тела в сутки), ее следует разделить на два приема.
- Более высокая доза 400 мг/57 мг/5 мл — до 70 мг/10 мг/кг/сут (1,0 мл суспензии на 1 кг массы тела в сутки), ее следует разделить на два приема

**Пациенты с нарушением функции почек и печени**

- Если у Вашего ребенка имеется нарушение функции почек, то доза может быть снижена. Вашим лечащим врачом могут быть подобраны другая доза или другой препарат.
- Если у Вашего ребенка имеются нарушения функции печени, то могут быть назначены более частые анализы для изучения работы функции печени.

При указанных нарушениях необходима консультация лечащего врача в случае приема больших объемов препарата, поскольку большие количества бензилового спирта могут накапливаться в вашем организме и вызывать нежелательные реакции (метаболический ацидоз).

Путь и (или) способ введения**Препарат Аугментин, 200 мг/28,5 мг/5 мл:**

- Перед каждым применением флакон следует встряхивать
- Принимать одновременно с приемом пищи
- Приемы препарата следует равномерно распределить в течение дня. Интервал между приемами должен составлять не менее 4 часов. Не принимать 2 дозы в течение 1 часа.
- Не давайте Аугментин своему ребенку более 2 недель. Если Ваш ребенок все еще чувствует себя плохо, то Вам следует снова посетить лечащего врача.

Препарат Аугментин, 400 мг/57 мг/5 мл:

- Перед каждым применением флакон следует встряхивать
- Применять в начале приема пищи или незадолго до приема пищи
- Приемы препарата следует равномерно распределить в течение дня. Интервал между приемами должен составлять не менее 4 часов. Не принимать 2 дозы в течение 1 часа.
- Не давайте препарат Аугментин своему ребенку в течение более 2 недель. Если Ваш ребенок все еще чувствует себя плохо, то Вам следует снова посетить лечащего врача.

Если Вы дали дозу препарата Аугментин, которая превышает назначенную

Если Вы дали своему ребенку слишком большое количество препарата Аугментин, то симптомы могут включать в себя расстройство желудка (тошноту, рвоту или диарею) или судороги. Обратитесь к своему лечащему врачу как можно скорее. Возьмите с собой флакон лекарственного препарата, чтобы показать врачу.

Если Вы забыли дать препарат Аугментин

Если Вы пропустили прием дозы, то дайте препарат ребенку, как только вспомнили об этом. Не применяйте следующую дозу слишком рано, а подождите около 4 часов, прежде чем давать следующую дозу. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата Аугментин

Продолжайте давать своему ребенку препарат Аугментин до окончания лечения, даже если ему стало лучше. Для борьбы с инфекцией Вашему ребенку необходима каждая доза. Если некоторое количество бактерий сохранит жизнеспособность, то это может привести к возобновлению инфекционного процесса.

В случае возникновения любых иных вопросов о применении данного препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом, работником аптеки или медицинской сестрой.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Аугментин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Следующие нежелательные реакции могут произойти при применении этого лекарственного средства.

Прекратите прием препарата Аугментин и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:

Аллергические реакции:

- кожная сыпь
- воспаление кровеносных сосудов (васкулит), которое может выражаться в появлении красных или фиолетовых возвышающихся элементов на коже, но может поражать и другие части тела
- лихорадка, боль в суставах, увеличение шейных, подмышечных или паховых лимфоузлов
- отек, иногда лица или горла (ангионевротический отек), приводящий к затруднению дыхания
- потеря сознания
- боль в грудной клетке, которая может быть признаком потенциально серьезной аллергической реакции, называемой синдромом Коуниса;

Воспаление толстой кишки

Воспаление толстой кишки, обычно сопровождающееся водянистой диареей с примесью слизи и крови, болью в животе и/или лихорадкой.

Синдром энтероколита, индуцированного лекарственным препаратом

О синдроме лекарственного энтероколита сообщалось главным образом у детей, получавших амоксициллин. Это аллергическая реакция с ведущим симптомом повторяющейся рвоты (через 1-4 часа после приема препарата). Дополнительные симптомы могут включать боль в животе, вялость, диарею, низкое кровяное давление.

Острое воспаление поджелудочной железы (острый панкреатит)

Если у Вас сильная и постоянная боль в области живота, это может быть признаком острого панкреатита.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Аугментин.


Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- молочница (*кандидоз* — грибковая инфекция влагалища, полости рта или кожных складок),
- тошнота, особенно при приеме высоких доз,
- рвота (при возникновении данного симптома давайте препарат Аугментин одновременно с приемом пищи),
- диарея (у детей - при возникновении данного симптома давайте препарат Аугментин одновременно с приемом пищи).

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- кожная сыпь, зуд,
- волдыри, сопровождающиеся зудом (*крапивница*),
- расстройство пищеварения,

5323 - 2020



- головокружение,
- головная боль,
- повышение активности некоторых веществ (*ферментов*), вырабатываемых печенью.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- кожная сыпь, иногда в виде пузырей, «мишеневидная» (темное пятно, окруженное более светлым кольцом, с более темным кольцом по периферии — *мультиформная эритема*),
- пониженное количество клеток, участвующих в свертывании крови,
- пониженное количество лейкоцитов.

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно):

- воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг (асептический менингит),
- увеличение времени свертывания крови,
- гиперактивность,
- черный «волосатый» язык,
- пятна на зубах (у детей), обычно пропадают после чистки зубов,
- сыпь с пузырьками, расположенными по кругу с корками в центре или в виде нити жемчуга (линейная болезнь IgA),
- выраженное снижение количества лейкоцитов,
- уменьшение количества эритроцитов из-за чрезмерного их распада, что вызывает развитие анемии, или малокровия (*гемолитическая анемия*),
- кристаллы в моче, приводящие к острому повреждению почек.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32-2

Государственное учреждение «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств «Госфармнадзор»

Телефон: +375 (17) 242-00-29 Факс: +375 (17) 271-25-75

Электронная почта: pharm@gospharmnadzor.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://gospharmnadzor.by>

5. Хранение препарата Аугментин

Храните данный лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Сухой порошок

5323 - 2020

Невскрытый флакон: хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.

Не использовать данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на картонной коробке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Приготовленная суспензия

Приготовленная суспензия: хранить в холодильнике при температуре 2-8 °С.

После приготовления суспензию необходимо использовать в течение 7 дней.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в сточные воды или коммунально-бытовые отходы. Обратитесь к работнику аптеки за информацией об утилизации лекарственных препаратов, которые Вы больше не принимаете. Данные меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения**Препарат Аугментин содержит**

Действующими веществами являются амоксициллин и клавулановая кислота.

Каждые 5 мл готовой суспензии для приема внутрь содержат 200,0 мг или 400,0 мг амоксициллина (действующего вещества) и 28,5 мг или 57,0 мг клавулановой кислоты (действующего вещества).

Вспомогательными веществами являются ксантановая камедь, аспартам (E951), кислота янтарная, кремния диоксид коллоидный безводный, гидроксипропилметилцеллюлоза (безводная), сухой апельсиновый ароматизатор 1 и 2, сухой малиновый ароматизатор, сухой ароматизатор «Светлая патока» (содержит мальтодекстрин и бензиловый спирт), кремния диоксид (безводный).

Каждый миллилитр приготовленной суспензии содержит 2,5 мг аспартама (E951). В состав ароматизатора «Светлая патока» входят мальтодекстрин (глюкоза) и следовые количества бензилового спирта (см. раздел 2).

Лекарственный препарат Аугментин представляет собой сыпучий порошок белого или почти белого цвета. При разведении образуется суспензия от белого до желто-коричневого цвета.

Внешний вид препарата Аугментин и содержимое упаковки

По 7,7 г (для дозировки 200 мг/28,5 мг в 5 мл) или 12,6 г (для дозировки 400 мг/57 мг в 5 мл) препарата во флакон из прозрачного стекла. Флакон закрыт навинчивающейся алюминиевой крышкой с полимерной прокладкой с контролем первого вскрытия или закрыт крышкой с внутренней и внешней оболочкой из полипропилена или полиэтилена высокой плотности и индукционной герметизирующей прокладкой с устройством против вскрытия флакона детьми и термозапечатываемой мембраной. По одному флакону вместе с листком-вкладышем и дозирующей ложкой (градуировка 2,5 мл и 5,0 мл размещена на черпаке (2,5 мл) и ручке (5 мл)) или шприцем объемом 6 мл и шагом градуировки 0,2 мл в картонную коробку.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Российская Федерация

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37А, корпус 4, этаж 3, помещение XV,
комната 1

Производитель

Глаксо Вэлком Продакшен, Франция

Промышленная Зона Пейеньер, 53100 Майенн, Франция

Glaxo Wellcome Production, France

ZI de la Peyenniere, 53100 Mayenne, France

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Российская Федерация

Жалобы на качество лекарственного препарата необходимо направлять на адрес электронной почты: qdnpc.complaints@gsk.com.

Сообщения о нежелательных реакциях необходимо направлять на адрес электронной почты: by.safety@gsk.com.

Листок-вкладыш пересмотрен

ММ.ГГГГ

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в государственном реестре лекарственных средств Республики Беларусь: <https://rceth.by/Refbank>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке в государственном реестре лекарственных средств и на официальном сайте экспертной организации: www.rceth.by.

Права на обладание товарными знаками принадлежат группе компаний GSK.

©2026 Группа компаний GSK или их правообладатель.

Рекомендации/медицинские данные

Антибиотики используются для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями. Они не являются эффективными в отношении инфекционных заболеваний, вызываемых вирусами.

В некоторых случаях инфекционное заболевание, вызванное бактериями, не отвечает на курс антибиотикотерапии. Одной из наиболее частых причин этого является устойчивость бактерий, вызывающих инфекционное заболевание, к принимаемому антибиотику. Это означает, что они способны выживать и даже размножаться, несмотря на проводимую антибиотикотерапию.

Бактерии могут вырабатывать устойчивость к антибиотикам по различным причинам. Использование антибиотиков с осторожностью может помочь снизить шанс выработки у бактерий устойчивости к ним.

Если Ваш лечащий врач назначает Вам курс антибиотика, он предназначен для лечения исключительно Вашего настоящего заболевания. Внимательное отношение к


следующим рекомендациям поможет предотвратить появление устойчивых штаммов бактерий, способных нарушать работу антибиотика.

1. Очень важно принимать антибиотик в правильной дозе, в правильное время и в течение правильного количества дней. Прочтите инструкции на этикетке, и, если Вам ничего не понятно, обратитесь за пояснениями к своему врачу или работнику аптеки.
2. Вам не следует принимать антибиотик, если он не был назначен конкретно Вам, а также Вы должны использовать его только для лечения инфекции, по поводу которой он был прописан.
3. Не принимайте антибиотики, которые были прописаны другим лицам, даже если они страдали инфекционным заболеванием, схожим с Вашим.
4. Не передавайте назначенные Вам антибиотики другим лицам.
5. Если у Вас имеются остатки антибиотика после завершения назначенного врачом курса лечения, то Вам следует принести их в аптеку для соответствующей утилизации.


Инструкция по приготовлению суспензии препарата перед применением

Снимите крышку с флакона. Проверьте целостность пломбы с подложкой из фольги перед использованием. Верните крышку на флакон.

1. Встряхните флакон, чтобы разрыхлить порошок.



2. Снимите крышку с флакона.



3. Отогните пломбу с подложкой из фольги.



4. Наполните флакон водой до уровня чуть ниже линии на флаконе или этикетке. Верните крышку на флакон, переверните и хорошо встряхните, затем долейте воду точно до линии. Верните крышку на флакон, переверните и снова хорошо встряхните.
5. Хранить в холодильнике и всегда встряхивать перед использованием.

После приготовления суспензию необходимо использовать в течение 7 дней.


Инструкция по использованию шприца

Шприц предназначен только для использования с лекарственным препаратом Аугментин и не должен использоваться для введения каких-либо других препаратов, так как метки являются специфичными для данного продукта. Шприц поставляется с переходником, который позволяет присоединить его к флакону.

Доза указана в миллилитрах (мл) на мерном шприце для приема препарата внутрь. Вы должны давать своему ребенку дозу, рекомендованную его лечащим врачом.

Проверьте чистоту шприца и переходника перед использованием, при необходимости промойте чистой водой.


1. Перед каждым использованием встряхивайте суспензию во флаконе.
2. Снимите переходник со шприца. Крепко удерживая флакон, вставьте переходник в горлышко флакона (переходник должен оставаться на месте).




3. Вставьте шприц в переходник, обеспечивая его надежное закрепление.




4. Переверните флакон, удерживая шприц на месте, и наберите требуемую дозу, назначенную врачом.




5. Верните флакон в вертикальное положение и отсоедините шприц.




6. Для введения дозы осторожно поместите кончик шприца в рот и медленно надавите на поршень шприца (повторите этапы 3, 4, 5 и 6, если для получения дозы необходимо более одного шприца). Ребенок должен находиться в вертикальном положении.



7. Тщательно промойте шприц в чистой воде. Дайте шприцу полностью высохнуть перед следующим использованием.



8. Верните крышку на флакон.



9. Хранить в холодильнике и всегда встряхивать перед использованием.

НД РБ

5323 - 2020

После приготовления суспензию необходимо использовать в течение 7 дней.

