

Регистрационный номер: ЛС-000548 от 06.05.2010

Торговое название препарата: ВИТРУМ® КАРДИО ОМЕГА-3

МНН или группировочное название: Омега-3 триглицериды [ЭПК/ДГК=1.5/1-50%]&

Лекарственная форма: капсулы

Состав: одна капсула содержит:

Активные действующие вещества:

Омега-3-полиненасыщенных жирных кислот этиловые эфиры 1000 мг

в т. ч. в состав которых входят:

Эйкозапентаеновая кислота (ЕРА) 300 мг

Докозагексаеновая кислота (DHA) 200 мг

Альфа-токоферол (Витамин Е) 2,00 мг

Состав оболочки капсулы: желатин – 261,7 мг, глицерол – 117,8 мг, вода очищенная – 235,5 мг.

Описание

Прозрачные, от светло-желтого до темно-желтого цвета, овальной формы мягкие желатиновые капсулы. Содержимое капсул – прозрачная маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа


Гиполипидемическое средство

Код АТХ: [C10AX06]

Фармакологические свойства

Препарат представляет собой комбинацию полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства Омега-3 эйкозапентаеновой кислоты (ЕРА), докозагексаеновой кислоты (DHA) и витамина Е.

Препарат применяется при нарушениях липидного обмена, обусловленных выраженной гипертриглицеридемией, обладает противовоспалительным действием. Способствует нормализации содержания ЛПНП и ЛПОНП, изменению жидкостных свойств мембран клеток и повышению функциональной активности мембранных рецепторов, что способствует улучшению липидно-клеточного взаимодействия липопротеидов с ферментами, улучшению метаболизма липопротеидов. Способствует нормализации обмена липидов крови. Антиагрегантное действие препарата связано с замещением арахидоновой кислоты в составе фосфолипидов мембраны клеток или с торможением агрегации тромбоцитов в результате влияния на липидные свойства рецепторов с тромбоксаном А₂/простагладином H₂. Противовоспалительное действие обусловлено уменьшением продукции метаболитов простагландина E₂, достигаемое включением в биосинтез эссенциальных жирных кислот. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты тормозят воспаление, уменьшают способность артерий к вазоконстрикции, снижают агрегацию тромбоцитов.



Данный комплекс незаменимых полиненасыщенных жирных кислот применяется для нормализации липидного обмена и снижения риска развития атеросклероза. Витамин Е обладает антиоксидантной активностью, участвует в тканевом дыхании и других важнейших процессах тканевого метаболизма; защищает клетки и ткани от повреждающего действия избыточных количеств свободных радикалов и перекисных продуктов.

Показания к применению

- профилактика дислипидемии (нарушение липидного обмена);
- комплексная терапия нарушений липидного обмена, в том числе включающая диету, статины.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, обострение хронического холецистита и панкреатита, обострение заболеваний гепатобилиарной системы, желчнокаменная болезнь; патологические состояния, включающие геморрагический синдром. Детский возраст до 18 лет.

Применение препарата в период беременности и лактации

В период беременности и грудного вскармливания рекомендуется принимать препарат только по назначению врача.

Способ применения и дозы

Рекомендуется принимать взрослым внутрь, запивая водой:

- с профилактической целью – по 1 капсуле в сутки, через 30 минут после еды;
- с лечебной – по 1 капсуле 2-3 раза в сутки, через 30 минут после еды.

Курс лечения не менее 3 месяцев. Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочное действие

Аллергические реакции. Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: гастроэзофагеальный рефлюкс или отрыжка с запахом или привкусом рыбы, тошнота, рвота, диарея.

При длительном применении в больших дозах возможно обострение хронического панкреатита.

Передозировка

Симптомы передозировки: боль в эпигастральной области, диспептические расстройства (тошнота, рвота, диарея).

Лечение: симптоматическое, отмена препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Одновременный прием с пероральными антикоагулянтами способствует риску увеличения времени кровотечения. Одновременный прием с варфарином не приводит к развитию геморрагических осложнений (однако при комбинированном приеме или после прекращения курса лечения препаратом необходим контроль протромбинового времени). Не рекомендуется одновременный прием с фибратами. Во время приема препарата «ВИТРУМ® КАРДИО ОМЕГА-3» не рекомендуется прием других препаратов, содержащих витамин Е.

Особые указания

