



ЧД РБ 6317 - 2012

ЛИСТОК ВКЛАДЫШ: ИНФОРМАЦИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ЖЕЛУДОЧНЫЕ КАПЛИ ГАСТОМЕД

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Прозрачный раствор желтовато-зеленовато-коричневого цвета, горького вкуса. При смешивании с эквивалентным объемом воды – мутнеет.

В процессе хранения возможно выпадение осадка.

СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

В 1 мл содержится:

Настойка из корней Валерианы лекарственной (<i>Valeriana officinalis</i>) 1:5 (экстрагент 70 % (V/V) этанол),	0.4 мл
Настойка из травы Полыни горькой (<i>Artemisia absinthium</i>) 1:5 (экстрагент 70 % (V/V) этанол),	0.3 мл
Настойка из листьев Мята перечной (<i>Mentha piperita</i>) 1:20 (экстрагент 90 % (V/V) этанол),	0.2 мл
Настойка из листьев Красавки обыкновенной (<i>Atropa belladonna</i>) 1:10 (экстрагент 70 % (V/V) этанол).	0.1 мл

ФОРМА ВЫПУСКА

Капли для приема внутрь.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА

Лекарственные средства для нормализации функциональной активности желудочно-кишечного тракта.

КОД КЛАССИФИКАЦИИ

Фармакотерапевтическая группа по АТС: А03АХ.

Прочие средства для лечения функциональных расстройств кишечника (Other drugs for functional bowel disorders).

ДЕЙСТВИЕ


Комплекс биологически активных веществ лекарственных растений, входящий в состав лекарственного средства ЖЕЛУДОЧНЫЕ КАПЛИ ГАСТОМЕД, благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: стимулирует аппетит, снижает тонус гладкой мускулатуры, нормализует работу пищеварительных желез, уменьшает скопление газов.


ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при симптоматическом лечении расстройств пищеварения, таких как снижение аппетита, диспепсия и метеоризм, в комплексном лечении синдрома раздраженного кишечника.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

Принимать по 10 - 20 капель 2 - 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.





Не следует использовать препарат в течение более 2 недель. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

Перед употреблением взбалтывать.

Для правильного дозирования препарата, рекомендуется держать флакон-капельницу под наклоном 45 градусов.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Аллергические реакции на какой-либо из компонентов препарата: крапивница, зуд, сыпь. Могут наблюдаться сухость во рту, тахикардия, задержка мочеиспускания или снижение остроты зрения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Дети до 18 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата, глаукома, плохая проводимость желчных путей, заболевания печени, алкоголизм, эпилепсия, травмы и заболевания головного мозга, нарушенное мочеиспускание, особенно из-за гипертрофии предстательной железы.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Симптомы: сонливость, чувство подавленности, тошнота.

Лечение: проводят симптоматическую терапию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит не менее 64 % (V/V) этанола.

Не следует превышать рекомендуемые дозы. Превышение дозы может вызвать опьянение и снизить скорость психомоторных реакций.

Пациентам с признаками желудочно-пищеводного рефлюкса (изжоги) следует избегать применения препаратов содержащих листья мяты.

Назначение дополнительных седативных средств требует осторожности.

Применение в период беременности и кормления грудью

Не рекомендуется использовать препарат в период беременности и грудного вскармливания.

Влияние на способность к управлению автотранспортом и другими потенциально опасными механизмами

Применение препарата может нарушить способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Одновременное применение с амантадином, хинидином, трициклическими антидепрессантами, нейролептическими препаратами приводит к усилению антихолинергических эффектов.


Метоклопрамид уменьшает эффект алкалоидов белладонны в пищеварительном тракте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытом флаконе в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.





СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Без рецепта врача.

УПАКОВКА

Флакон-капельница из темного стекла с 25 мл или 50 мл препарата вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Валентис», шс. Молету 11, 08409 Вильнюс, Литва,
тел. +37052701225, факс +370 5 2701223

ВЛАДЕЛЕЦ ЛИЦЕНЗИИ

ЗАО «Валентис», шс. Молету 11, 08409 Вильнюс, Литва,
тел. +37052701225, факс +370 5 2701223

Kvalifikacija: sveikatos mokslų mokslininkas
Gydytojas (farmakologas)

