


НД РБ
65 67 - 2018



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

ФАРИНГОСЕПТ

Амбазон

**Леденцы прессованные
10 мг**

Прочтите внимательно этот листок-вкладыш, прежде чем начать применение препарата, так как он содержит важную для Вас информацию!

Всегда используйте данный препарат в точности, как указано в данном листке-вкладыше или как предписано врачом или фармацевтом.

- Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
- Если у Вас возникли любые побочные реакции, сообщите об этом врачу. Это также касается побочных реакций, не описанных в данном листке-вкладыше. (См. раздел 4).
- Необходимо сообщить врачу, если состояние не улучшилось или ухудшилось после 3-4 дней приема.

Информация, содержащаяся в данном листке-вкладыше:

1. В каких случаях применяют Фарингосепт леденцы.
2. Что необходимо знать перед началом применения препарата Фарингосепт.
3. Как применять Фарингосепт леденцы.
4. Возможные побочные реакции.
5. Как хранить Фарингосепт леденцы.
6. Состав препарата и другая информация.

1. В каких случаях применяют Фарингосепт леденцы.

Фарингосепт леденцы прессованные является местным антисептиком, который применяется у взрослых и детей в возрасте 14 лет и старше как лекарственное средство для вспомогательного лечения острых инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки: гингивиты, фарингиты, тонзиллиты.


Необходимо сообщить врачу, если состояние не улучшилось или ухудшилось после 3-4 дней приема.

2. Что необходимо знать перед началом применения препарата Фарингосепт.

Не используйте Фарингосепт, если у Вас имеется аллергия на амбазон или любой другой компонент препарата (см. раздел 6).

Меры предосторожности

Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом!



Взаимодействие с другими препаратами

Если Вы применяете, недавно применяли или планируете применять другие препараты, обязательно сообщите об этом врачу!

До настоящего времени не сообщалось о взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами.

Фарингосепт леденцы прессованные 10 мг и продукты питания

Фарингосепт применяют после еды (через 15-30 минут), после чего на протяжении 2-3 часов не следует принимать пищу и пить (см. раздел «Как принимать Фарингосепт леденцы»).

Применение в период беременности или кормления грудью

Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом!

Если Вы беременны или кормите ребенка грудью, а также предполагаете, что Вы беременны или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом.

Используйте Фарингосепт во время беременности или кормления грудью только в том случае, если врач рекомендовал Вам применять данный препарат.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.

Фарингосепт леденцы прессованные содержит сахарозу и лактозу

Если у Вас имеет место непереносимость углеводов, пожалуйста, посоветуйтесь с врачом перед началом приема препарата.

3. Как применять препарат Фарингосепт

Всегда используйте препарат в точности, как указано в данном листке-вкладыше или как предписано врачом или фармацевтом.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

Рекомендуемая доза препарата составляет 3-5 леденцов (30-50 мг амбазона) в сутки на протяжении 3-4 дней.

Фарингосепт леденцы не следует глотать – их следует медленно рассосать в полости рта. Препарат следует применять после еды (через 15-30 минут), после чего на протяжении 2-3 часов не следует принимать пищу и пить.

Не превышайте рекомендованную дозу. Если симптомы будут сохраняться, незамедлительно сообщите об этом врачу.

Способ применения и дозы для детей

Рекомендуемая доза для детей 14-18 лет - по одному леденцу 3 раза в сутки (30 мг амбазона) на протяжении 3-4 дней.

Из-за отсутствия достаточного количества информации о безопасности применения, Фарингосепт не рекомендован к применению у детей в возрасте до 14-ти лет.

6567 - 2018

Передозировка

Если Вы применили количество леденцов, превышающее рекомендованную дозу, незамедлительно обратитесь к врачу.

Сообщений о случаях передозировки препарата не поступало.

Специфического антидота не существует. Если Вы проглотили большое количество леденцов, немедленно обратитесь в ближайший пункт неотложной помощи; рекомендуется вызвать рвоту и/или промыть желудок.

Если Вы пропустили прием лекарства

Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Применяйте следующую таблетку в назначенное время.

Если Вы прекратили применять Фарингосепт

Если Вы прекратили лечение слишком рано, существует возможность возобновления симптомов.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

4. Возможные побочные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам Фарингосепт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Зарегистрированы следующие нежелательные реакции: отек лица, губ, рта, языка и глотки, затрудняющие глотание и дыхание, крапивница, зуд, покраснение лица и/или сыпь по всему телу; изменение цвета слюны.

В случае возникновения вышеуказанных реакций повышенной чувствительности прекратите прием препарата Фарингосепт и немедленно проконсультируйтесь с врачом – Вам может понадобиться срочная медицинская помощь.

Имеется единичное сообщение об окрашивании слюны у пациента, принимающего амбазон.

Сообщение о подозрении на побочные реакции

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получать больше сведений о безопасности препарата.

5. Как хранить Фарингосепт леденцы

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C для защиты от воздействия влаги.

Срок годности: 3 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Не выбрасывайте лекарство в водопровод. Спросите у фармацевта, как правильно утилизировать лекарства, которые Вы прекратили принимать. Эти меры будут способствовать сохранению окружающей среды.

6. Состав препарата и другая информация

Активная субстанция: амбазона моногидрат.

Каждый леденец содержит 10 мг амбазона моногидрата.

Вспомогательные вещества: сахароза, лактозы моногидрат, какао, повидон К 30, стеариновая кислота, ванилин.

Описание

Коричневые, непокрытые оболочкой, цилиндрической формы леденцы прессованные, с неповрежденными краями, плоские и с пигментированной поверхностью.

Упаковка

По 10 леденцов в блистере. Один или два блистера в картонной коробке. В коробку вкладывается листок-вкладыш и/или инструкция по применению.

Информация о производителе

SC Terapia SA

Str. Fabricii No. 124, Cluj Napoca,
Romania

КК Терапия АТ

ул. Фабриции , 124, Клуж Напока,
Румыния

Организация, принимающая претензии:

Представительство ООО «SUN Pharmaceutical Industries Ltd.», India
в Республике Беларусь

220113, г. Минск, ул. Мележа 1, оф.1118

тел.: +375 17 268-54-56