

**Инструкция по применению
лекарственного средства для потребителей
(аннотация-вкладыш)**

КАЛЬЦЕМИН СИЛЬВЕР (CALCEMIN® SILVER)

Торговое название
Кальцемин Сильвер

Лекарственная форма
Таблетки, покрытые оболочкой.

Описание

Овальные таблетки светло-серого цвета, с насечкой на одной из сторон, на изломе белого цвета.

Состав

Активные ингредиенты: кальций (кальция цитрат и кальция карбонат) 500 мг, витамин D₃ 400 МЕ, магний 40 мг, цинк 7,5 мг, меди 1 мг, марганец 1,8 мг, бор 250 мкг.
Неактивные ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза (E460), стеариновая кислота (E570), кроскармеллоза натрия, сои полисахарид, натрия лаурилсульфат, магния стеарат (E572).

Оболочка: гипромеллоза, силикат магния (E553а), титана диоксид (E171), триацетин (E1518), минеральное масло (E905), FD&C Синий №2 Лак (E132), FD&C Желтый №6 Лак (E110).

Фармакотерапевтическая группа:

Препараты кальция в комбинации с другими препаратами

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, содержащий витамины, макро-/микроэлементы, влияющий на фосфорно-кальциевый обмен.

Способствует профилактике и лечению остеопороза различного происхождения у лиц пожилого возраста. Увеличивает плотность костной ткани, уменьшает риск переломов при остеопорозе, применяется в комплексном лечении заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, восполняет дефицит кальция, витамина D₃ и минералов у людей старше 50 лет.

Показания к применению

Комплексное лечение остеопороза различного генеза: менопаузального, сенильного, идиопатического, стероидного и др.

Базисная терапия при применении антирезорбентов (заместительная гормональная терапия, кальцитонин, бисфосфонаты) и стимуляторов формирования костной ткани.

Уменьшение риска и комплексное лечение переломов различной локализации, восполнения дефицита кальция, витамина D₃ и минералов у людей старше 50 лет.


Способ применения и дозы

Внутрь. По 1 таблетке два раза в день во время еды.

Побочное действие

В очень редких случаях возможны аллергические реакции

Возможны проявления нарушений со стороны пищеварительного тракта (запор, вздутие живота, боль в животе, тошнота, диарея).



Продолжительный приём препарата в высоких дозах может привести к гиперкальциемии и гиперкальциурии, может наблюдаться гипервитаминоз витамина D.

Противопоказания

Не принимать при повышенной индивидуальной чувствительности к какому-либо из ингредиентов препарата, при гиперкальциемии или гиперкальциурии, при заболеваниях почек, мочекаменной болезни, болезнях парашитовидных желез, метастазах опухолей в костях, гипервитаминозе витамина D.

Дети до 12 лет.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Передозировка

Передозировка может сопровождаться усилением проявления побочных реакций. В этих случаях следует отменить препарат и обратиться к врачу. В особых случаях может быть показано промывание желудка и симптоматическое лечение.

Особые указания и меры предосторожности

Не превышать указанную дозировку. Не принимать одновременно с другими препаратами, содержащими кальций или витамин D.

Во время лечения рекомендуется проверять уровень кальция в сыворотке крови и в моче.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется применение препарата при одновременном лечении агонистами кальция. Фенитоин, барбитураты и глюкокортикоиды снижают эффективность витамина D. Левотироксин снижает всасывание ионов кальция.

Препарат может повышать абсорбцию тетрациклинов из ЖКТ и снижать абсорбцию бисфосфонатов или натрия фторида, поэтому интервал между приемом Кальцемина Сильвер и указанных лекарственных средств должен составлять не менее 3 и 2 часа соответственно.

Препараты кальция могут потенцировать токсические эффекты сердечных гликозидов. Тиазидные диуретики при одновременном применении с Кальцемин Сильвер повышают риск гиперкальциемии, а фуросемид повышает экскрецию кальция почками.

Нельзя использовать препарат совместно с блокаторами кальциевых каналов. Не рекомендуется использовать препарат одновременно с антацидами, содержащими алюминий, так как это может снизить эффективность этих препаратов.

Беременность и лактация

Не рекомендуется использовать препарат в период беременности и лактации. Возможно применение только после оценки соотношения риск-польза лечащим врачом.

Влияние на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами

Не влияет

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C, в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

30 или 60 таблеток во флаконе. Флакон вместе с листком-вкладышем помещены в коробку.

Условия отпуска

Без рецепта.

Название фирмы заявителя/производителя, адрес:

Байер Консьюмер Кэр АГ,
Петер Мериан-Штрассе 84, 4052 Базель, Швейцария

Контракт Фармакал Корпорейшн,
135 Адамс Авеню, Хопог, Нью-Йорк 11788, США

