

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

(листок-вкладыш)

ГЕКСИКОН® Д

- *Внимательно прочитайте весь листок-вкладыш перед тем, как начать использование этого лекарственного средства, так как он содержит важную для Вас информацию.*
- *Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.*
- *Если у Вас возникли дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.*

Торговое название препарата: Гексикон® Д

Международное непатентованное название: хлоргексидин

Лекарственная форма: суппозитории вагинальные

Состав:

Один суппозиторий содержит:

действующее вещество: хлоргексидина биглюконат - 8 мг;

основа для суппозиториев: макрогол-1500 - 1,4283 г, макрогол-400 - 0,0291 г – до получения суппозитория массой 1,50 г.

Описание: суппозитории белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность.


Фармакотерапевтическая группа: прочие противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.

Код АТХ: G01AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Гексикон® Д – антисептический препарат для местного применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Bacteroides fragilis*. К препарату слабоуязвимы некоторые штаммы *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы. Гексикон®



Д не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания к применению

Препарат Гексикон® Д, суппозитории вагинальные применяется в детской гинекологии у девочек с 2-х лет и до наступления менархе.

Лечение вульвовагинитов (в том числе неспецифических, смешанных, гонорейных, трихомонадных), бактериального вагиноза.

Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз), инфекционно-воспалительных осложнений в детской гинекологии (например, перед оперативным лечением гинекологических заболеваний).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, вводят его во влагалище в положении лежа на спине.

Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.




Для профилактики венерических заболеваний: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после полового акта.

Применение у пациентов с нарушением функции печени и почек


В связи с низкой системной абсорбцией изменения режима дозирования у пациентов с нарушением функции печени и почек не требуется.

Побочное действие

Крайне редко (менее чем в 0,1 % случаев) возможны аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.



В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.



Передозировка

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна. Случаи передозировки препарата неизвестны.

Меры предосторожности

Применение у детей

Препарат применяется в детской гинекологии у девочек с 2-х лет.

Суппозитории имеют уменьшенный размер, созданный специально для лечения девочек.

Лечение необходимо осуществлять под наблюдением врача.

Применение в период беременности и кормления грудью

Применение препарата при беременности и в период кормления грудью возможно только после тщательной оценки ожидаемой пользы для матери и риска для плода/ребенка.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами и занятие потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально.

Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозиториев вагинальных Гексикон® Д, т.к. препарат применяется внутривагинально.

Форма выпуска



Суппозитории вагинальные 8 мг. 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом. Две контурные упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

603950, г. Нижний Новгород

ГСП-459, ул. Салганская, 7

Тел.: (831) 278-80-88

Факс: (831) 430-72-28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>

