

ИНСТРУКЦИЯ
(информация для пациента)
по медицинскому применению препарата
ПАЛОРА® СИРОП 100 мл
(PALORA® SYRUP 100 ml)

Состав

5 мл сиропа содержат: экстракт пассифлоры жидкий 694,444 мг;
вспомогательные вещества: сахар кристаллический, глицерин, этиловый спирт, метилпарабен, пропилпарабен, вода очищенная.

Описание

Темно-коричневая прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: другие снотворные и седативные препараты *Код АТХ:* N05CM.

Фармакологические свойства

Активный ингредиент препарата Палора® сироп 100 мл - экстракт Пассифлоры жидкий обладает успокаивающим действием на центральную нервную систему; его получают из растения Пассифлора инкарнантная (страстоцвет мясокрасный). Растение содержит алкалоиды (гарминин, арибин), флаваноиды (витексин, ориентин). Экстракт также содержит апигенин, отвечающий за антиспастическую активность.

Эти субстанции обладают комплексным действием на центральную нервную систему, оказывают седативное, снотворное, анагетическое, антиспастическое действие.

Так как экстракт Пассифлоры не вызывает привыкания и побочных эффектов, то он безопасней транквилизаторов и барбитуратов.

Показания к применению

- неврастенические и депрессивные состояния, невроз;
- общее нервное возбуждение;
- стрессы, состояние тревоги, раздражительности;
- нарушения сна;
- климактерический и пременопаузальный период, нервозность в период менструации;
- вегетативные симптомы заболеваний нервной системы (нейроциркуляторная дистония, артериальная гипертензия, церебральные сосудистые кризы, повышенная потливость, ощущение сердцебиения);
- стресс-ассоциированные желудочно-кишечные симптомы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному ингредиенту



Копия верна	
Представительство АО «NOBEL PLAC» SARAYU VI, TIGAR ET ANONIM «KRETI» в Республике Беларусь	
Директор	Д.Г.Шен

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Не рекомендуется применение у детей младше 12 лет.

Период беременности и кормления грудью

Эффекты на возможность управления автомобилем и другими машинами

Побочные эффекты

При приеме очень высоких доз возможны спутанность сознания, угнетение центральной нервной системы, гипотензия, гипотермия, паралич.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и пищевыми продуктами

Следует избегать одновременного приема с дисульфирамом.


Взрослые и дети старше 12 лет:

При нарушениях сна рекомендуют принимать 10 мл (2 мерные ложки) сиропа перед сном.

Если симптомы проявляются во время приема препарата, то следует проконсультироваться с врачом.

О случаях передозировки не сообщалось.

Директор ДГШ:



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте.
Беречь от детей!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Срок годности

3 года, 6 месяцев после первого вскрытия.

Упаковка

Сироп 100 мл во флаконе оранжевого стекла в комплекте с мерной ложкой 5 мл в картонной пачке.

Другие лекарственные формы

Таблетки 100 мг покрытые пленочной оболочкой № 20 в блистерах из ПВХ/ТЕ/ПВДХ/алюминия.

Фирма-производитель, страна

Владелец лицензии: Нобел Илач Санайи Ве Тиждарет А.Ш.

Проспект Инкылап, ул. Акчакоджа, 10

34768 р-н Умрание, г. Стамбул, Турция.

Производитель: Нобелфарма Илач Санайи Ве Тиджарет А.Ш., Турция.

