


Листок-вкладыш – информация для пациента**Синекод (бутамират), 5 мг/мл, капли для приема внутрь**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз. Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Препарат предназначен именно вашему ребенку. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с симптомами вашего ребенка. Если у вашего ребенка возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Синекод, капли для приема внутрь, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Синекод, капли для приема внутрь.
3. Применение препарата Синекод, капли для приема внутрь.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Синекод, капли для приема внутрь.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ СИНЕКОД, КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Препарат Синекод капли содержит действующее вещество бутамирата цитрат, который принадлежит к группе противокашлевых препаратов.

Синекод облегчает сухой кашель, связанный с простудными заболеваниями.

Синекод, капли для приема внутрь, применяют для симптоматического лечения непродуктивного (сухого) кашля.

По назначению врача Синекод также можно применять для лечения острых приступов кашля различного генеза.

В связи с низким содержанием действующего вещества, капли не подходят для детей старше 12 лет.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 7 дней, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА СИНЕКОД, КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Не применяйте препарат Синекод, капли для приема внутрь:

- Если у Вашего ребенка аллергия на бутамирата цитрат (действующее вещество) или на одно из вспомогательных веществ (см. раздел 6).
- Если у вашего ребенка имеется непереносимость фруктозы – редкое врожденное заболевание, при котором человек не может расщеплять фруктозу. Препарат Синекод содержит сорбитол, подсластитель – заменитель сахара, который при пищеварении образует фруктозу.

8160 - 2016

Особые указания и меры предосторожности

Препарат можно применять детям в возрасте от 2-х месяцев до 2-х лет только по назначению врача.

Если в течение 7 дней не наблюдается улучшения или, если симптомы ухудшаются и/или сопровождаются лихорадкой, сыпью или постоянной головной болью, следует обратиться к врачу для дальнейшего выяснения основной причины симптомов.

Если у Вашего ребенка влажный (продуктивный) кашель, т.е. связан с большим количеством слизи, то перед использованием противокашлевого препарата Синекод Вам следует проконсультироваться с врачом.

Подавление кашлевого рефлекса с помощью противокашлевого препарата Синекод способствует задержке секрета в бронхах, что увеличивает риск респираторной инфекции (например, пневмонии) и, кроме того, может привести к опасному спазму бронхов (бронхоспазму). Поэтому следует воздерживаться от одновременного применения лекарственных препаратов, разжижающих бронхиальный секрет (отхаркивающих средств и муколитиков), и препарата Синекод, капли для приема внутрь.

Вспомогательные вещества

Сорбитол: противокашлевый препарат Синекод, капли для приема внутрь, содержит 71 мг сорбитола в каждом 5 каплях препарата (284 мг/мл). Сорбитол является источником фруктозы. Если у вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров и диагностирована наследственная непереносимость фруктозы, редкое генетическое заболевание, при котором человек не может расщеплять фруктозу, посоветуйтесь со своим врачом, прежде чем ваш ребенок начнет получать этот препарат. Сорбитол может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, а также может обладать легким слабительным эффектом.

Этанол: Этот лекарственный препарат содержит 14,25 мг алкоголя (этанола) в 5 мл, что эквивалентно 2,85 мг/мл. Количество этанола в одной дозе (25 капель) Синекода каплей эквивалентно 0,08 мл пива или 0,03 мл вина. Небольшое количество алкоголя в этом лекарственном препарате не будет иметь каких-либо заметных эффектов.

Натрий: Синекод, капли для приема внутрь, содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть практически не содержит натрия.

Дети

Препарат можно применять детям младше 2 лет только по назначению врача. Синекод, капли для приема внутрь, не предназначен для применения у детей младше 2-х месяцев и старше 12 лет.

Другие препараты и препарат Синекод, капли для приема внутрь

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Ваш ребенок получает, недавно получал или может начать получать какие-либо другие препараты, включая препараты, приобретенные Вами без рецепта.

Беременность и грудное вскармливание

Препарат Синекод капли от кашля предназначены для детей и не подходят для лечения кашля у взрослых. Если Вы беременны или кормите грудью, и Вы случайно принимаете этот лекарственный препарат, Вы должны сообщить своему врачу в качестве меры предосторожности.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

8160 - 2016

Синекод может вызвать сонливость, головокружение и другие нежелательные реакции (см. раздел 4 этого листка-вкладыша), которые могут повлиять на способность реагировать. Поэтому пока ваш ребенок принимает капли от кашля Синекод, ему следует избегать езды на велосипеде.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СИНЕКОД, КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Следует использовать самые низкие дозы и минимальную продолжительность приема, необходимую для достижения эффекта.

Синекод капли содержит в качестве подсластителей сахарин и сорбитол, поэтому может применяться у больных с сахарным диабетом.

Дети

Препарат можно применять детям младше 2 лет только по назначению врача.

Детям младшего возраста от 2 месяцев до 1 года – по 10 капель 4 раза в день; детям от 1 года до 3 лет – по 15 капель 4 раза в день; от 3 лет и старше – по 25 капель 4 раза в день.

Способ применения

Принимать внутрь перед едой.

Продолжительность применения

Не применяйте препарат более 7 дней подряд. При отсутствии улучшения состояния или ухудшении симптомов в течение 7 дней необходимо обратиться к врачу.

Придерживайтесь дозы, указанной в листке-вкладыше или предписанной врачом. Если считаете, что препарат слишком слабый или слишком сильный, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Если Вы приняли препарата Синекод капли больше, чем следовало

Если Ваш ребенок принял слишком большое количество противокашлевого препарата Синекод капли, немедленно сообщите об этом врачу. Передозировка препаратом Синекод капли может вызвать следующие симптомы: сонливость, тошнота и рвота, диарея, нарушение равновесия и низкое артериальное давление.

Если Вы забыли применить препарат Синекод капли

Дайте препарат ребенку, как только вспомните. Не давайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Соблюдайте дозу, указанную в листке-вкладыше или назначенную врачом.

Если у Вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарственного препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При приеме противокашлевого препарата Синекод, капли для приема внутрь, могут возникнуть следующие нежелательные реакции:

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

- *нечасто (могут возникать менее чем у 1 человека из 100) – головокружение, тошнота, диарея и сонливость;*
- *редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 1000) – крапивница, кожная сыпь.*

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вашего ребенка возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте <https://www.rceth.by>.

Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СИНЕКОД, КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на флаконе или картонной пачке после слов «Годен до». Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 30°C. Предохранять от воздействия высоких температур.

Не выбрасывайте (не выливайте) препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Синекод, капли для приема внутрь, содержит:

Действующим веществом является бутамирата цитрат.

1 мл препарата содержит 5 мг бутамирата цитрата.

1 мл препарата соответствует 22 каплям лекарственного препарата Синекод, капли для приема внутрь.

Вспомогательными веществами являются: сорбитол раствор 70% (м/м), глицерин, сахарин натрия, бензойная кислота (Е 210), ванилин, этанол 96% (об/об), натрия гидроксид 30% (м/м), вода очищенная.

Внешний вид препарата Синекод, капли для приема внутрь

Прозрачный раствор, от бесцветного до бледно коричневатого-желтого цвета.

По 20 мл во флаконе из темного стекла с капельницей дозатором и крышкой, снабженной системой контроля первого вскрытия. Флакон вместе с инструкцией по применению помещается в картонную коробку.

Срок годности

3 года.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Держатель регистрационного удостоверения

АО «Хелеон Рус», Российская Федерация. 123112, г. Москва, Пресненская Набережная 10.

Производитель

Хелеон КХ САРЛ, Швейцария / HALEON CH SARL, Switzerland. Рю де Летраз, 1260 Нион, Швейцария / Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.

При возникновении нежелательных явлений при приеме препарата, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: SafetyReportingEMEA@haleon.com. Сообщения о жалобах на качество препарата принимаются по электронной почте CIS.LOC-PQC@haleon.com

Данный листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте <https://www.rceth.by>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте <https://www.rceth.by>.

Торговые марки принадлежат или используются по лицензии группой компаний GSK.

©2024 группа компаний GSK или их лицензиар.

