**Листок-вкладыш - информация для пациента****Розукард® , 10 мг, таблетки, покрытые плёночной оболочкой****Розукард® , 20 мг, таблетки, покрытые плёночной оболочкой**

Действующее вещество: розувастатин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.


- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Розукард, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Розукард.
3. Применение препарата Розукард.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Розукард.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Розукард, и для чего его применяют.

Препарат Розукард содержит действующее вещество: розувастатин и принадлежит к группе препаратов, которые называются «статины» (снижают уровень холестерина).



Розукард был назначен Вам потому, что:

- у Вас высокий уровень холестерина в крови. В результате у Вас повышается риск сердечного приступа и/или инсульта. Розукард применяется у взрослых, подростков и детей в возрасте 6 лет и старше для лечения повышенного уровня холестерина;
- Ваш врач назначил Вам статины, потому что диета и повышенная физическая активность не смогли в достаточной степени снизить уровень холестерина. Во время лечения препаратом Розукард Вам следует продолжать соблюдать диету и заниматься физической активностью.

Или:

- у Вас имеются другие факторы, повышающие риск инфаркта, инсульта или связанных с ними осложнений со здоровьем.

Инфаркты, инсульты и другие подобные осложнения со здоровьем могут быть вызваны заболеванием, известным как атеросклероз. Атеросклероз вызывается отложением жировых частиц в кровеносных сосудах.

Почему важно принимать Розукард

Розукард применяется для снижения уровня жировых веществ в крови, называемых липидами, наиболее распространенным из которых является холестерин.

В крови обнаруживаются разные типы холестерина: «плохой» холестерин (липопротеины низкой плотности - ЛПНП) и «хороший» холестерин (липопротеины высокой плотности - ЛПВП). Препарат Розукард снижает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего» холестерина. Препарат помогает блокировать выработку «плохого» холестерина в организме, что улучшает способность Вашего организма удалять его из крови.

У большинства людей высокий уровень холестерина не влияет на самочувствие, поскольку не вызывает никаких симптомов. Однако, если не контролировать уровень холестерина, то возникает риск развития атеросклероза – заболевания, вызванного накоплением жировых отложений (атеросклеротические «бляшки») в кровеносных сосудах, вызывая их сужение.

Иногда суженные кровеносные сосуды могут закупориться, и это может привести к прекращению кровоснабжения сердца или головного мозга и возникновению



сердечного приступа, инфаркта миокарда или нарушению мозгового кровообращения (инсульт). Снижая уровень холестерина, Вы можете снизить риск возникновения сердечного приступа, инсульта или связанных с ними проблем со здоровьем.

Вам нужно продолжать принимать препарат Розукард, даже если уровень холестерина снизился до нужных значений, потому что препарат также предотвращает повторное повышение уровня холестерина и образование новых атеросклеротических «бляшек». Однако Вам следует прекратить прием, если Ваш врач скажет Вам это сделать, или если Вы забеременели.

2. О чём следует знать перед началом приёма препарата Розукард.

Противопоказания

Не принимайте препарат Розукард:

- если у Вас аллергия на розувастатин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны или если Вы кормите грудью; если Вы забеременели во время лечения препаратом Розукард, немедленно прекратите его прием и сообщите об этом своему врачу. Следует избегать беременности во время приёма препарата Розукард, используя подходящие средства контрацепции.
- если у Вас заболевания печени;
- если у Вас тяжёлые заболевания почек;
- если у Вас повторяющиеся или необъяснимые боли в мышцах, слабость мышц (миопатия);
- если Вы также принимаете софосбувир/велпатасвир/воксилапревир (используются для лечения вирусной инфекции печени, называемой гепатитом С);
- если Вы принимаете циклоспорин (например, после пересадки органов).

Если что-то из вышеперечисленного относится к Вам (или Вы сомневаетесь), пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

Кроме того, не принимайте препарат Розукард в дозе 40 мг:

- если у Вас заболевания почек умеренной степени тяжести (если Вы сомневаетесь, пожалуйста, спросите своего врача);
- если Ваша щитовидная железа не работает должным образом (гипотиреоз);

- если у Вас были повторяющиеся или необъяснимые боли в мышцах, имеется личная или семейная история проблем с мышцами или предыдущая история проблем с мышцами при приёме других препаратов, снижающих уровень холестерина (других статинов или фибратов);
- если Вы регулярно употребляете большое количество алкоголя;
- если Вы представитель монголоидной расы (если Вы японского, китайского, филиппинского, вьетнамского, корейского или индийского происхождения).
- если Вы принимаете другие препараты для снижения уровня холестерина (фибраты).

Если что-то из вышеперечисленного относится к Вам (или Вы сомневаетесь), пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Розукард проконсультируйтесь с лечащим врачом. Сообщите лечащему врачу, если у Вас имеются какие-либо заболевания или состояния, перечисленные ниже:

- Если у Вас проблемы с почками.
- Если у Вас проблемы с печенью.
- Если у Вас были повторяющиеся или необъяснимые боли в мышцах, личная или семейная история проблем с мышцами или предыдущая история проблем с мышцами при приёме других препаратов, снижающих уровень холестерина. Немедленно сообщите своему врачу или работнику аптеки, если у Вас появились необъяснимые боли в мышцах, постоянная мышечная слабость, плохое самочувствие или у Вас повысилась температура.
- Если у Вас когда-либо была сильная кожная сыпь или шелушение кожи, волдыри и/или язвы во рту после приема Розукарда или других лекарств.
- Если Вы регулярно употребляете большое количество алкоголя.
- Если Ваша щитовидная железа не работает должным образом (гипотиреоз).
- Если у Вас тяжелая дыхательная недостаточность.
- Если Вы принимаете другие препараты, называемые фибратами, для снижения уровня холестерина. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот листок-вкладыш, даже если Вы уже принимали другие препараты от повышенного холестерина.
- Если Вы принимаете препараты для лечения ВИЧ-инфекции, например, ритонавир с лопинавиром и/или атазанавиром. Дополнительную информацию

Вы можете посмотреть в разделе «Другие лекарственные препараты и препарат Розукард».

- Если Вы принимаете или принимали в течение последних 7 дней препараты под названием «фузидовая кислота» (антибактериальный препарат), внутрь или в виде инъекции. Комбинация фузидовой кислоты и препарата Розукард может привести к серьёзному поражению мышц, которое называется «рабдомиолиз» (см. раздел «Другие лекарственные препараты и препарат Розукард»).
- Если Вам больше 70 лет. Ваш врач подберёт для Вас правильную начальную дозу препарата Розукард.
- Если Вы представитель монголоидной расы (если Вы японского, китайского, филиппинского, вьетнамского, корейского или индийского происхождения). Ваш врач подберёт для Вас правильную начальную дозу препарата Розукард.

Если какой-либо из пунктов относится к Вам или если Вы сомневаетесь: **не принимайте Розукард в дозе 40 мг (высшая доза) и проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки перед приемом любой дозы Розукарда.**

Тяжелые кожные реакции

При приеме препарата Розукард необходимо соблюдать особую осторожность:

Сообщалось о серьезных нежелательных реакциях со стороны кожи при применении препарата Розукард, включая синдром Стивенса-Джонсона (SJS) и лекарственную реакцию с эозинофилией и системными симптомами (DRESS). Если Вы заметили любую из нежелательных реакций, перечисленных в разделе 4, прекратите прием препарата Розукард и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Влияние на печень

Статины могут влиять на печень у небольшого числа людей. Это можно оценить с помощью контрольных тестов, показывающих уровень печеночных ферментов в крови. По этой причине Ваш врач будет проводить контрольные исследования функции печени до и во время лечения препаратом Розукард.

Сахарный диабет

Если у Вас сахарный диабет или есть риск развития сахарного диабета, во время приёма препарата Розукард Ваш врач будет внимательно следить за Вами. Вы можете быть подвержены риску развития сахарного диабета, если у Вас высокий уровень сахара и жиров в крови, избыточный вес и высокое артериальное давление.

Дети и подростки

- Если пациент - ребенок младше 6 лет: Розукард не следует применять детям младше 6 лет.
- Если пациент младше 18 лет: Розукард в дозе 40 мг не подходит для детей и подростков младше 18 лет.

Другие лекарственные препараты и препарат Розукард

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Сообщите Вашему лечащему врачу перед началом приёма препарата Розукард, если Вы принимаете следующие препараты:

- Циклоспорин (препарат для подавления иммунной системы, используется, например, после трансплантации органов).
- Даролутамид (используется для лечения опухолей).
- Регорафениб (используется для лечения опухолей).
- Варфарин, клопидогрел или тикагрелор (или любой другой препарат для разжижения крови).
- Фибраты (например, гемфиброзил, фенофибрат) или любые другие препараты, снижающие уровень холестерина (например, эзетимиб).
- Антациды (препараты, снижающие кислотность желудочного сока).
- Эритромицин (антибактериальный препарат).
- Фузидовая кислота (антибактериальный препарат; см. ниже и в разделе «Особые указания и меры предосторожности»).
- Оральные контрацептивы (препараты для контрацепции для приёма внутрь).
- Заместительная гормональная терапия.
- Препараты для лечения вирусных инфекций, включая ВИЧ или гепатит С, отдельно или в комбинации (см. раздел «Особые указания и меры предосторожности»): ритонавир, лопинавир, атазанавир, софосбувир, воксилапревир, омбитасвир, паритапревир, дасабувир, велпатасвир, гразопревир, элбасвир, глекапревир, пибрентасвир.

Действие этих препаратов может измениться, если их принимать вместе с Розукардом, или эти препараты могут изменить действие Розукарда.

Если Вам необходимо принимать фузидовую кислоту для лечения бактериальной инфекции, Вам придётся временно прекратить приём препарата Розукард. Ваш врач скажет Вам, когда можно будет безопасно возобновить приём препарата Розукард.



Приём препарата Розукард с фузидовой кислотой в редких случаях может привести к поражению мышц, которое называется «рабдомиолиз» и сопровождается мышечной слабостью, необъяснимой болью. Более подробную информацию о рабдомиолизе смотрите в разделе «Возможные нежелательные реакции».

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом приёма препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не принимайте препарат Розукард. Если Вы забеременели во время приёма препарата, **немедленно** прекратите его приём и сообщите об этом своему врачу. Следует избегать беременности во время приёма препарата Розукард, используя подходящие средства контрацепции.

Грудное вскармливание

Сообщите врачу, если Вы кормите грудью ребенка или собираетесь кормить грудью. Не принимайте препарат Розукард.

При необходимости применения препарата Розукард в период кормления грудью, учитывая возможность развития нежелательных реакций у грудных детей, врач посоветует Вам прекратить грудное вскармливание.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Большинство людей могут управлять транспортными средствами или работать с механизмами во время приема препарата Розукард, но у некоторых пациентов при применении препарата Розукард возникает головокружение. Если после приёма препарата Розукард Вы чувствуете головокружение, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пытаться водить машину или работать с механизмами.

Препарат Розукард содержит лактозы моногидрат и натрий

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров (непереносимость лактозы, молочного сахара), сообщите об этом врачу, прежде чем принимать этот препарат.

Этот лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, т. е. практически не содержит натрия.

3. Применение препарата Розукард.

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача

или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза для взрослых

Если Вы принимаете Розукард для снижения уровня холестерина

Начальная доза

Лечение препаратом Розукард должно начинаться с дозы 5 мг или 10 мг, даже если до этого Вы принимали более высокую дозу другого статина. Дозу 5 мг получают, разрезая таблетку 10 мг пополам по линии разреза.

Выбор начальной дозы зависит от:

- Вашего уровня холестерина;
- уровня риска возникновения инфаркта или инсульта;
- имеются ли у Вас факторы, которые могут сделать Вас более чувствительным к возможным нежелательным реакциям.

Спросите своего врача или работника аптеки, какая доза лучше для Вас. Ваш врач может решить назначить Вам самую низкую дозу (5 мг), если:

- Вы представитель монголоидной расы (если Вы японского, китайского, филиппинского, вьетнамского, корейского или индийского происхождения);
- Вам больше 70 лет;
- у Вас умеренные проблемы с почками;
- Вы подвержены риску возникновения мышечных болей (миопатия).

Увеличение дозы и максимальная суточная доза

Только Ваш врач может решить увеличить Вашу дозу. Это делается для того, чтобы Вы принимали то количество препарата Розукард, которое подходит именно Вам. Если Ваш врач назначил приём с дозы 5 мг, он может решить увеличить дозу до 10 мг, затем 20 мг и, при необходимости, до 40 мг. Если Ваш врач назначил приём с дозы 10 мг, Ваш врач может решить увеличить дозу до 20 мг, а затем, при необходимости, до 40 мг. Между каждым изменением дозы должен быть перерыв в 4 недели.

Максимальная суточная доза препарата Розукард составляет 40 мг. Она предназначена только для пациентов с высоким уровнем холестерина и высоким риском возникновения инфаркта или инсульта, у которых уровень холестерина недостаточно снижается при приеме дозы 20 мг.

Если Вы принимаете Розукард для снижения риска сердечного приступа, инсульта и подобных осложнений

Рекомендуемая суточная доза составляет 20 мг. Тем не менее, Ваш врач может принять



решение о том, что Вы должны принять более низкую дозу.

Применение у детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет

Рекомендуемый диапазон доз для детей и подростков составляет от 5 мг до 20 мг. Врач может увеличить дозу для достижения оптимального эффекта. Максимальная суточная доза препарата Розукард для детей в возрасте от 6 до 17 лет составляет 10 мг или 20 мг, в зависимости от заболевания. Принимайте дозу один раз в день. Детям не следует принимать Розукард в дозе 40 мг.

Путь и способ применения таблеток

Проглатывайте таблетку целиком, запивая водой.

Принимайте Розукард один раз в сутки, в любое время независимо от времени приёма пищи. Постарайтесь принимать таблетки в одно и то же время, чтобы Вы могли лучше контролировать их прием.

Регулярные проверки уровня холестерина

Важно регулярно посещать врача для проверки уровня холестерина. Врач проверит, достигнут ли желаемый уровень холестерина и стабилен ли этот уровень.

При необходимости Ваш врач может увеличить дозу препарата Розукард, чтобы Вы принимали то количество препарата Розукард, которое Вам подходит.

Если Вы приняли препарата Розукард больше, чем следовало

Если Вы приняли слишком много таблеток, немедленно обратитесь ко врачу или в ближайшую больницу за медицинской помощью. Если Вы попали в больницу для госпитализации или проходите лечение по поводу любого другого заболевания, сообщите своему врачу, что Вы принимаете препарат Розукард.

Если Вы забыли принять препарат Розукард

Если Вы забыли принять таблетку вовремя, примите следующую дозу в нужное время. Не принимайте двойную дозу, если Вы забыли принять препарат.


Если Вы прекратили приём препарата Розукард

Сообщите своему врачу, если Вы хотите прекратить прием Розукарда. Если Вы прекратите применение препарата Розукард, это может привести к увеличению уровня холестерина в крови.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции.

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать



нежелательные реакции, однако они развиваются не у всех. Тем не менее, важно, чтобы Вы знали, какие это могут быть нежелательные реакции. Обычно они слабо выражены и исчезают в течение короткого периода времени.

Немедленно прекратите прием Розукарда и обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникнут какие-либо из следующих нежелательных реакций после приёма этого препарата:

- Затрудненное дыхание, иногда сопровождающееся отеком лица, губ, языка и/или горла, затрудненное глотание.
- Отек лица, губ, языка и/или горла.
- Сильный зуд кожи (с выступающими образованиями).
- Красноватые, незритемные, мишеневидные или круглые пятна на туловище, часто с волдырями в центре, шелушащаяся кожа, язвы во рту, горле, носу, гениталиях и глазах. Этим тяжелым кожным высыпаниям могут предшествовать лихорадка и гриппоподобные симптомы (синдром Стивенса-Джонсона).
- Обширная кожная сыпь, высокая температура тела и увеличенные лимфатические узлы (DRESS или синдром гиперчувствительности к лекарственным препаратам).

Кроме того, прекратите принимать Розукард и сразу же сообщите об этом своему врачу:

- если Вы испытываете необычные мышечные судороги и боли в мышцах, которые длятся необычно долго. Мышечные симптомы чаще встречаются у детей и подростков, чем у взрослых. Как и в случае с другими статинами, небольшое количество людей может испытывать неприятные мышечные симптомы, которые в редких случаях могут ухудшиться и привести к потенциально опасному для жизни повреждению мышц - *рабдомиолизу* (редкая нежелательная реакция).
- если у Вас развивается волчаночноподобный синдром (включая сыпь, заболевания суставов и изменения в анализах крови).
- если у Вас произошел разрыв мышцы.


Другие возможные нежелательные реакции, связанные с применением препарата

Розукард

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- Головная боль.

- Боль в животе.
- Запор.
- Тошнота.
- Боль в мышцах (миалгия).
- Повышенная утомляемость (астения).
- Головокружение.
- Повышение уровня белка в моче – обычно нормализация происходит без необходимости отмены препарата Розукард (только Розукард 40 мг).
- Сахарный диабет. Это более вероятно, если у Вас повышенный уровень сахара или липидов в крови, избыточный вес или высокое кровяное давление. Ваш врач будет наблюдать за Вами во время лечения.



Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- Кожная сыпь, кожный зуд и другие кожные реакции.
- Повышение уровня белка в моче - обычно нормализация происходит без необходимости отмены препарата Розукард (только для доз 10 мг и 20 мг).

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):


- Тяжелая аллергическая реакция - симптомы включают отек лица, губ, языка и/или горла, дискомфорт при глотании и дыхании, сильный зуд кожи (с выступающими образованиями). Если у Вас возникла такая реакция, немедленно прекратите прием препарата Розукард и обратитесь за медицинской помощью.
- Поражение мышц у взрослых (миопатия и миозит): если у Вас возникла такая реакция, немедленно прекратите прием препарата Розукард и сообщите своему врачу, если заметите необычную боль или мышечные спазмы, которые длятся дольше, чем ожидалось.
- Рабдомиолиз.
- Сильная боль в животе (панкреатит).
- Увеличение печёночных ферментов в анализе крови.
- Кровотечение или кровоподтеки чаще, чем обычно, из-за снижения количества тромбоцитов (тромбоцитопения).
- Волчаночноподобный синдром (включает сыпь, заболевания суставов и изменения в анализах крови).

Очень редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

- Желтуха (пожелтение кожи и глаз).
- Воспаление печени (гепатит).
- Боль в суставах.
- Следы крови в моче (гематурия).
- Поражение нервов рук и ног (полинейропатия).
- Потеря памяти.
- Увеличение молочных желёз у мужчин (гинекомастия).

Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- Депрессия.
- Периферическая нейропатия
- Постоянная мышечная слабость.
- Травмы сухожилий.
- Нарушения сна, включая бессонницу и ночные кошмары.
- Диарея.
- Кашель.
- Одышка
- Отёки (припухлость).
- Половая дисфункция.
- Синдром Стивенса-Джонсона (образование волдырей на коже, во рту, глазах и половых органах).
- Проблемы с дыханием, включая постоянный кашель и/или одышку или лихорадку.
- Лекарственная реакция с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS)
- Интерстициальное заболевание легких



Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Розукард.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Не выбрасывайте какие-либо лекарственные препараты в сточные воды или бытовые отходы. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.


6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Препарат Розукард содержит

Действующим веществом является розувастатин.

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 10 мг (для Розукарда 10 мг) или 20 мг (для Розукарда 20 мг) розувастатина (в виде розувастатина кальция).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: ядро (лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат); пленочная оболочка (гипромеллоза 2910/5, макрогол 6000, титана диоксид (Е 171), тальк, железа оксид красный (Е 172)).



Внешний вид препарата Розукард и содержимое упаковки

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг:

Светло-розовые, продолговатые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с делительной риской.

ОРА/А1/PVC/А1 блистерная упаковка.

При производстве *ЗЕНТИВА к.с., Чешская Республика:*

По 10 таблеток в блистерной упаковке. По 3 блистера помещены в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

При производстве *Санофи Илач Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, Турция:*

По 15 таблеток в блистерной упаковке. По 2 блистера помещены в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг:

Розовые, продолговатые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
OPA/A1/PVC/A1 блистерная упаковка.

При производстве **ЗЕНТИВА к.с., Чешская Республика:**

По 10 таблеток в блистерной упаковке. По 3 блистера помещены в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

При производстве **Санофи Илач Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, Турция:**

По 15 таблеток в блистерной упаковке. По 2 блистера помещены в картонную пачку вместе с листком-вкладышем.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация.

АО «Санофи Россия».

125009, г. Москва, ул. Тверская, 22.

тел.: +7 (495) 721-14-00.

Производитель

ЗЕНТИВА к.с., Чешская Республика

У кабеловны 130, 102 37

Прага 10, Долни Мехолупы

ИЛИ

Санофи Илач Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, Турция

Микрорайон Кючюккарыштыран, улица Меркез, № 223/А, 39780 Бюйюккарыштыран
Люлебургаз, Кыркларэли

**Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя
регистрационного удостоверения:**

в Республике Беларусь:

ООО «Свикс Биофарма»

Минск, ул. Димитрова 5, офис 5/40, 220004, Республика Беларусь,

belarus.info@swixxbiopharma.com

тел.: +375 (17) 329-0770



НД РБ

8250 - 2016

в Республике Узбекистан:

ООО «SWIXX BIOPHARMA»

Ташкент, ул. Ойбек 24, Офисный Блок 3Д, 100015, Республика Узбекистан

uzbekistan.info@swixxbiopharma.com

тел.: +998 78 150-04-80

Данный листок-вкладыш пересмотрен

