


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
лекарственного средства  
**НАТУРКОКСИНУМ®**  
Гранулы гомеопатические



**Торговое название:** Натуркоксинум

**Лекарственная форма:** гранулы гомеопатические

**Состав:**

1 доза, равная 1,0 г гранул гомеопатических, содержит:

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum (Экстракт печени и сердца барбарийской утки)  
200К - 0,01 мл.

Вспомогательные вещества: гранулы нейтральные (сахароза 750 мг и лактоза 250 мг).

**Описание:** гранулы сферической формы от белого до почти белого цвета, практически без запаха.

**Фармакотерапевтическая группа:** Прочие лекарственные средства. Гомеопатическое лекарственное средство, код АТС: V03АХ.

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Терапевтические показания данной группы лекарственных средств базируются на традиционном гомеопатическом применении составляющих компонентов.

**Фармакокинетика**

Не применимо для гомеопатических лекарственных средств.

**Область применения.**

Гомеопатическое лекарственное средство без утвержденных терапевтических показаний. Применяется при гриппоподобных заболеваниях.

**Способ применения и дозировка.**

Внутрь. Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.

Положить под язык содержимое тубы (1 доза) и держать до полного растворения.

Натуркоксинум можно применять детям в возрасте от 2 лет. Детям в возрасте от 2 до 6 лет применение возможно только по назначению врача; перед приемом гранулы рекомендуется растворить в небольшом количестве воде и давать из ложечки.

Принимать препарат за 15 минут до или через 1 час после приема пищи.

Для профилактики в период распространения гриппоподобных заболеваний, до появления симптомов заболевания, принимать по 1 дозе 1 раз в неделю.

При появлении первых симптомов принять 1 дозу, затем повторить прием препарата 2-3 раза с интервалом в 8 часов.

При выраженных симптомах заболевания по 1 дозе 2 раза в день (утром и вечером) в течение 1-3 дней.

**Применение в период беременности или кормления грудью**

В отсутствие экспериментальных и клинических данных, и в качестве меры безопасности, не рекомендуется использовать это лекарственное средство во время беременности и лактации.

**Противопоказания.**

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**Побочное действие.**

Возможны аллергические реакции. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Замечание: Состояние здоровья может временно ухудшиться, когда принимаются гомеопатические средства (первичная гомеопатическая реакция). В таких случаях следует обратиться к врачу и прекратить лечение на некоторое время.

**Передозировка.**

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

**Меры предосторожности.**

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение и традиционными лекарственными средствами.

При сохранении выраженных симптомов заболевания (температура, озноб) в течение 24 часов с момента начала лечения необходимо обратиться к врачу.

Даже гомеопатический препарат не следует принимать в течение продолжительного периода времени без консультации врача.

Чем раньше начато лечение, тем быстрее и эффективнее проявляется действие препарата.

Информация для больных сахарным диабетом: 1 доза препарата содержит 0,1 хлебной единицы.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами. Внимание: действие любого гомеопатического средства может быть нарушено приемом возбуждающих средств (алкоголь, никотин, кофеин).

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.**

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

**Упаковка.**

Первичная упаковка: по 1,0 г в тубе с пробкой из белого полиэтилена. По 3 тубы в пластиковом контейнере. По 1, 2, 3 или 4 пластиковых контейнера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения.**

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.**

Без рецепта врача.

**Производитель.**

ГОМЕОКАН ИНК., 3025, Бульвар де л'Ассомпсьон, Монреаль, Квебек, H1N 2H2 Канада.