

Листок-вкладыш - информация для пациента

АБИЗОЛ, 10 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

АБИЗОЛ, 15 мг, таблетки, диспергируемые в полости рта

Действующее вещество: арипипразол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Абизол и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Абизол.
3. Применение препарата Абизол.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Абизол.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Абизол и для чего его применяют

Препарат Абизол содержит действующее вещество арипипразол, которое относится к группе антипсихотических средств.

Препарат применяется для лечения взрослых и подростков в возрасте 15 лет и старше, страдающих заболеванием, которое характеризуется подозрительностью, способностью слышать, видеть или чувствовать несуществующие вещи, ошибочными убеждениями, бессвязной речью и поведением, а также обедненностью эмоциональной сферы. Люди с данным состоянием могут ощущать подавленность, вину, тревогу или напряжение.

Абизол также используется для лечения взрослых пациентов и подростков в возрасте 13 лет и старше, состояние которых характеризуется чрезмерной приподнятыостью, энергичностью, сниженной, по сравнению с обычной, потребностью во сне, очень быстрой речью со стремительными идеями, иногда выраженной раздражительностью. Абизол также предотвращает возникновение рецидивов данного состояния у взрослых пациентов, которые реагировали на лечение лекарственным препаратом Абизол.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Абизол

Не принимайте препарат Абизол

Если у Вас аллергия на арипипразол (действующее вещество) или любое из вспомогательных веществ, приведенных в разделе 6 листка-вкладыша.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Абизол проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или работником аптеки.

Во время лечения арипипразолом сообщалось о возникновении мыслей или поведений, направленных на самоубийство. Если у Вас появляются мысли о том, чтобы причинить себе вред, сразу же сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Перед началом лечения препаратом Абизол сообщите лечащему врачу:

- если у Вас повышено содержание сахара в крови (с такими характерными симптомами, как повышенная жажда, выделение больших количеств мочи, повышение аппетита и чувство слабости) или если Ваши кровные родственники болеют сахарным диабетом;
- если у Вас бывают судороги (возможно, Ваш лечащий врач будет более тщательно наблюдать за Вашим состоянием);
- если у Вас бывают непроизвольные периодические мышечные сокращения, особенно лицевых мышц;
- если у Вас или Ваших кровных родственников есть сердечно-сосудистые заболевания или были такие состояния, как инсульт, микроинсульт, изменение артериального давления
- если у Вас или Ваших кровных родственников возникали кровяные сгустки внутри сосудов (тромбы), поскольку прием антипсихотических средств связан с образованием тромбов;
- если у Вас была нездоровая склонность к азартным играм в прошлом.

В случае если Вы являетесь пожилым пациентом, страдающим деменцией (потерей памяти и других умственных способностей), и перенесли инсульт или микроинсульт, Вы или Ваш опекун/родственник должны сообщить об этом врачу.

Если Вы заметили, что стали набирать вес, или у Вас появились необычные движения, сонливость, мешающая нормальной дневной активности, ощущаете любые трудности при глотании или симптомы аллергии, сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Немедленно сообщите врачу, если Вы почувствуете мышечную скованность или чрезмерное напряжение мышц (риgidность), которое сопровождается высокой температурой, потоотделением, изменением психического состояния либо очень быстрым или нерегулярным сердцебиением.

Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы или члены Вашей семьи или ухаживающие за Вами люди заметили, что у Вас возникают непреодолимые порывы к необычному поведению или Вы не способны сопротивляться импульсу, мотиву или искушению совершать действия, которые могут нанести вред Вам или окружающим. Эти состояния называются нарушением контроля импульса, к ним относятся ненормальная склонность к азартным играм, компульсивное переедание, компульсивные покупки/траты денег, ненормально повышенное сексуальное влечение или навязчивые идеи с преобладанием мыслей и чувств сексуальной направленности.

Ваш лечащий врач может принять решение уменьшить дозу препарата или отменить лечение.

Арипипразол может вызвать сонливость, падение артериального давления при вставании, головокружение, изменение способности передвигаться и нарушение равновесия, что может привести к падениям. Вы должны быть осторожны, особенно если Вы пожилой или ослабленный человек.

Дети

Абизол не предназначен для приема детям в возрасте младше 13 лет, так как отсутствуют данные об эффективности и безопасности этого лекарственного препарата в данной возрастной группе.

Другие препараты и препарат Абизол

Сообщите Вашему врачу или работнику аптеки, если Вы в **настоящее время** принимаете, недавно принимали или планируете принимать какие-либо другие препараты, поскольку они могут изменять эффекты друг друга.

Лекарственные препараты, понижающие кровяное давление: Абизол может усиливать действие лекарств, снижающих кровяное давление. Если Вы принимаете лекарственный препарат для понижения кровяного давления, обязательно сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

Одновременный прием таблеток Абизол с другими препаратами может потребовать изменения дозировки лекарственного препарата Абизол. Особенно важно сообщить Вашему лечащему врачу о приеме следующих лекарств:

- лекарственных препаратов для коррекции сердечного ритма (таких как хинидин, амиодарон, флеканид);
- антидепрессантов или растительных лекарственных препаратов, используемых для лечения депрессии и тревоги (таких как флуоксетин, пароксетин, венлафаксин, зверобой продырявленный);
- противогрибковых лекарственных препаратов (кетоконазол, итраконазол);
- определенных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции (таких как эфавиренз, невирапин, ингибиторы протеазы, например, индинавир, ритонавир);
- противосудорожных лекарственных препаратов для лечения эпилепсии (таких как карbamазепин, фенитоин, фенобарбитал);
- некоторых антибиотиков для лечения туберкулеза (рифабутин, рифампицин).

Эти лекарственные препараты могут повысить риск развития нежелательных реакций или понизить эффект арипипразола. Если в период лечения этими препаратами совместно с арипипразолом у Вас возникают какие-либо непривычные симптомы, Вам следует обратиться к Вашему лечащему врачу.

Лекарственные препараты, повышающие уровень серотонина, которые обычно применяются для лечения таких состояний как депрессии, генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), социальные фобии, а также мигрени и боли:

- триптаны, трамадол, триптофан, которые применяются для лечения депрессии, генерализованного тревожного расстройства, ОКР, социальных фобий, а также мигрени и боли;
- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (например, пароксетин, флуоксетин), которые применяются для лечения депрессии, ОКР, панических и тревожных расстройств;
- другие антидепрессанты (например, венлафаксин), которые применяются для лечения депрессии;
- трициклические антидепрессанты (такие как кломипрамин, амитриптилин), которые применяются для лечения депрессии;
- зверобой продырявленный (*Hypericum perforatum*), который применяется для лечения депрессии легкой степени выраженности;
- препараты для лечения боли (петидин).

Эти препараты повышают риск развития нежелательных реакций.

Обратитесь к Вашему лечащему врачу, если у Вас возникнет какой-либо необычный симптом при одновременном применении этих лекарственных препаратов с Абизол таблетками, диспергируемыми в полости рта.

Препарат Абизол с пищей, напитками и алкоголем

Препарат Абизол можно принимать независимо от приема пищи.

При приеме препарата Абизол следует избегать употребления алкоголя.

Беременность, грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

У новорожденных, матери которых принимали препарат Абизол в последнем триместре (в последние три месяца), могут развиться следующие симптомы: дрожь, мышечная скованность и/или слабость, сонливость, возбуждение, трудности при дыхании и при кормлении. Если у Вашего ребенка наблюдается любой из этих симптомов, Вам следует обратиться к врачу.

Грудное вскармливание

Если Вы принимаете Абизол, Вам следует обсудить с врачом, следует ли Вам продолжать принимать этот препарат и отказаться от грудного вскармливания, учитывая пользу лечения для Вас, либо продолжить грудное вскармливание, учитывая его пользу для ребенка.

Обсудите с Вашим лечащим врачом наиболее подходящий метод кормления ребенка, если Вы продолжаете лечение препаратом Абизол.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Во время лечения данным препаратом может возникнуть головокружение и нарушения зрения (см. раздел 4). Это следует учитывать в случаях работы, требующей исключительной концентрации внимания, например, при управлении автотранспортом и работе с механизмами.

Препарат Абизол содержит аспартам

Препарат Абизол содержит аспартам, который является источником фенилаланина. Это может быть вредно для людей с фенилкетонурией – редким генетическим заболеванием, при котором фенилаланин накапливается, поскольку организм не может его должным образом удалить.

3. Прием препарата Абизол

Всегда принимайте препарат Абизол в полном соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача или работника аптеки.

Режим дозирования

Взрослые

Рекомендуемая доза для взрослых составляет 15 мг один раз в сутки. Тем не менее, Ваш врач может назначить более низкую или более высокую дозу, при этом максимальная доза составляет 30 мг один раз в сутки.

Дети и подростки

Для подростков в возрасте от 13 лет и старше прием препарата Абизол можно начать с низких доз.

Дозу можно постепенно повышать до достижения обычно рекомендуемой для подросткового возраста дозы, составляющей 10 мг один раз в сутки. Тем не менее, врач может назначить Вам более низкую или более высокую дозу, при этом максимальная доза составляет 30 мг один раз в сутки.

Продолжительность лечения должна быть минимальной и определяется лечащим врачом.

Если у вас появится ощущение, что действие препарата является слишком сильным или слишком слабым, сообщите об этом врачу.

Способ применения

Попытайтесь принимать препарат Абизол в одно и то же время каждый день.

Не имеет значения, принимаете Вы таблетки до или после еды.

Таблетку следует поместить в рот на язык, где она быстро диспергируется (растворится) в слюне. Таблетку можно запивать жидкостью или не запивать. Удаление неповрежденной таблетки для рассасывания из полости рта затруднено. Так как таблетка, диспергируемая в полости рта, является хрупкой, ее следует принять немедленно после извлечения из блистера.

Также таблетку можно диспергировать в воде и выпить полученную супензию.

Если Вы забыли вовремя принять препарат Абизол

Если Вы пропустили дозу, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом, но не принимайте двойную дозу в один день, чтобы компенсировать пропущенный прием.

Если Вы приняли препарата Абизол больше, чем следовало

В случае если Вы приняли больше Абизол таблеток, диспергируемых в полости рта, чем рекомендовал врач (или если кто-то другой принял Ваши Абизол таблетки, диспергируемые в полости рта), сразу же сообщите об этом врачу. Если Вы не можете связаться со своим лечащим врачом, обратитесь в ближайшую больницу и возьмите упаковку с собой.

У пациентов, принявших слишком высокую дозу арипипразола, могут развиться следующие симптомы:

- повышение частоты сердечного ритма, возбуждение/агрессивное поведение, нарушение речи;
 - необычные движения (особенно лица и языка).
- Также могут возникнуть такие симптомы как:
- острое появление спутанности сознания, судороги (эпилепсия), кома, комбинация таких симптомов как лихорадка, учащенное дыхание, потливость;
 - ригидность мышц, сонливость, замедление дыхания, удушье, высокое или низкое артериальное давление, ненормальный ритм сердечных сокращений.

Если Вы прекратили принимать препарат Абизол

Даже если Вы почувствуете себя лучше, не прекращайте прием препарата Абизол и не меняйте суточную дозировку без предварительной консультации с врачом.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по применению данного лекарственного препарата, обратитесь к Вашему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Абизол может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.

Нежелательные реакции приведены в соответствии с уменьшающейся частотой их развития:

Частые (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- сахарный диабет;
- бессонница;
- ощущение беспокойства, тревоги;
- ощущение внутреннего двигательного беспокойства, неспособность спокойно сидеть на месте или долго оставаться без движения (акатизия);

- неконтролируемые мышечные сокращения или подергивания, синдром «беспокойных ног»;
- дрожание;
- головная боль;
- усталость;
- сонливость;
- предобмороочное состояние;
- затуманенное и «прыгающее» зрение;
- запор;
- нарушение пищеварения (диспепсия);
- тошнота, рвота;
- повышенное образование слюны;
- усталость.

Нечастые (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- повышение уровня гормона пролактина в крови;
- повышение уровня сахара в крови;
- депрессия;
- повышение или изменение сексуального влечения;
- неконтролируемые движения рта, языка или конечностей (поздняя дискинезия),
- спазматическое сокращение мышц (дистония);
- синдром беспокойных ног;
- двоение в глазах;
- повышенная чувствительность глаз к свету;
- учащение сердечных сокращений;
- понижение артериального давления при вставании, которое может вызвать головокружение, предобмороочное состояние или обморок;
- икота.

С момента выхода на рынок перорального арипипразола отмечались следующие нежелательные реакции, частота которых не может быть установлена на основании имеющихся данных:

- уменьшение количества белых клеток крови (лейкоцитов);
- уменьшение количества кровяных пластинок (тромбоцитов);
- аллергические реакции (отек рта, языка, лица и горла, зуд, сыпь, крапивница);
- ухудшение или возникновение сахарного диабета (появление кетонных тел в крови и моче) или кома;
- высокий уровень сахара в крови;
- понижение уровня натрия в крови;
- потеря аппетита (анорексия);
- уменьшение массы тела;
- увеличение массы тела;
- суицидальные мысли, суицидальные попытки или суицид;
- чувство агрессии;
- ажитация (сильное эмоциональное возбуждение);
- нервозность;
- судороги;
- злокачественный нейролептический синдром (комбинация лихорадки, ригидности мышц, учащенного дыхания, потоотделения, помутнения сознания, внезапных изменений артериального давления и частоты сердечных сокращений, обморок);

- серотониновый синдром (реакция, которая может вызывать чувство исключительного счастья, сонливость, неуклюжесть, беспокойство, ощущение алкогольного опьянения, лихорадку, потливость и мышечную скованность);
- нарушения речи;
- непроизвольная фиксация глаз в одном направлении;
- внезапная необъяснимая смерть;
- угрожающее жизни нарушение сердечного ритма;
- остановка сердца;
- острое сердечно-сосудистое заболевание;
- уменьшение частоты сердечных сокращений (брадикардия);
- образование тромбов в венах, особенно в нижних конечностях (симптомы включают отек, боль и покраснение ног), которые могут перемещаться по кровеносным сосудам в легкие, вызывая боль в груди и затруднение дыхания (если Вы заметили какой-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу);
- высокое артериальное давление;
- обморок;
- случайное попадание пищи в трахею с риском развития пневмонии;
- спазм мышц горлани;
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
- трудности при глотании;
- диарея;
- ощущение дискомфорта в животе или в желудке;
- печеночная недостаточность;
- воспаление печени (гепатит);
- пожелтение кожи и склер глаз;
- сообщения о патологических показателях печеночных проб;
- кожная сыпь;
- светочувствительность;
- выпадение волос;
- чрезмерное потоотделение;
- тяжелая аллергическая реакция – медикаментозная реакция с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS). Эта реакция сначала проявляется как гриппоподобные симптомы и сыпь на лице; затем сыпь становится распространенной, появляется лихорадка, увеличиваются лимфоузлы, результаты анализа крови указывают на повышение активности печеночных ферментов и повышение количества определенных белых клеток крови (эозинофилия);
- ненормальный распад мышечной ткани, который может привести к нарушению функции почек (рабдомиолиз);
- мышечная боль;
- скованность;
- непроизвольное мочеиспускание;
- задержка мочи;
- симптомы отмены у новорожденных, матери которых принимали препарат Абизол во время беременности;
- длительная и/или болезненная эрекция;
- нарушение контроля температуры тела или перегрев;
- боль в груди;
- отек кистей рук, голеностопных суставов или стоп;

- неспособность сопротивляться импульсу, мотиву или искушению совершать действия, которые могут нанести вред Вам или окружающим. К таким состояниям относятся:
 - непреодолимый импульс к азартным играм, несмотря на серьезные последствия для Вас или Вашей семьи;
 - ненормально повышенное сексуальное влечение или поведение с преобладанием мыслей и чувств сексуальной направленности;
 - неконтролируемые излишние покупки;
 - переедание (очень быстрое потребление очень большого количества пищи) или компульсивное переедание (потребление большего количества пищи, чем необходимо для нормального утоления голода);
 - склонность уйти, заблудиться.

Сообщите Вашему лечащему врачу, если у Вас наблюдается такое поведение; врач посоветует, что следует сделать, чтобы контролировать или уменьшить такие симптомы.

Случаи со смертельным исходом при приеме арипипразола чаще отмечались у пожилых пациентов с деменцией. Кроме того, сообщалось о случаях возникновения инсульта или микроинсульта.

Дополнительные нежелательные реакции у детей и подростков

Подростки в возрасте 13 лет и старше испытывали нежелательные реакции, сходные по частоте и типу с нежелательными реакциями взрослых. Однако, сонливость, неконтролируемые мышечные сокращения или подергивания, а также беспокойство и усталость отмечались очень часто (чаще чем 1 случай на 10 пациентов), а боль в верхней части живота, сухость во рту, учащенное сердцебиение, увеличение массы тела, повышенный аппетит, ненормальные сокращения мышц, неконтролируемые движения конечностей и ощущение головокружения, особенно при вставании из положения лежа или сидя, наблюдались часто (не более чем у 1 человека из 10).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь
220045, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 83, корпус 15, 8 этаж

Телефон (Фармаконадзор): +375-17-242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

010000, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. А.Иманова, 13 (БЦ «Нурсаulet 2»)

Тел.: +7 (7172) 78-99-11
Эл. почта: farm@dari.kz
<https://www.ndda.kz/>

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Министерства
Здравоохранения Кыргызской Республики
720044, г. Бишкек, ул. З-я линия, 25
Тел.: 996 (312) 21-92-78, факс: 996 (312) 21-05-08,
Эл. почта: dlsmi@pharm.kg
<https://www.pharm.kg/>

5. Хранение препарата Абизол

Хранить при температуре не выше 25°C в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 3 года.
Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.
Датой истечения срока годности является последний день месяца, указанного на
упаковке.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1 таблетка, диспергируемая в полости рта, содержит:

действующее вещество: 10 мг или 15 мг арипипразола;
вспомогательные вещества:

таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг:

кальция силикат, маннитол, маннитол DC, пласдон XL 10, кросповидон CL, кремния диоксид коллоидный, аспартам (E951), ацесульфам калия (E950), винная кислота, железа оксид красный (E172), магния стеарат, вишневый аромат (натуральный вишневый ароматизатор, мальтодекстрин, гуммиарабик (E414), кремния диоксид (E551)), целлюлоза микрокристаллическая.

таблетки, диспергируемые в полости рта, 15 мг:

кальция силикат, маннитол, маннитол DC, пласдон XL 10, кросповидон CL, кремния диоксид коллоидный, аспартам (E951), ацесульфам калия (E950), винная кислота, железа оксид желтый (E172), магния стеарат, вишневый аромат (натуральный вишневый ароматизатор, мальтодекстрин, гуммиарабик (E414), кремния диоксид (E551)), целлюлоза микрокристаллическая.

Внешний вид лекарственного препарата и содержимое упаковки

Таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг: таблетки розового цвета плоскоцилиндрической формы с фаской с гравировкой «10» на одной стороне. Допускается наличие вкраплений.

Таблетки, диспергируемые в полости рта, 15 мг: таблетки светло-желтого цвета плоскоцилиндрической формы с фаской с гравировкой «15» на одной стороне. Допускается наличие вкраплений.

Упаковка

Таблетки, диспергируемые в полости рта, 10 мг:

По 7 таблеток, диспергируемых в полости рта, в блистер из алюминия с силикагелем/алюминия. 4 блистера с инструкцией по применению в картонную пачку;



Таблетки, диспергируемые в полости рта, 15 мг:

По 7 таблеток, диспергируемых в полости рта, в блистер из алюминия с силикагелем/алюминия. 4 блистера с инструкцией по применению в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения

Турецкая Республика

Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш., г. Стамбул, квартал Сарай, ул. Доктора Аднана Бююкдениза, 14, р-н Умранье

Номер телефона: +90(216) 633 60 00

Номер факса: +90(216) 633 60 01

Адрес электронной почты: bizeulasin@nobel.com.tr

Производитель

Турецкая Республика

Нобел Илач Санайи Ве Тиждарет А.Ш., г. Дюздже, д. Санджаклар, ул. Эски Акчакоджа № 299

Представитель держателя регистрационного удостоверения

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь

Представительство АО «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Немига, дом 5, этаж 4, помещение 71

Номер телефона: +375 (17) 388-03-84

Адрес электронной почты: nobel@nobel.by

Республика Казахстан

АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»

050008, г. Алматы, ул. Шевченко 162 Е.

Номер телефона: (+7 727) 399-50-50

Адрес электронной почты: nobel@nobel.kz

Кыргызская Республика

Представительство АО «Нобел Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.» в КР, 720011, г. Бишкек, ул. Куренкеева 89, 5 этаж

Номер телефона: +996 (312) 38 03 08

Адрес электронной почты: office@nobel.kg

Торговые наименования лекарственного препарата

Абизол (Республика Беларусь, Республика Кыргызстан)

Абизол® EasyTab (Республика Казахстан)

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://eec.eaeunion.org/>