

**Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата –  
информация для потребителя  
МАГНИЯ СУЛЬФАТ,  
порошок для приготовления раствора для внутреннего применения**

**Перед применением препарата полностью прочитайте инструкцию по медицинскому применению, поскольку в ней содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните инструкцию по медицинскому применению. Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 инструкции по медицинскому применению.

**Содержание инструкции по медицинскому применению**

1. Что собой представляет препарат МАГНИЯ СУЛЬФАТ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ
3. Применение препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что собой представляет препарат МАГНИЯ СУЛЬФАТ,  
и для чего его применяют**

Препарат МАГНИЯ СУЛЬФАТ при приеме внутрь оказывает желчегонное и слабительное действие, является антидотом при отравлениях солями тяжелых металлов.

МАГНИЯ СУЛЬФАТ применяют эпизодически в качестве слабительного средства при запорах, для подготовки к исследованиям толстого кишечника и при отравлениях растворимыми солями бария.

**2. О чем следует знать перед применением  
препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ**

**Не применяйте препарат МАГНИЯ СУЛЬФАТ, если:**

- у Вас повышенная чувствительность к сульфату магния;
- у Вас аппендицит;
- у Вас ректальное кровотечение (в т.ч. предполагаемое); кишечная непроходимость; острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта; колит;
- у Вас желчекаменная болезнь; обструкция желчевыводящих путей;
- у Вас дегидратация; гипермагниемия; состояния, связанные с дефицитом кальция и угнетением дыхательного центра;
- у Вас лихорадка;
- у Вас артериальная гипотензия;
- у Вас тяжелая почечная недостаточность;
- Вы беременны или кормите грудью.

Препарат не показан к применению у детей младше 12 лет.

Если Вы не уверены, относится ли к Вам что-либо из вышеперечисленного, сообщите об этом лечащему врачу перед применением препарата.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Препарат МАГНИЯ СУЛЬФАТ следует принимать эпизодически. Систематическое применение не рекомендуется.

Слабительные не следует принимать при сильных болях в животе. Осмотические слабительные могут вызывать обезвоживание, поэтому всегда следует принимать достаточное количество воды. Используйте с осторожностью у пожилых и ослабленных пациентов.

Если после приема препарата нет дефекации, необходимо обратиться к врачу.

#### **Другие препараты и МАГНИЯ СУЛЬФАТ**

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

Соли магния при пероральном применении обладают свойствами антацидов, поэтому рекомендуется принимать этот препарат не ранее двух-четырех часов после приема других лекарственных средств, чтобы свести к минимуму взаимодействие.

**Сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали, или собираетесь принимать следующие препараты:**

- препараты для предотвращения свертывания крови (например, дипиридамол);
- сердечные гликозиды (препараты для лечения некоторых заболеваний сердца);
- препараты для лечения психических расстройств (например, фенотиазины, особенно хлорпромазин);
- антибиотики (например, ципрофлоксацин, тетрациклины, стрептомицин, тобрамицин, клиндамицин, полимиксин В);
- этидроновую кислоту (корректор метаболизма костной и хрящевой ткани);
- препараты  $\text{Ca}^{2+}$ ;
- карбонаты, гидрокарбонаты и фосфаты щелочных металлов;
- гидрокортизон;
- прокаин (анестетик);
- аспирин.

#### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данный препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Не влияет на способность к управлению автотранспортом и работе с потенциально опасными механизмами.

### **3. Применение препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ**

Внутрь назначают как слабительное средство (на ночь или натощак – за полчаса до еды) взрослым по 10-30 г порошка растворить в 100 мл теплой кипяченой воды, детям старше 12 лет – по 10 г в 100 мл теплой кипяченой воды.

При хроническом запоре – клизмы (20-30 г порошка растворить в 100 мл теплой кипяченой воды).

Как желчегонное средство назначают по 1 столовой ложке раствора (20 г порошка растворить в 100 мл теплой кипяченой воды) 3 раза в день; производят также дуоденальное зондирование с введением через зонд теплого раствора магния сульфата (50 мл 25% раствора или 100 мл 10% раствора).

При отравлении солями тяжелых металлов промывают желудок сульфата или дают его внутрь (20-25 г в 200 мл воды). Максимальная доза для взрослых – до 40 г/сутки.

**Если Вы приняли препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ больше, чем следовало**

Ранние признаки и симптомы гипермагниемии: брадикардия, диплопия (нарушение зрения, заключающееся в удвоении изображения рассматриваемого предмета), внезапный «прилив» крови к коже лица, головная боль, снижение артериального давления, тошнота, одышка, смазанность речи, рвота, тяжелая диарея, слабость.

Лечение легкой гипермагниемии обычно состоит в ограничении потребления магния.

При тяжелой гипермагниемии Вам может потребоваться поддержка сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

При появлении данных симптомов немедленно прекратите применение лекарственного препарата и обратитесь к врачу.

#### **4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам, МАГНИЯ СУЛЬФАТ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможно развитие следующих реакций: тошнота, рвота, диарея, обострение воспалительных заболеваний ЖКТ, нарушение электролитного баланса (повышенная утомляемость, астения, спутанность сознания, аритмия, судороги), метеоризм, абдоминальная боль спастического характера, жажда, признаки гипермагниемии при наличии почечной недостаточности (головокружение).

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше.

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», <http://www.rceth.by>). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### **5. Хранение препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ**

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Не применяйте препарат, если Вы заметили, что пакет, в котором находится порошок, поврежден.

#### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

**Состав на один пакет:** магния сульфат – 10 г или 20 г.

#### **Внешний вид препарата МАГНИЯ СУЛЬФАТ**

МАГНИЯ СУЛЬФАТ, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения, представляет собой бесцветные призматические кристаллы, выветривающиеся на воздухе.

#### **Упаковка**

По 10 г или 20 г в пакетах из бумаги ламинированной полиэтиленом, или материала упаковочного на основе бумаги и пленки полиэтиленовой, или ленты упаковочной из материала комбинированного на основе бумаги и пленки полиэтиленовой, вместе с инструкцией по медицинскому применению.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск,

ул. Фабрициуса, 30, тел./факс: (+375 17) 220 37 16,

e-mail: [medic@belmedpreparaty.com](mailto:medic@belmedpreparaty.com)

Инструкция по медицинскому применению пересмотрена:

