

**Листок-вкладыш – информация для потребителя**  
**ТАУФОН,**  
**раствор (капли глазные) 40 мг/мл**  
**Действующее вещество: таурин**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что собой представляет препарат ТАУФОН и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ТАУФОН.
3. Применение препарата ТАУФОН.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ТАУФОН.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

**1. Что собой представляет препарат ТАУФОН,  
и для чего его применяют**

Препарат ТАУФОН стимулирует процессы восстановления при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, которые сопровождаются резким нарушением метаболизма глазных тканей.

Глазные капли ТАУФОН применяют:

- для лечения дистрофических поражений роговицы и сетчатки глаза, включая патологическое изменение пигментного эпителия;
- для лечения катаракты (возрастная, диабетическая, травматическая, лучевая);
- как средство, стимулирующее восстановительные процессы при травмах роговицы;
- как дополнительное средство для лечения открытоугольной глаукомы (повышение внутриглазного давления).

**2. О чем следует знать перед применением препарата  
ТАУФОН**

**Не применяйте данный препарат, если:**

- у Вас повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо компоненту препарата (см. раздел 6);

*С осторожностью:* при беременности, в период лактации, у детей до 18 лет.

**Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата ТАУФОН проконсультируйтесь с лечащим врачом, если:

- Вам необходимо одновременно использовать другие офтальмологические

лекарственные препараты (глазные капли и другие). Интервал между применением Тауфона и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут. Глазные мази следует применять последними.

Любые контактные линзы следует снимать перед закапыванием препарата и надевать не ранее, чем через 15 минут после него.

#### **Дети**

Следует применять с осторожностью у детей до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата).

#### **Важная информация о некоторых составляющих лекарственного препарата**

Метилпарагидроксибензоат, входящий в состав препарата, может вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные. В таких случаях следует прекратить применение препарата.

#### **Другие препараты и препарат ТАУФОН**

Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать любые другие препараты. Это относится к любым растительным препаратам или препаратам, которые Вы купили без назначения врача.

При совместном применении с глазными каплями  $\beta$ -адреноблокаторов (тимолола малеата или бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазола) усиливает снижение внутриглазного давления.

#### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Эффективность и безопасность применения глазных капель Тауфон в период беременности и кормления грудью не установлены. Назначение препарата в период беременности и грудного вскармливания возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **3. Применение препарата ТАУФОН**

Всегда применяйте этот препарат в полном соответствии с рекомендациями врача. При появлении сомнений, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат применяется местно в виде инстилляций.

Для лечения катаракты ТАУФОН закапывают по 1-2 капли 2-4 раза в день в течение 3 месяцев. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических поражениях применяют в тех же дозах в течение 1 месяца.


#### ***Рекомендации по использованию флаконов в комплекте с крышкой-капельницей***

Перед применением внимательно прочитайте этот раздел и последовательно выполните операции, представленные ниже в тексте и на рисунках 1-6.

1. Достать из упаковки флакон.
2. Если флакон закупорен колпачком алюминиевым: расположить ножницы под углом 45 градусов к крышке, подцепив её нижний край, движением, направленным вверх, снять алюминиевый колпачок вместе с резиновой крышкой (рис. А 1-2).
3. Если флакон закупорен колпачком алюминиевым с пластиковой накладкой: с усилием потянуть за пластиковую накладку со стороны надрезов, поднимая ее

вертикально, затем резко потянуть вниз вдоль флакона для нарушения целостности колпачка. Снять алюминиевый колпачок и резиновую пробку (рис. Б 1-2).

4. Достать капельницу из упаковки и плотно надеть ее на флакон (рис. 3).
5. Перевернуть флакон строго вертикально для удаления воздушного пузырька и подождать несколько секунд. В случае большого пузырька вернуть флакон в исходное положение, а затем медленно повторить действие, аккуратно постучав по дну флакона (рис. 4).
6. Закапать капли, нажимая указательным и большим пальцем на пипетку (рис. 5).  
 Нельзя прикасаться пипеткой к глазу или другим поверхностям – это может привести к инфицированию раствора.
7. Перевернув флакон, закрыть пипетку специальной пробкой (рис. 6).



Мойте руки перед использованием глазных капель. Не прикасайтесь капельницей к глазам или рукам.

После закапывания глазных капель рекомендуется закрыть глаза ватным тампоном. Не открывая глаз, прижмите внутренний угол глаза на 1-2 минуты.

**Если Вы применили препарата ТАУФОН больше, чем следовало**

Если Вы считаете, что закапали слишком большую дозу препарата, промойте глаза водой или физиологическим раствором и при необходимости обратитесь к врачу.

**Если Вы забыли применить препарат ТАУФОН**

Если Вы забыли закапать глазные капли, сделайте это при первой возможности. Не закапывайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Если Вы пропустили несколько доз, сообщите об этом врачу.

**4. Возможные нежелательные реакции**

Подобно всем лекарственным препаратам ТАУФОН может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата могут возникнуть аллергические реакции (в т.ч. замедленного типа), вызванные индивидуальной гиперчувствительностью к компонентам препарата.

### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас появились нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу. Это также относится к любым нежелательным реакциям, которые не указаны в данном листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов (УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», [www.rceth.by](http://www.rceth.by)). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

### **5. Хранение препарата ТАУФОН**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном и невидимом для детей месте.

Вскрытый флакон хранить в защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С в течение 4 недель.

Срок годности – 3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Не выливайте остатки препарата в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

### **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

Состав на один флакон: действующее вещество – таурина (тауфона) – 200 мг или 400 мг.

*Вспомогательные вещества:* метилпарагидроксибензоат, вода для инъекций.

#### **Внешний вид препарата ТАУФОН и содержимое упаковки**

ТАУФОН, раствор (капли глазные) 40 мг/мл, – прозрачный бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор.

По 5 мл во флаконы или по 10 мл во флаконы, укупоренные пробками резиновыми и обкатанные колпачками. Флакон вместе с крышкой-капельницей и листком-вкладышем помещают в пачку.

**Условия отпуска:** без рецепта.

#### **Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

РУП «Белмедпрепараты»,

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс:(+375 17) 220 37 16

e-mail: [medic@belmedpreparaty.com](mailto:medic@belmedpreparaty.com)

Листок-вкладыш пересмотрен:

