

ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА, сироп

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА
3. Прием препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА
6. Содержимое упаковки и прочие сведения



1. Что из себя представляет препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА, и для чего его применяют

Препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА содержит сухой экстракт листьев плюща.

ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА – лекарственный препарат растительного происхождения, который применяется в качестве отхаркивающего средства при лечении острых респираторных заболеваний, сопровождающихся продуктивным кашлем.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение через 7 дней лечения, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА

Не принимайте препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА если у вас:

- аллергия на компоненты препарата (в том числе перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша) или растения семейства аралиевых (Araliaceae)

Не давайте препарат детям в возрасте до 2 лет вследствие риска ухудшения респираторных симптомов из-за увеличения количества мокроты.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Вам следует соблюдать осторожность при приеме препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА, если у вас гастрит или язвенная болезнь желудка.

Обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки, если:

- во время приема препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА у вас сохраняются симптомы заболевания или ваше состояние ухудшается (появилась одышка, повысилась температура, появилась мокрота с примесью гноя или крови)
- через 7 дней лечения вы не почувствовали улучшение

- вы начали принимать препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА одновременно с противокашлевыми средствами, такими как кодеин или декстрометорфан (не рекомендовано принимать без предварительной консультации с врачом)
- у вас заболевания почек или печени. Прежде чем принимать препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА вам необходима консультация относительно корректировки дозы

Дети

Перед приемом препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА в случае длительного или возникающего повторно кашля у ребенка в возрасте 2-4 лет проконсультируйтесь с лечащим врачом для уточнения диагноза.

Другие препараты и препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА

Сообщите лечащему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Это также относится к любым препаратам, отпускаемым без рецепта врача.

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными препаратами и продуктами питания.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

В связи с отсутствием данных прием препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА во время беременности и лактации не рекомендован.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по оценке влияния препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не проводились.

Сообщений о влиянии препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами не поступало.

Особые указания, касающиеся вспомогательных веществ

Препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА содержит сорбитол. Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА содержит глицерин. В связи с содержанием глицерина препарат может вызывать головную боль, расстройство желудка и диарею (понос).

3. Применение препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые и дети старше 12 лет: 5 мл сиропа два раза в сутки (соответствует 100 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).

Применение у детей

Дети от 2 до 6 лет: 1,5 мл сиропа два раза в сутки (соответствует 30 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).

Дети от 6 до 12 лет: 2,5 мл сиропа два раза в сутки (соответствует 50 мг сухого экстракта листьев плюща в сутки).

Препарат противопоказан у детей в возрасте до 2 лет.

Путь и способ введения

Перед употреблением флакон следует встряхнуть.

Дозирование препарата осуществляют при помощи орального шприца, которым комплектуется каждый флакон.

Препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА следует принимать утром или в первой

половине дня вне зависимости от приема пищи. Не принимайте препарат в вечернее время или непосредственно перед сном. Рекомендовано запивать достаточным количеством теплой воды.

Продолжительность применения

Если симптомы сохраняются в течение недели после начала приема препарата, то следует проконсультироваться с врачом. Длительность лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости препарата.

Если вы приняли препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА больше, чем следовало

Не принимайте дозы, превышающие рекомендованные.

Если вы приняли дозу, превышающую суточную дозу более чем в два раза, возможны тошнота, рвота, понос, возбужденное состояние. Лечение симптоматическое.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Сообщалось о следующих нежелательных реакциях, для которых частота возникновения определена как *неизвестно* (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- тошнота, рвота, понос
- аллергические реакции, проявляющиеся в виде крапивницы (покраснение кожи с зудом и жжением), кожной сыпи и затруднения дыхания
- тяжелые аллергические реакции (анафилактические реакции), которые могут проявляться в виде отеков рта, языка, лица и/или горла, затрудненного дыхания или глотания (хрипы из-за стеснения в груди)

В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. При возникновении тяжелых аллергических реакций, следует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через www.rceth.by. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не охлаждать.

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Сироп следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия флакона.

Срок годности – 2 года.

Не применять по истечении срока годности. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

В 1 мл сиропа содержится 10,0 мг сухого экстракта листьев плюща ((4,0-8,0):1). Растворитель для экстракции: этанол 24-30% (м/м).

Вспомогательные вещества: сорбитола раствор некристаллизующийся (Е420), глицерин, натрия бензоат (Е211), лимонная кислота безводная, экстракт Melissa, вода очищенная.

Внешний вид препарата ФИТОЛЭНД СИРОП ПЛЮЩА и содержимое упаковки

Сироп желто-коричневого цвета с характерным запахом и вкусом. Допускается образование осадка.

По 100 мл сиропа в полимерном флаконе коричневого цвета, укупленный колпачком полимерным коричневого цвета с предохранительным кольцом и уплотнительной прокладкой, с оральным шприцем и листком-вкладышем в картонной упаковке.

Порядок отпуска

Без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель:

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, к. 3

E-mail: mail@pharmland.by.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения и производителю.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации:

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте www.rceth.by.