

**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, 7,5 мг, таблетки**  
**МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, 15 мг, таблетки**  
Действующее вещество: мелоксикам

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

**Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ
3. Прием препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

**1. Что из себя представляет препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, и для чего его применяют**

Лекарственный препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ содержит в качестве действующего вещества мелоксикам. Он принадлежит к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые используются для снятия воспаления и боли в суставах и мышцах.

Лекарственный препарат предназначен для взрослых и подростков старше 16 лет по показаниям:

- симптоматическое кратковременное лечение обострения остеоартроза (заболевание суставов, которое характеризуется разрушением их хрящевой ткани).
- симптоматическое долговременное лечение ревматоидного артрита (хронического воспалительного заболевания суставов) или анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева – хронической формы артрита с преимущественным поражением позвоночника).

**Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.**

**2. О чем следует знать перед приемом препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ**

**Не принимайте МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, если:**

- у Вас аллергия на мелоксикам или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- Вы в 3-ем триместре беременности;

- Вы младше 16 лет;
- после приема ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) у Вас возникали следующие симптомы:
  - затрудненный вдох и/или выдох, чувство стеснения в груди, одышка (симптомы бронхиальной астмы);
  - заложенность носа из-за отека слизистой оболочки носа (полипы полости носа);
  - кожная сыпь/крапивница (покраснения и волдыри на коже);
  - внезапный отек кожи или слизистых оболочек, например, отек слизистой оболочки глаз, лица и губ, рта или горла, который может сопровождаться одышкой (ангионевротический отек);
- после предыдущей терапии НПВП у Вас в анамнезе есть желудочно-кишечное кровотечение или перфорация желудка или кишечника;
- у Вас имеются желудочно-кишечные язвы или желудочно-кишечное кровотечение;
- у Вас недавно были или были повторные (не менее двух раз) язвы желудочно-кишечного тракта или кровотечения в желудочно-кишечном тракте;
- у Вас тяжелое заболевание печени;
- у Вас тяжелое заболевание почек, которое не лечили проведением диализа (искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма);
- Вы недавно перенесли кровоизлияние в мозг (цереброваскулярное кровотечение);
- у Вас диагностировано любое нарушение свертываемости крови;
- у Вас выраженная сердечная недостаточность (синдром, возникающий из-за ухудшения насосной функции сердца).

**Если что-либо из вышеперечисленного относится к Вам, сообщите об этом своему врачу и не принимайте МЕЛОКСИКАМ-ЛФ.**

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед началом приема препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Особые указания**

Прием таких лекарственных препаратов, как препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, может быть связан с небольшим повышенным риском сердечного приступа (инфаркта миокарда) или инсульта (кровоизлияния в мозг). Любой риск более вероятен при высоких дозах и долгосрочном лечении. Не принимайте больше рекомендуемой дозы. Не принимайте препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ дольше, чем вам назначено (см. раздел 3 «Применение препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ»).

Если у Вас есть проблемы с сердцем, Вы ранее перенесли инсульт, или Вы думаете, что можете быть подвержены риску данных заболеваний, Вам следует обсудить лечение со своим врачом или работником аптеки.

**Прежде чем принимать препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, сообщите своему лечащему врачу о следующем:**

- у Вас гипертензия (высокое артериальное давление);
- у Вас сахарный диабет (высокий уровень сахара в крови);
- у Вас гиперхолестеринемия (высокий уровень холестерина в крови);
- Вы курите;
- у Вас после приема мелоксикама или других оксикамов (например, пироксикама), развилась фиксированная лекарственная сыпь (пятна круглой или овальной формы с покраснением и припухлостью кожи, которые при повторном приеме препарата появляются в прежних местах высыпания, волдыри, крапивница и зуд).

Немедленно прекратите применение препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, если заметите, что у Вас развиваются симптомы желудочно-кишечного кровотечения (например, дегтеобразный стул) или симптомы язвы в желудочно-кишечном тракте (сильные боли в животе).

При применении препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ были зарегистрированы потенциально опасные для жизни кожные высыпания (например, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз). Вначале по всему телу появляется сыпь в виде красных точек или круглых пятен, часто в центре с волдырем. Сыпь может вызвать обширное образование волдырей или шелушение кожи. Дополнительные симптомы, за появлением которых нужно наблюдать: воспаления (язвы) слизистой полости рта, горла, носа, половых органов, а также покраснение и опухание глаз (конъюнктивит). Эти потенциально опасные для жизни кожные реакции часто сопровождаются гриппоподобными симптомами (головная боль, лихорадка и ломота в теле). Наиболее высокий риск развития этих тяжелых кожных реакций – в течение первых недель лечения. Никогда не возобновляйте применение препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, если на фоне приема данного препарата у Вас развивался синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз.

Если у Вас появилась сыпь или другие кожные симптомы, прекратите применение препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ и немедленно обратитесь к врачу. Скажите врачу, что Вы принимаете данный лекарственный препарат.

Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ не подходит, если Вам требуется немедленное облегчение острой боли.

Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ может маскировать симптомы инфекции (например, лихорадку). Если Вы думаете, что у Вас может быть инфекция, Вам следует обратиться к лечащему врачу.

### **Меры предосторожности**

Перед приемом препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ важно проконсультироваться с лечащим врачом в случаях, если:

- у Вас когда-либо было воспаление пищевода (эзофагит), желудка (гастрит) или другие желудочно-кишечные заболевания (например, язвенный колит или болезнь Крона);
- у Вас гипертензия (высокое артериальное давление);
- Вы старше 65 лет;
- у Вас заболевания печени, сердца или почек;
- у Вас сахарный диабет (высокий уровень сахара в крови);
- у Вас гиповолемия (уменьшение объема циркулирующей крови), вызванная тяжелой кровопотерей или ожогами, хирургическим вмешательством или недостаточным потреблением жидкости;
- у Вас высокий уровень калия в крови, который был выявлен по результатам лабораторных анализов.

Вашему врачу необходимо будет регулярно контролировать Ваше состояние в период лечения и, в случае необходимости, скорректировать лечение.

### **Дети и подростки**

Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ противопоказан детям и подросткам в возрасте до 16 лет.

### **Другие препараты и препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ**

Сообщите врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ может влиять на действие других лекарственных препаратов и сам может оказываться под их влиянием.

Обязательно сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете или принимали какой-либо из следующих лекарственных препаратов:

- другие нестероидные противовоспалительные препараты (например, диклофенак, кетопрофен, кеторолак, нимесулид, ацетилсалициловая кислота);
- соли калия (например, калия оротат, калия аспарагинат; применяются для профилактики или лечения низкого уровня калия в крови);
- такролимус (применяется после трансплантации органов);
- триметоприм (применяется для лечения инфекций мочевыводящих путей);
- лекарственные препараты, препятствующие свертыванию крови (например, гепарин, варфарин, ривароксабан);
- лекарственные препараты, растворяющие тромбы в крови (тромболитики);
- лекарственные препараты, применяемые для лечения заболеваний сердца и почек;
- кортикостероиды (например, применяемые для лечения воспаления или аллергических реакций);
- циклоспорин (применяется после трансплантации органов или при тяжелых кожных заболеваниях, ревматоидном артрите или нефротическом синдроме);
- деферазинокс (применяется для лечения хронической перегрузки железом из-за частых переливаний крови);
- мочегонные препараты (например, фуросемид, индапамид, гидрохлортиазид). Лечащий врач должен контролировать функцию Ваших почек, если Вы принимаете диуретики (мочегонные препараты);
- лекарственные препараты для лечения высокого артериального давления (например, лозартан, эналаприл, бисопролол);
- препараты лития (применяются при психических заболеваниях);
- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (применяются при лечении депрессии);
- метотрексат (применяется для лечения опухолей, тяжелых неконтролируемых кожных заболеваний, ревматоидного артрита);
- пеметрексед (применяется для лечения опухолей);
- холестирамин (применяется для снижения уровня холестерина);
- препараты для приема внутрь для лечения сахарного диабета (производные сульфонилмочевины (например, глибенкламид, гликлазид), натеглинид). Лечащему врачу следует внимательно контролировать у Вас уровень сахара в крови на предмет низкого уровня сахара в крови (гипогликемии).

### **Беременность, грудное вскармливание и фертильность**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Беременность**

В период первого и второго триместров беременности лечащий врач будет назначать мелоксикам только в случае крайней необходимости в связи с потенциальным риском выкидыша или пороков развития плода. В этом случае доза препарата и продолжительность лечения должны быть минимальными.

В течение последних 3-ех месяцев беременности мелоксикам противопоказан. Не принимайте данный препарат, поскольку он может иметь тяжелые или даже смертельные последствия для плода/ребенка, особенно для его сердца, легких и/или почек, даже при однократном приеме.

Если Вы принимали мелоксикам в период беременности, Вы должны немедленно сообщить об этом лечащему врачу. Врач рассмотрит вопрос о необходимости дополнительного наблюдения за Вашим состоянием.

#### **Грудное вскармливание**

Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ не следует принимать в период грудного вскармливания.

#### **Фертильность**

Данный препарат может затруднить наступление беременности. Вам следует сообщить лечащему врачу, если Вы планируете беременность или если у Вас возникли проблемы с зачатием.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

При приеме данного препарата могут возникать нарушения зрения, включая нечеткость зрения, головокружение, сонливость, вертиго (ощущение вращения) или другие нарушения со стороны центральной нервной системы. Если у Вас есть данные симптомы, Вам не следует управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Если у Вас есть нарушения зрения, не управляйте транспортными средствами и не работайте с механизмами.

**Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ содержит натрий.** Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на таблетку, то есть по сути не содержит натрия.

**Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ содержит лактозу.** Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед применением данного лекарственного препарата.

### **3. Прием препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза**

##### **Обострение остеоартроза**

1 таблетка 7,5 мг один раз в сутки. Доза может быть увеличена до 2-ух таблеток (что эквивалентно 15 мг) один раз в сутки.

##### **Ревматоидный артрит**

2 таблетки 7,5 мг или 1 таблетка 15 мг один раз в сутки. Доза может быть уменьшена до 1 таблетки 7,5 мг один раз в сутки.

##### **Анкилозирующий спондилит (хроническая форма артрита с преимущественным поражением позвоночника)**

2 таблетки 7,5 мг или 1 таблетка 15 мг один раз в сутки. Доза может быть уменьшена до 1 таблетки 7,5 мг один раз в сутки.

##### **Не превышайте максимальную рекомендуемую дозу 15 мг в сутки!**

Если что-либо из перечисленного в разделе 2 «Особые указания и меры предосторожности» относится к Вам, лечащий врач может ограничить Вам дозу препарата до 7,5 мг один раз в сутки.

#### **Особые группы пациентов**

##### **Пациенты пожилого возраста**

Если Вы пожилого возраста, рекомендуемая доза для длительного лечения ревматоидного артрита и анкилозирующего спондилита составляет 7,5 мг (одна таблетка) в сутки.

##### **Пациенты с повышенным риском нежелательной реакции**

Если Вы пациент с повышенным риском нежелательных реакций, Ваш лечащий врач будет начинать лечение с дозы 7,5 мг (одна таблетка) в сутки.

##### **Пациенты с нарушением функции почек**

Если у Вас тяжелые нарушения функции почек, и Вы находитесь на диализе, Вам не следует превышать дозу 7,5 мг (одна таблетка) в сутки. Для пациентов с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести коррекция дозы не требуется.

#### **Пациенты с печеночной недостаточностью**

Для пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести коррекция дозы не требуется.

#### **Дети и подростки**

Препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ противопоказан детям и подросткам в возрасте до 16 лет.

Если Вы чувствуете, что действие препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ слишком сильное или слишком слабое, или если после нескольких дней приема препарата Вы не чувствуете никакого улучшения своего состояния, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### **Способ применения**

Для приема внутрь.

Таблетки следует принимать во время еды. Таблетки проглатывают целиком, запивая водой или другим напитком.

Линия разлома (риска) предназначена исключительно для упрощения разделения таблетки и ее проглатывания, а не разделения на равные дозы.

#### **Если Вы приняли препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ больше, чем следовало**

Если Вы приняли таблеток больше, чем следовало, то немедленно обратитесь к врачу или в ближайшее медицинское учреждение. Не забудьте взять с собой упаковку данного препарата или этот листок-вкладыш.

Симптомы после острой передозировки НПВП обычно следующие:

- слабость (вялость);
- сонливость;
- тошнота или рвота;
- боль в области живота (боль в эпигастрии).

Эти симптомы обычно проходят после прекращения приема препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ. Также могут возникать кровотечения из желудка или кишечника (желудочно-кишечные кровотечения).

Тяжелое отравление может привести к серьезным нежелательным реакциям, таким как (см. раздел 4):

- высокое артериальное давление (гипертензия);
- острая почечная недостаточность;
- дисфункция печени (нарушение функции печени);
- ослабление дыхания, поверхностное дыхание или остановка дыхания (дыхательная недостаточность);
- потеря сознания (кома);
- судороги (конвульсии);
- нарушение кровообращения (сердечно-сосудистый коллапс);
- остановка сердца (прекращение сердечной деятельности);
- аллергические реакции немедленного типа (гиперчувствительность), в том числе потеря сознания, одышка, кожные реакции.

#### **Если Вы забыли принять препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ**

Если Вы забыли принять очередную дозу препарата, примите ее сразу же, как только вспомните об этом, за исключением случаев, если пришло время принять следующую дозу препарата. В этом случае просто примите следующую дозу. Не принимайте двойную дозу для восполнения пропущенной.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре.

#### 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, МЕЛОКСИКАМ-ЛФ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Прекратите применение препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас возникнут любые из указанных ниже симптомов:**

- любые аллергические реакции (гиперчувствительность), которые могут проявляться в виде:
  - кожных реакций, таких как зуд (кожный зуд), образование волдырей или шелушений кожи, которые могут быть потенциально опасными для жизни, кожные высыпания (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз), поражения мягких тканей (поражения слизистых оболочек) или мультиформная эритема (см. раздел 2). Мультиформная эритема – это тяжелая аллергическая кожная реакция, вызывающая появление пятен, красных волдырей, или пурпур, или участков кожи с пузырями. Также могут поражаться рот, глаза и другие слизистые оболочки;
  - отека кожи или слизистых оболочек (например, отека слизистой оболочки глаз, лица, губ, рта или горла, который может затруднить дыхание, отека лодыжек или голеней (отека нижних конечностей);
  - одышки или приступа бронхиальной астмы;
  - воспалений печени (гепатита), которые могут вызвать такие симптомы, как желтуха (пожелтение кожи или глазных яблок), боль в животе, потеря аппетита;
- любые нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, особенно:
  - кровотечение (вызывающее дегтеобразный стул);
  - образование язвы в желудочно-кишечном тракте (вызывающее боль в животе).

Кровотечение из желудочно-кишечного тракта (гастроинтестинальное кровотечение), образование язв или прободение в желудочно-кишечном тракте (перфорация) иногда могут быть серьезными и потенциально летальными, особенно у пожилых пациентов.

Если у Вас ранее наблюдались какие-либо симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта в связи с длительным применением НПВП, немедленно обратитесь к врачу, особенно если Вы пожилого возраста. Лечащий врач будет контролировать Ваше состояние во время лечения.

#### **Общие нежелательные реакции при применении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)**

Применение некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) может быть связано с небольшим повышенным риском закупорки артериальных сосудов (артериальным тромбозом), например, сердечным приступом (инфарктом миокарда) или кровоизлиянием в мозг (инсультом), особенно при долгосрочном применении препарата в высоких дозах.

Сообщалось о задержке жидкости (отеках), высоком артериальном давлении (гипертензии) и сердечной недостаточности на фоне лечения НПВП.

Наиболее часто наблюдаемые нежелательные реакции проявляются со стороны желудочно-кишечного тракта:

- язвы желудка и верхней части тонкого кишечника (пептическая/гастроудоденальная язвы);
- перфорация в стенке кишечника или кровотечение из желудочно-кишечного тракта (иногда с летальным исходом, особенно у пожилых пациентов).

Сообщалось о следующих нежелательных реакциях после применения НПВП:

- тошнота и рвота;
  - жидкий стул (диарея);
  - вздутие живота (метеоризм);
  - запор;
  - нарушение пищеварения (диспепсия);
  - боль в животе;
  - дегтеобразный стул из-за кровотечения в желудочно-кишечном тракте (мелена);
  - рвота кровью (гематемезис);
  - воспаление слизистой оболочки полости рта с образованием язв (афтозный стоматит);
  - обострение воспаления желудочно-кишечного тракта (воспаления толстой кишки – колит или болезнь Крона).
- Реже наблюдалось воспаление желудка (гастрит).

#### **Другие нежелательные реакции**

##### **Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):**

- желудочно-кишечные расстройства, такие как нарушения пищеварения (диспепсия), тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм (вздутие живота), жидкий стул (диарея).

##### **Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):**

- головная боль.

##### **Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):**

- головокружение;
- вертиго (чувство головокружения или вращения);
- сонливость;
- анемия (малокровие);
- повышение артериального давления (гипертензия);
- гиперемия кожи (покраснение лица и шеи);
- накопление натрия и воды в организме;
- повышение уровня калия (гиперкалиемия), что характеризуется следующими симптомами: нарушениями сердечного ритма (аритмии), учащенным сердцебиением, мышечной слабостью;
- отрыжка;
- воспаление желудка (гастрит);
- кровотечение из желудочно-кишечного тракта;
- воспаление полости рта (стоматит);
- аллергические реакции немедленного типа (гиперчувствительность);
- зуд;
- кожная сыпь;
- отеки, вызванные задержкой жидкости в организме, включая отек лодыжек или голеней (отек нижних конечностей);
- внезапный отек кожи или слизистых оболочек, например, слизистой оболочки глаз, лица, губ, рта или горла, возможно, затрудняющий дыхание (ангионевротический отек);
- кратковременное отклонение от нормы результатов функциональных тестов печени (например, повышение концентрации печеночных ферментов, таких как трансаминазы или увеличение желчного пигмента билирубина). Лечащий врач может обнаружить отклонения на основании результатов анализа крови;
- отклонение от нормы результатов лабораторных тестов, применяемых для оценки функции почек (например, повышенный уровень креатинина или мочевины).

**Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000):**

- перепады настроения;
  - ночные кошмары;
  - заболевания крови, включая:
    - отклонение от нормы дифференциального анализа крови;
    - уменьшение числа лейкоцитов по результатам анализа крови (лейкоцитопения);
    - уменьшение числа тромбоцитов (тромбоцитопения).
- Эти нежелательные реакции могут привести к повышенному риску инфекции и таким симптомам, как синяки или носовое кровотечение.
- звон в ушах (тиннитус);
  - учащенное сердцебиение;
  - язвы желудка или верхней части тонкого кишечника (пептическая/гастродуоденальная язва);
  - эзофагит (воспаление пищевода);
  - начало приступов бронхиальной астмы (наблюдается у людей с аллергией на аспирин или другие НПВП);
  - обширное образование волдырей или шелушение кожи (синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз);
  - крапивница;
  - нарушение зрения, включая нечеткость зрения, конъюнктивит (воспаление глазного яблока или век);
  - воспаление толстой кишки (колит).

**Очень редко (могут возникать менее чем у 1 человека из 10000):**

- волдыри на коже (буллезный дерматит) и мультиформная эритема. Мультиформная эритема – это тяжелая аллергическая кожная реакция, вызывающая появление пятен, красных волдырей, или пурпур, или участков с пузырями. Также могут поражаться рот, глаза и другие слизистые оболочки;
- воспаление печени (гепатит), которое может вызвать такие симптомы, как желтуха (пожелтение кожи или глазных яблок), боль в животе, потеря аппетита;
- острая почечная недостаточность, особенно у пациентов с такими факторами риска, как болезнь сердца, сахарный диабет или заболевание почек;
- перфорация в стенке кишечника (прободение).

**Частота неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):**

- спутанность сознания;
- дезориентация;
- одышка и кожные реакции (анафилактическая/анафилактоидная реакции);
- сыпь, вызванная воздействием солнечного света (реакции фоточувствительности);
- сердечная недостаточность, связанная с применением НПВП;
- полная потеря определенных типов лейкоцитов (агранулоцитоз), особенно у пациентов, которые принимают препарат МЕЛОКСИКАМ-ЛФ совместно с другими лекарственными препаратами, которые потенциально являются ингибирующими, угнетающими или разрушающими компоненты костного мозга (миелотоксические препараты). Это может привести к внезапной лихорадке, боли в горле, инфекциям;
- воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
- бесплодие у женщин, задержка овуляции;

- кожная аллергическая реакция, известная как фиксированная лекарственная сыпь, которая при повторном воздействии препарата обычно появляется в прежних местах высыпания и может выглядеть как пятна круглой или овальной формы с покраснением и отеком кожи, образованием волдырей, крапивница, зуд.

### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через [www.rceth.by](http://www.rceth.by) (Республика Беларусь), [www.ndda.kz](http://www.ndda.kz) (Республика Казахстан).

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

## **5. Хранение препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ**

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном и невидном для детей месте.

Не принимать лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте лекарственный препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от лекарственных препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, 7,5 мг, таблетки**

Каждая таблетка содержит:

**действующее вещество:** мелоксикам – 7,5 мг;

**вспомогательные вещества:** магния стеарат, натрия цитрат, повидон (К25), кросповидон (тип В), кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза моногидрат.

### **МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, 15 мг, таблетки**

Каждая таблетка содержит:

**действующее вещество:** мелоксикам – 15 мг;

**вспомогательные вещества:** магния стеарат, натрия цитрат, повидон (К25), кросповидон (тип В), кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза моногидрат.

### **Внешний вид препарата МЕЛОКСИКАМ-ЛФ и содержимое упаковки**

Таблетки.

#### **МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, 7,5 мг, таблетки**

Таблетки светло-желтого или желтого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской. Допускается мраморность на поверхности таблеток.

#### **МЕЛОКСИКАМ-ЛФ, 15 мг, таблетки**

Таблетки светло-желтого или желтого цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской и риской. Допускается мраморность на поверхности таблеток.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По одной или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

СООО «Лекфарм», Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2а, к. 301,  
тел./факс: (01774)-53801,  
электронная почта: office@lekpharm.by.

**За любой информацией о лекарственном препарате, а также в случаях появления претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения или представителю держателя регистрационного удостоверения:**

**Республика Беларусь**

СООО «Лекфарм»,  
Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2а, к. 301,  
тел./факс: (01774)-53801,  
электронная почта: office@lekpharm.by.

**Республика Казахстан**

Представительство СООО «Лекфарм» в Республике Казахстан,  
050000, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 7,  
БЦ "Нұрлы Тау", корпус 4а, офис 55,  
тел.: 8(727)-3110454,  
факс: 8(727)-3110455,  
электронная почта: baikenova@lekpharm.by.

**В случаях появления претензий, а также возникновения нежелательных реакций следует обращаться:**

**Республика Беларусь**

СООО «Лекфарм», отдел фармаконадзора и медицинской поддержки  
Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Минская, д. 2а, к. 301,  
тел./факс: (01774)-53801,  
электронная почта: office@lekpharm.by, sideeff@lekpharm.by.

**Республика Казахстан**

Контактное лицо по фармаконадзору на территории Республики Казахстан  
Кысмуратова А.Т.  
Республика Казахстан, 05010 г. Алматы, ул. Толе би, 23а,  
моб. тел.: +7 7013285139,  
электронная почта: amangul-62@mail.ru.

**Листок-вкладыш пересмотрен:****Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь: [www.rceth.by](http://www.rceth.by), на веб-сайте РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан <http://www.ndda.kz>, а также на веб-сайте Евразийского экономического союза: <http://www.eaeunion.org/>.

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте Евразийского экономического союза: <http://www.eaeunion.org/>.