

Листок-вкладыш – информация для пациента

РЕЛИКАПС АДВАНС, 206 мг, капсулы ректальные

Действующее вещество: бензокаин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Реликапс Адванс, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Реликапс Адванс.
3. Применение препарата Реликапс Адванс.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Реликапс Адванс.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ РЕЛИКАПС АДВАНС, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Реликапс Адванс содержит действующее вещество бензокаин и относится к группе «Препараты для местного лечения геморроя и анальных трещин. Местные анестетики». Препарат воздействует на нервные окончания и рецепторы, оказывает выраженный местный обезболивающий эффект.

Показания к применению

Препарат Реликапс Адванс применяется у взрослых, подростков и детей в возрасте старше 12 лет в качестве симптоматического средства в комплексной терапии геморроя и анальных трещин.

Если улучшение не наступило через 7 дней или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА РЕЛИКАПС АДВАНС**Не применяйте препарат Реликапс Адванс:**

- если у Вас аллергия на бензокаин или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас закупорка кровеносного сосуда тромбом (тромбоэмболия, в том числе ранее перенесенная);

– если у Вас уменьшение содержания гранулоцитов в крови (гранулоцитопения).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Реликапс Адванс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки:

- если у Вас повышенное артериальное давление (артериальная гипертензия);
- если у Вас есть нарушение сердечного ритма;
- если у Вас повышенная выработка гормонов щитовидной железы (гипертиреоз);
- если у Вас есть нарушение мочеиспускания (например, в случае гиперплазии предстательной железы);
- если у Вас обильные кровянистые выделения из заднего прохода.

При применении лекарственных препаратов, содержащих бензокаин, получены сообщения о развитии метгемоглобинемии (синюшность кожи, губ и ногтевых пластин, головная боль, головокружение, нарушения дыхания, общая слабость, учащенное сердцебиение), которая может привести к летальному исходу и требует неотложной медицинской помощи. Риск осложнений при развитии метгемоглобинемии выше у детей младшего возраста, лиц пожилого возраста, пациентов с наследственными расстройствами (недостаточность некоторых видов ферментов), заболеваниями сердца, заболеваниями дыхательных путей (бронхиальная астма, бронхит, эмфизема легких) или в случае курения.

При случайном употреблении внутрь немедленно обратитесь к врачу.

Дети

Лекарственный препарат не рекомендован детям до 12 лет.

Другие препараты и препарат Реликапс Адванс

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат не следует применять одновременно с некоторыми препаратами для лечения заболеваний нервной системы и психических нарушений (ингибиторы моноаминоксидазы, антидепрессанты), препаратами для снижения кровяного давления (гипотензивные препараты).

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Препарат не рекомендован для применения женщинам в период беременности и кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Данные о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами отсутствуют.

Вспомогательные вещества

Препарат Реликапс Адванс содержит натрия бензоат (E211), что может вызвать слабое раздражение кожи и слизистых оболочек.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕЛИКАПС АДВАНС

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Нельзя принимать внутрь. Только для ректального применения.

Рекомендуемая доза

Взрослые, подростки и дети старше 12 лет

Если врачом не предписано иначе, по 1 капсуле ректальной до 4 раз в день.

Продолжительность лечения

Длительность курса определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного препарата и достигнутого эффекта.

Способ применения

Препарат Реликапс Адванс вводят в прямую кишку утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника.

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур.

Не проглатывать и не применять другим способом!

Если Вы применили препарата Реликапс Адванс больше, чем следовало

В случае значительного превышения рекомендованных доз может наблюдаться склонность к нарушению свертывания крови (гиперкоагуляции), ведущей к образованию тромбов. В случае передозировки возможны реакции со стороны: сердечно-сосудистой, нервной систем, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта.

При применении лекарственных препаратов, содержащих бензокаин, получены сообщения о развитии состояния, которое характеризуется увеличением содержания метгемоглобина в крови (метгемоглобинемия) и проявляется синюшностью кожи, губ и ногтевых пластин, головной болью, головокружением, нарушением дыхания, общей слабостью, учащенным сердцебиением, которое может привести к летальному исходу и требует неотложной медицинской помощи.

В случае появления указанных симптомов необходимо немедленно обратиться в приемное отделение больницы.

Если Вы забыли применить препарат Реликапс Адванс

Не применяйте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную дозу.

Далее препарат применяется согласно рекомендованному режиму дозирования.

Если Вы прекратили применение препарата Реликапс Адванс

При прекращении применения лекарственного препарата нежелательные реакции не наблюдаются.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Препарат может вызвать другие, кроме указанных ниже нежелательных реакций.

Частота нижеперечисленных возможных нежелательных реакций является *неизвестной* (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):

– увеличение содержания метгемоглобина в крови (метгемоглобинемия); проявляется синюшностью кожи, губ и ногтевых пластин, головной болью, головокружением, нарушением дыхания, общей слабостью, учащенным сердцебиением;

- кожные аллергические реакции (покраснение, кожная сыпь, зуд);
- воспаление кожи, вызванное контактом с раздражающими веществами или аллергенами (контактный дерматит).

В случае появления нежелательных реакций, в том числе не указанных в листке-вкладыше, необходимо прекратить применение лекарственного препарата и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Кыргызская Республика

Департамент лекарственных средств
и медицинских изделий при
Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики
Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я
Линия, 25
Телефон: +996 312 21–92–78
Телефон горячей линии
фармаконадзора: 0800–800–26–26
Электронная почта: dlsmi@pharm.kg
<http://www.pharm.kg>

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»
Адрес: 220037, г. Минск,
пер. Товарищеский, 2а
Телефон: +375 (17) 242–00–29
Факс: +375 (17) 242–00–29
Электронная почта: rcpl@rceth.by
<http://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РЕЛИКАПС АДВАНС

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Храните при температуре не выше 25 °С.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ


Препарат Реликапс Адванс содержит

Действующее вещество: бензокаин.

Каждая капсула содержит 206 мг бензокаина.

Вспомогательные вещества: полисорбат 80, глицерина моностеарат, альфа-токоферол, подсолнечное масло рафинированное.

Оболочка капсулы содержит: желатин, глицерин, натрия бензоат (E211), вода очищенная, титана диоксид (E171).

**Внешний вид препарата и содержимое упаковки**

Капсулы мягкие желатиновые каплевидной формы, со швом, непрозрачные, от белого до светлого-желтого цвета.

По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

Не все размеры упаковок могут быть доступны для реализации.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

УП «Минскинтеркапс»

220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 26

Телефон/факс: +375 17 276-01-59

Электронная почта: info@mic.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий, следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Перечень торговых наименований препарата, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза

Страна	Торговое наименование
Кыргызская Республика	ПроктоАдванс
Республика Беларусь	Реликапс Адванс

Листок-вкладыш пересмотрен

Дата последнего пересмотра:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:

<https://eec.eaeunion.org/>