

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ****ЭССЕНЦИГЛИВ**

Торговое название: Эссенциглив

Лекарственная форма: капсулы.

Состав: одна капсула содержит: фосфолипидов – 65 мг (в виде липоида ППЛ-400 – 84,4 мг), тринатрия глицирризината – 35 мг.

Вспомогательные вещества: воск пчелиный, подсолнечное масло рафинированное.

Состав оболочки капсулы: желатин, глицерин, вода очищенная, натрия бензоат Е-211, титана диоксид Е-171, красители: железа оксид красный Е-172, железа оксид желтый Е-172, железа оксид черный Е-172.

Описание. Капсулы мягкие желатиновые овальной формы со швом, упругие, светло-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Средства для лечения заболеваний печени.

Код АТХ А05ВА.

Показания к применению

Эссенциглив применяют в составе комплексной терапии вирусного гепатита (острого и хронического), жировой дегенерации печени (гепатоза), других поражений печени (лекарственных, алкогольных, токсических), цирроза печени.

Способ применения и дозы

Эссенциглив применяют внутрь во время еды по 1-2 капсулы 3-4 раза в сутки, запивая небольшим количеством жидкости.

Продолжительность терапии определяется врачом на основании оценки соотношения польза/риск.

Меры предосторожности

Применять с осторожностью у больных с портальной гипертензией, у больных с артериальной гипертензией.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания
Не применяют.

Дети

Не применяют у детей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременное применение с тиазидными диуретиками, сердечными гликозидами, кортикостероидами, стимулирующими слабительными средствами или другими лекарственными препаратами, которые способны усиливать электролитный дисбаланс.

Побочное действие

Дерматологические реакции: при повышенной индивидуальной чувствительности возможно появление кожной сыпи, которая исчезает при отмене препарата.

При превышении суточных доз могут отмечаться задержка натрия и жидкости, отеки, повышение артериального давления, гипокалиемия. При появлении указан-

ных симптомов, в зависимости от их выраженности, необходимо уменьшить дозу препарата и/или назначить спиронолактон 50-100 мг в сутки.

Передозировка

Глицирризиновая кислота, входящая в состав препарата, в больших дозах может вызвать псевдокортикостероидный эффект, представляющий собой повышение уровня глюкокортикоидов и минералокортикоидов в крови. Это приводит к задержке в организме натрия и жидкости с одновременным уменьшением содержания калия, и, как следствие, к повышению уровня артериального давления и отекам.

Лечение: в случае передозировки лечение симптоматическое.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- антифосфолипидный синдром;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 18 лет.

УТВЕРЖДЕНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Влияние на возможность вождения автомобиля, работу с техникой
Не влияет.

Форма выпуска

Мягкие желатиновые капсулы, по 10 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 5 контурных ячейковых упаковок вместе с листком вкладышем в пачке.

Условия хранения

Хранят в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15°C до 25°C.
Хранят в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпуск производится без рецепта врача.

Название и адрес производителя:

УП «Минскинтеркапс», Республика Беларусь,
220075, г. Минск, а/я 112, ул. Инженерная, д. 26
тел./факс (+ 37517) 344-18-66
e-mail: info@mic.by, www.mic.by