

Листок-вкладыш – информация для пациента

ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД

10 мг, таблетки

Лоратадин

ЛП-№010034-РГ-ВУ

УТВЕРЖДЕНО

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗОМ от 22.04.2025 № 479

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002

**ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ,
ПОСКОЛЬКУ В НЕМ СОДЕРЖАТСЯ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС СВЕДЕНИЯ**

- Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед приемом препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД
3. Прием препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД, содержит действующее вещество лоратадин, который является антигистаминным средством.

Лоратадин подавляет действие вещества под названием гистамин, который вырабатывается в организме при аллергических реакциях и является причиной появления основных симптомов аллергии.

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД применяется для

лечения таких симптомов аллергического ринита (например, аллергия на пыльцу растений), как чихание, насморк, зуд в носу, жжение и зуд в глазах.

Также препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД может использоваться для устранения таких симптомов крапивницы (аллергическое поражение кожи), как покраснение и зуд.

Лоратадин действует в течение всего дня.

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД применяется у взрослых и детей с 6 лет или с массой тела более 30 кг.

Если улучшение не наступило, или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД

Не принимайте препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД, если:

- у вас аллергия на лоратадин или на любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе 6 листка-вкладыша);
- вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Сообщите лечащему врачу, если

- у вас есть заболевание печени;

- вам предстоит сделать кожные аллергические пробы на наличие аллергии. Не принимайте препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД за 2 дня до предстоящего исследования. Прием препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД может повлиять на результаты этого исследования.

Если что-либо из перечисленного выше относится к вам (или вы не уверены), проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дети

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД не предназначен для лечения детей младше 6 лет, а также с массой тела 30 кг и меньше.

Существуют другие лекарственные формы, более подходящие для детей до 6 лет или с массой тела 30 кг и меньше.

Дети до 2 лет: отсутствуют данные по эффективности и безопасности лоратадина в этой возрастной группе.

Другие препараты и препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать лекарственные препараты, представленные ниже, или какие-либо другие препараты.

Нежелательные реакции на лоратадин могут усиливаться при совместном приеме с препаратами, которые влияют на определенные ферменты в печени, которые отвечают за биохимические превращения лекарств.

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД с пищей и алкоголем

Для быстрого начала действия таблетки следует принимать натощак. Если таблетки принимать с пищей, поступление лоратадина в кровь может несколько замедлиться, но это не влияет на его эффективность.

Лоратадин не влияет на эффекты алкоголя.

Беременность и грудное вскармливание

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Беременность

В качестве меры предосторожности предпочтительно не принимать препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД во время беременности.

Грудное вскармливание

Если Вы кормите грудью, Вам не следует принимать препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД. Лоратадин проникает в грудное молоко.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В клинических исследованиях не выявлено влияния приема лоратадина в рекомендованных дозах на способность управлять транспортными средствами. Маловероятно, что препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД вызовет у вас сонливость или снизит внимательность. Тем не менее, у некоторых людей очень редко появляется сонливость, которая может повлиять на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД содержит лактозу

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с

рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые и дети старше 6 лет, которые весят больше 30 кг: препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД принимают по 1 таблетке 1 раз в день.

Дети младше 6 лет или с массой 30 кг или меньше: не принимайте препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД, т.к существуют другие лекарственные формы, более подходящие для таких детей.

Дети до 2 лет: прием препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД противопоказан.

Способ применения

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД принимают внутрь. Риска нанесена лишь для облегчения разламывания таблетки в случае возникновении затруднений при ее проглатывании целиком.

Если Вы приняли препарата ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД больше, чем следовало

Если количество таблеток, которые Вы приняли, превышает предусмотренное, обратитесь немедленно к врачу или работнику аптеки. При этом не ожидается появление каких-либо серьезных нарушений здоровья. У вас может появиться головная боль, быстрое сердцебиение или сонливость.

Если Вы забыли принять препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД

В случае пропуска дозы примите препарат как можно скорее, а затем продолжайте принимать в обычное время.

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную таблетку.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Наиболее частыми нежелательными реакциями у взрослых и детей старше 12 лет являются:

- сонливость
- головная боль
- повышение аппетита
- расстройство сна.

Наиболее частыми нежелательными реакциями у детей от 2 до 12 лет являются:

- головная боль
- раздражительность
- утомляемость.

Также сообщалось о следующих очень редких (могут возникать не более чем у 1 человека из 10000) нежелательных реакциях:

- тяжелые аллергические реакции
- головокружение
- быстрые или неритмичные сокращения сердца
- тошнота
- сухость во рту
- расстройство желудка
- нарушения со стороны печени
- выпадение волос
- сыпь
- утомляемость
- судороги.

Частота следующих нежелательных реакций неизвестна (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно) увеличение массы тела.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

Сайт: <https://www.rceth.by>

5. ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Не применяйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат ЛОРАТАДИН ФАРМЛЭНД содержит

Действующим веществом является лоратадин.

Каждая таблетка содержит 10 мг лоратадина.

Прочими вспомогательными веществами являются: целлюлоза микрокристаллическая, натрия крахмалгликолят (тип А), магния стеарат, натрия лаурилсульфат, лактоза моногидрат.

Внешний вид лекарственного препарата ФЕРРОЛЭНД и содержимое упаковки.

Форма выпуска и описание. Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические, с фаской, с риской на одной стороне. Риска не предназначена для разламывания таблетки.

Упаковка. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из фольги алюминиевой и пленки поливинилхлоридной. 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем во вторичной упаковке.

Порядок отпуска из аптек: без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения:

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124, ком. 3

E-mail: mail@pharmland.by

Производитель:

Белорусско-голландское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЛЭНД» (СП ООО «ФАРМЛЭНД»)

Республика Беларусь, 222603, Минская область, Несвижский р-н, г. Несвиж, ул. Ленинская, 124

Электронная почта: mail@pharmland.by

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза <https://eec.eaeunion.org/>

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте Союза <https://eec.eaeunion.org/>